

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLUMINIS XVII. PARS III.

LIPSIAE MDCCLXXII.

PVD IO. FRIDERICVM GLEDITSCH

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Patauii apud Io! Manfrè,
Holmiae apud L. Saluium.



I.

Philosophical Transactions, giving some Account of the present Undertakings, Studies, and Labours of the Ingenious in many considerable Parts of the World. Vol. LVIII. for the Year 1768. London, printed for L. Davis and C. Reymers. 1769. 4. Alph. 2. plag. 3. tab. aen. 14.

i. e.

Transactiones philosophicae, quae laborum, ab eruditis in variis orbis terrarum partibus novissime fufceptorum, quamdam exhibent notitiam. Vol. LVIII. ad annum 1768.

1) *Relatio eruptionis montis Vesuvii, anno 1767. p. 1.*
factae. In litteris Cl. WILH. HAMILTON ad
Ill. Comitem DE MORTON. Cl. Auctor huic
eruptioni proximus fuit, atque ob fumos insignes et
terrae motum permagnum vitam vix faluare potuit.
Ignis e Vesuvio adfcendens, flumen igneum hinc
proficiscens, totaque haec regio, tenebris obtefta, in
iconibus adieftis ad naturam elegantiffime depingun-
tur. Ex collectione variorum speciminum mate-
riae, a Vesuvio reieftae, Ill. Auctor probari poffe
contendit, multa marmora variegata et lapides pre-
tiosos ex montibus igniuomis ortum duxiffe.

2) *Excerpta ex litteris Cl. IOSEPHI LIESGA. p. 15.*
NIG d. 4. apr. 1767 ad Cl. BEUIS, in quibus bre-
Bb 2 viter

*viter exponitur dimensio trium graduum meridiani Vin-
dobonensis iussu Augustae Imperatricis suscepta.*

p. 17. 3) *Tentamen de vi percussio- nis*, Auctore Cl. WIL-
LIAM RICHARDSON M. D. *communicatum a Cl.*
HEBERDEN.

p. 24. 4) *Dissertatio de nexu parallaxis solaris cum lu-
nari, corporum horum densitatibus eorumque viribus
oceanum perturbantibus*, Auctore Cl. PATRICK
MURDOCH.

p. 34. 5) *Observationes de ossibus, quae vulgo ossa ele-
phantum putantur, nec procul a flumine Ohio in Ame-
rica inuenta sunt*, Auctore Cl. WILH. HUNTER.
Notum est tum in Sibiria, tum etiam in America
septentrionali haud adeo infrequenter ossa reperiri
magni cuiusdam animalis, (aut potius plurium spe-
cierum) de quorum ortu, cum hae terrae elephan-
tes non alant, adhuc disputatur. Comparavit Cl.
Auctor maxillas inferiores elephantum cum maxillis
inferioribus animalis cuiusdam ad ripam fluvii *Ohii*
reperitis, ac vidit, dentes molares elephantis atque
totam maxillam valde differre a dentibus molaribus
et maxilla huius animalis *), quae quidem differen-
tia magis ex icone adiecta cognosci, quam hic de-
scribi potest. Quatuor vero molares maxilla inco-
gniti animalis habet, acutiores et magis prominen-
tes. Putat itaque, haec ossa et dentes esse parte
anima

*) Ad elephantes pertinere haec ossa, Cl. DAUBEN-
TON pronunciauit, vid. *Hist. Naturelle* T. XI. p. 87
103. Conf. *ibid.* T. XII. p. 63. et *Hist. de l'Acad. de
Scienc.* 1762. p. 206. *Comm. nostr.* Vol. XV. p. 468.
Os femoris, a Cl. DAUBENTON *ibidem* delinea-
tum, ad elephantem non pertinere Noster asserit.
Confer quoque de his ossibus Americanis *Phil. Trans.*
LVII. p. 464. et 468. *Comm. nostr.* Vol. XVI. p. 280.

animalis incogniti Americae, quod fortasse ex genere carniuororum erat, sed cuius genus diu iam plane periit. Forte tamen haec differentia, quae potissimum in dentium molarium figura posita est, ex aetate tantum diuersa pendet.

6) *Observationes in insulis S. Iohannis et Pro-* p. 46.
montorio, Cap Breton, dicto factae certius determinan-
darum longitudinum et latitudinum geographicarum
horum locorum causa. Communicatae a Cl. BROCK-
LESBY.

7) *Adnotatio de frigore anni 1740 et anni 1768.* P. 54.
a Cl. IO. BEUIS.

8) *Observationes de eadem re,* a Cl. IO. SHORT. P. 55.
Anno 1740 frigoris vis tanta fuit, ut mercurius de-
cenderet 21 gradus sub puncto congelationis in
thermometro Fahrenheitiano, sed anno 1768 tan-
tum ad 17 et 19 $\frac{3}{4}$ gradus descendit.

9) *Disquisitio differentiae climatis hodierni in Ita-* P. 58.
a et in nonnullis aliis regionibus, a climate ante se-
tendecim secula. In litteris Cl. DAINES BARRING-
TON ad Cl. WILH. WATSON. Clima longe cali-
us et hiemes minus feueriores esse probat.

10) *Descriptio annulorum explosionibus electricis* P. 68.
a superficiebus frustorum metallicorum elicitorum, qui
omnes colores prismaticos obtinent. Auctore Cl. IO-
SEPHO PRIESTLEY.

11) *Litterae* Cl. JOHN ELLIS *de successu ex-* P. 75.
perimentorum, quae ipse instituit ad praeseruandas
landes per annum, ut ad vegetationem satis aptae per-
maneant, atque de modo, quo semina praecipua ex In-

dia Orientali possint aduehi, quo in America in coloniis Anglicis serantur. Vt praecaueat Cl. Auctor ne glandes et castaneae amittant vim progerminandi, aut corrumpantur, has peculiari docet modo servare. Eligit nimirum optimas glandes, easque diligenter abstergit, ac deinde quamlibet inuoluit cera molli, easque in receptacula lignea immittit, et interstitia replet cera liquida.

p. 80. 12) *Litterae a Cl. DONALD MONRO datae Cl. MATHEW MATY, quibus continetur epistola Cl. FARLEY ex Antigoa scripta ad Cl. ARCH. GLISTER, de prospero effectu radicis quassiae in febribus nonnullis *)* In febre intermittente cum vomitu aeger usu radicis quassiae mox sanatus est. In alia febre putrida laborantibus, similem effectum huius remedii expertus est Cl. Auctor. Plerumque coniunxit lignum quassiae cum radice serpentariae.

p. 83. 13) *Observationes meteorologicae ad annum 1780 Carleoli, Bridgewater, et Ludgvan factae, et communicatae ab Episcopo Carleolensi.*

p. 91. 14) *Relatio de variis speciebus avium, quae Penguin dicuntur, auctore Cl. THOMA PENNANT* Characterem genericum harum avium constituit alae parvae impennes: digiti quatuor, tribus conivexis, vno libero antrorsum verso. Species vero 1) *Pinguin patagonicus* nova species, quae cygni magnitudinem habet, rostro recto acuto, mandibula, superiore apice adunca, inferiore in medio compressa. Pennae imbricatae sunt et squamarum duritiem quasi habent. Alae breviores pinnas piscium aemulantur. 2) *Pinguin minor* seu *Diomedea demersa* LINN. et 3) *Pinguin rufipes*, 1

Phl

*) vid. LINN. Amoen. Vol. VI. p. 416.

Phaëton demersus. LINN. *Alcam* vero *impennem* LINN. quam etiam *Pinguin* nonnulli vocant, ad hoc genus non pertinere, Cl. Auctor contendit.

15) *Applicatio theorematis* Cl. SAUNDERSO-p. 100.
NII ad *soluendam quaestionem chronologicam maxime curiosam*, Auctore Cl. JAMES HORSEFALL.

16) *Methodus peculiaris parallaxin solis deter-* p. 107.
minandi ex observationibus transitus Veneris per discum solis 1761. Auctore Cl. ANDREA PLANMANN.

17) *Relatio de methodo inoculationis variolarum* p. 128.
in oris Barbariae et Bengalae in India Orientali, ex-
cërpta e tractatu, a Cl. CHAIS scripto. Auctore
Cl. MATHEW MATY. Algeriae ii, qui inocula-
tionem petunt, ab aegris, qui variolis laborant,
emunt variolas tres vel quinque, iisque manum in-
ter pollicem et indicem terunt, ac inde inficiuntur.
Simulac effectus inoculationis se prodit, lecto deti-
nentur aegri et medicamentis calidis tractantur. Vi-
ctus e iure carnis caprarum, et potus e decocto her-
barum constat. Raro tamen haec methodus me-
dendi infelicem exitum habere solet. In Bengala
pus variolosum affricatur cuti manus intra digitos,
sed cutis antea per aliquot puncturas laeditur, et
vulnus deligatur, ac deinde sequitur febris, quam
balneis adiuvant, tandemque succedit eruptio. Alii
miscent pus variolosum cum saccharo, idque infanti-
bus propinant in liquore dulci, ac vera eruptio va-
riolarum hinc effici solet.

18) *Croton spicatum, nova plantae species* exp. 132.
America, quam descriptione et icone illustravit PE-
TRUS IONAS BERGIUS. Vocatur a Cl. BER-
GIO haec species *Croton* (spicatum) *foliis ovatis*
Bb 4 *glabris,*

glabris, ramis nudis, florum racemis spicatis terminilibus; est vero: Croton foliis ouatis, floribus spicatis, stylis multifidis depresso-patentibus, frutescens LOEFFLINGII It. p. 234. *Mali folio arbor, artemisiae odore, flore pentapetalo spicato.* SLOAN. Hist. Iamaic. t. 174. f. 1. Habitat Hauanae in America. A *croto glabello* LINNAEI caute distinguendum, cum in illo rami foliosi, flores racemoso-paniculati, axillares obseruentur.

P. 136. 19) *Observationes barometri et thermometri, ac relatio de copia pluviae cuiusque mensis totius anni 1767, in nosocomio Regio Plymuthi factae, a Cl. WILH. FARR.*

P. 140. 20) *Relatio de inoculatione in Arabia, ex litteris Cl. PATRICK RUSSELL, Aleppi scriptis ad Cl. ALEXANDER RUSSELL.* Inoculatio inter Arabes iam diu maxime usitata est, et perficitur variis puncturis partis alicuius carnosae ope acus pure variolosa imbutae, ac plerumque optimus effectus hinc sequitur. Hanc inoculationem etiam in usum esse in vrbibus Bagdad, Mouful et Bassora, nec minus in Georgia, Armenia, Turcomannia, Syria et Palaestina, Cl. Auctor affirmat, qua de re a pluribus incolis hinc proficiscentibus certior factus est. Miratur iusto Auctor Cl., nec RAUWOLFIIUM, nec TOURNEFORTIUM inoculationis inter hos populos adeo usitatae mentionem fecisse.

P. 151. 21) *Excerptum epistolae Cl. WOLFF, Warsaviae datae ad Cl. HENRICUM BAKER.* Frigus ibi erat permagnum hyeme anni 1768, ac mercurius thermometri REAUM. ter descendit ad 19–20 gradus sub puncto congelationis. Anno 1767 descendit ad 24 gradus, et anno 1740 ad 26 gradus.

22) *Prae-*

22) *Praecipua capita ex litteris* Cl. P. WAR-P. 152.
GENTIN ad Cl. MASKELYNE.

23) *Introductio* Cl. NEUILL MASKELYNEP. 154.
in duas dissertationes sequentes Cl. SMEATON.

24) *Dissertatio exponens menstruam parallaxin ex* p. 156.
mutua terrae ac lunae grauitatione ortam, eiusque in-
fluxum in solis ac planetarum obseruationes, una cum
methodo eam obseruandi, Auctore Cl. SMEATON.

25) *Noua methodus obseruandi sidera extra Me-* p. 170.
ridianum sita, Auctore EODEM.

26) *Specimen concernens nouam methodum compa-* p. 174.
randi spatia curuilinea, per quam eiusmodi areae curui-
lineae inter se conferuntur; quae per alias adhuc co-
gnitas methodos inter se comparari non possunt, Au-
ctore Cl. IACOBO LANDEN.

27) *Experimenta et obseruationes circa materiam* p. 181.
coeruleam in palude torfacea in Scotia inuentam, Au-
ctore Cl. SYLVESTER DOUGLAS. Terra haec
metallica est *calx martialis phlogisto iuncta et alcali*
praecipitata CRONSTAEDTII et cum terra coeru-
lea *Eckardsbergensi* satis conuenit, quae etiam, dum
effoditur, alba est, si vero aëri libero exponitur,
coerulescentem colorem acquirit. Experimenta
Auctoris ostendunt, hanc terram ad ferri mineras
pertinere, admixtam vero ferro esse materiam quan-
dam adstringentem vegetabilem, ex quercuum forte
truncis, qui copiosius in hac palude reperiuntur.
Terram hanc, cum gummi mixtam, pigmenti loco
forte adhiberi posse Cl. DOUGLAS suspicatur.

28) *Duae obseruationes medicae* Cl. IOSEPH P. 189.
BENEVUTI, *communicatae a* Cl. CH. ALLIONI,

et translatae ex latino a Cl. DAN. PETRO LAYARD. Observatio prima agit de aegro, a febre mirum in modum restituto. Quadragenarius febre maligna affectus, die nono incidit in delirium cum pessimis symptomatibus. Die undecimo, cum valde sudaret, petiit ab adstantibus, ut se solum relinquerent, quo somnum caperet. Sed interea per fenestram effugit, mero indusio obtectus, atque cum hyems esset, niue sitim permagnam sedauit. Tertio demum die repertus est hic aeger in vinea, duo millia a pristino loco distante, ac ipse nesciebat, quo modo huc aduenisset. Tum vero a febre iam plane restitutus erat, optimaque gaudebat sanitate. Altera observatio *de capite insignis magnitudinis* inscribitur. Tricenarii statura corporis tam parva erat, ut vix septenarius esse videretur. Caput erat permagnum, ut aeger incedendo id manibus sustentare cogeretur. Optimam habuerat sanitatem usque ad annum sextum aetatis, quo diarrhoea per nouem menses laborauerat, qua suppressa, paralysis extremitatum inferiorum accedebat, ut periret eorum motus, relicto tamen sensu. Ab hoc tempore semper increuit caput, vna cum facie, naso, auribus, oculis, ore, reliqui vero corporis magnitudo nullo modo aucta est. Ambitus calvariae aequabat triginta et septem pollices, octo lineas, longitudo faciei duodecim pollices, tres lineas. Appetitus ciborum et somnus aegri optimi sunt, sed foeces et vrina contra eius voluntatem excerni solent. Brachia insignibus viribus praedita sunt, et aeger praeterea bonum ingenium optimamque memoriam habet.

p. 192.

29) *Relatio de singulari chamaeleontis specie* Auctore IACOBO PARSONS. Noua est species, quam Auctor ex specimine siccato describit. Capit-
tis

tis forma, inprimis fatis monstrosa, a cognita specie differt, quod longe maius est, et posterius apophyfin longam habet, quae ad processum verticalem primum extenditur.

30) *Litterae* Cl. I. Q. RIZZI ZANNONIP. 196.
complexae varias observationes astronomicas in diuersis Regni Neapolitani et Siciliensis locis factas ac ex gallica lingua translatas a Cl. MATTH. MATY M. D.

31) *Relatio de variis experimentis, quae* Cl. p. 203.
MILLER Cantabrigiae cum satu hordei instituit, a Cl. WILH. WATSON. Cl. MILLER feuit die 2. iun. 1766. aliquot grana hordei vulgaris, et 8. aug. plantam quamlibet diuidit in 18. partes, et singulam separatim implantauit. Quae cum medio septembri culmos laterales protulerint, hos denuo diuidit, qua quidem diuisione accepit 77. plantas. Has mense martio et aprili anni sequentis rursus diuisit, atque 500. plantas hinc accepit, quas non amplius diuisit. Omnes hae plantae vulgares hordei plantas crassitie et vigore superabant, et nonnullae earum centum spicas ex qualibet radice protrudebant, quarum plurimae septem pollices longitudine aequabant, et 60. ad 70. semina hordei continebant. Accepit itaque Cl. Auctor hac methodo a quolibet femine hordei 21109. semina. Solum erat valde arenosum ac minime laudandum. Dimidia eius altera humo valde saturata erat, altera minime praeparata, nihilominus tamen hae plantae simili vigore ac incremento praeditae erant.

32) *Theoria fractionum decimalium recurrentium*, p. 207.
Auctore Cl. I. ROBERTSON.

33) *Lit-*

p. 211. 33) *Litterae Cl. I. R. FORSTERI ad Cl. MATY exhibentes expositionem nouae mappae geographicae fluminis Volgae.*

p. 217. 34) *Relatio de systemate lymphatico auium, ex litteris Cl. WILH. HEWSON, ad Cl. WILH. HUNTER.* Ut plurimum creditur, systema lymphaticum deesse in auibus, cum in iis nondum vasa lactea et glandulae mesenterii detecta fuerint. Probat autem Cl. Auctor, vasa lactea vera adesse in auibus, quamquam ob defectum coloris chyli non facili conspiciantur. Diuidit itaque systema lymphaticum in vasa lactea et lymphatica, atque in ductum thoracicum. Vasa lactea auium sunt vasa lymphatica intestinorum, et ductus thoracicus duplex est, quorum vterque venae iugulari inferitur. In anserem (cuius systema lymphaticum disquisiuit, mercurio viuo repleuit, et icone adiecta illustrauit Cl. Auctor) progrediuntur vasa lactea ab intestinis ad vasa mesenterica. Vasa lactea duodeni iuxta pancreas adscendunt usque ad arteriam coeliacam, ibi recipiunt vasa lymphatica hepatis, plexu circumdant coeliacam, et a ventriculo ac oesophago ramos accipiunt, deinde alios a capsulis renalibus, tandem ab aliis intestinis tenuibus. Vltimi hii rami recipiunt vas lymphaticum ab intestino recto, quod antea acceperat ramulos a renibus. Ad radicem coeliacae coniunguntur vasa lymphatica extremitatum inferiorum cum illis intestinorum, ibidemque formatur rete ab his vasis lacteis et lymphaticis, e quo oritur vterque ductus thoracicus, ad venam iugularem usque adscendens, variaque interea recipiens vasa lymphatica oesophagi, colli et alarum. Vasa lymphatica colli sistunt duos ramos, qui coniunguntur, et truncus glandulae lymphaticae inferitur, e qua in latere opposito proficiscitur vas lymphaticum, ad venam iugularem desinens. Systema lymphaticum

um auium ab illo quadrupedum in eo differt, 1) quod
 chylus sit transparent, 2) glandulae lymphati-
 ae nullibi appareant, 3) variae partes huius syste-
 matis magis varicosae sint, quam in quadrupedibus.
 refutat itaque hac doctrina vulgarem opinionem,
 qua creditur, chylum in auib, a venis mesaraicis
 absorberi et ad sanguinem adduci; ac docet potius,
 absorptionem hanc simili modo in auib, fieri, quam
 in quadrupedibus. Methodus, qua systema lym-
 phaticum Auctor in auib, demonstrat, haec est.
 Eligit anseres iuniores et macilentas, iisque, viuenti-
 bus, abdomen incidit, et vasa mesenterica vinculo
 constringit, ac statim vasa lactea apparent, si anser
 ante aliquot horas cibos sumserit. Vasa lymphatica
 colli in conspectum prodeunt, si vena iugularis ad in-
 mam colli partem ligatur. Vt mercurio reple-
 antur, antea sunt aperienda, aptusque tubulus est im-
 mittendus. Cl. Auctor in fine monet, se etiam syste-
 ma lymphaticum in testudine et piscibus obseruasse. p. 223
 et 224.

35) *Catalogus 50 plantarum horti Chelseani, Societati Regiae exhibitarum a Societate Pharmacopoeo-
 um, per WILH. HUDSON.* p. 227.

36) *Interpretatio inscriptionis numi Punici, cuius p. 235.
 in Insula GOZO, quae hactenus nondum explicata est.
 in litteris Cl. JOHN SUINTON ad Cl. CAR. MOR-
 RISON.*

37) *Explicatio numi Etrusci ex Paesto in Luca p. 246.
 Italia, tempore belli civilis cusi. In litteris EIUDEM
 ad EUNDEM.*

38) *Adnotationes in denarium gentis Veturiae, in p. 253.
 cuius auersa parte inscriptio Etrusca inuenitur, quae
 nondum*

nondum hætenus explicata est. In litteris EIUDEM ad EUNDEM.

p. 261. 39) *Descriptio numi Punici ex Insula Gozo, qui hætenus ab eruditis putatus est numus Melitensis. In litteris EIUDEM ad EUNDEM.*

p. 265. 40) *Observationes de numo nondum descripto, in cuius auersa parte duæ litterae Punicae conspiciuntur. In litteris EIUDEM ad Cl. M. MATY.*

p. 270. 41) *Introductio Cl. N. MASKELYNE in observationes, a Cl. CAROLO MASON et IEREMIA DIXON factas, occasione mensurati ac determinati gradus meridiani in Marylandia et Pensylvania in America septentrionali.*

p. 274. 42) *Observationes ipsae Cl. MASON et DIXON.*

p. 329. 43) *Astronomicae observationes IISDEM ab in Pensylvania factae.*

p. 336. 44) *Excerptum ex litteris Romae datis ad Cl. M. MATY, de calore insigni tempore aestiuo anni 1768 ibidem percepto. Die 19 Aug. mercurius adscendit ad 99 gradus, et per tres hebdomadas semper meridie ad 94 gradus adscendit, ac nocte non ultra 83 gradus descendit.*

p. 337. 45) *De facili methodo conficiendi phosphorum, qui instar lapidis Bononiensis lucem insugit et emittit, cum experimentis et observationibus, a Cl. IOHN CANTON. Tres partes pulueris concharum calcinatarum miscet cum parte vna florum sulphuris, in crucibulum immittit, ac igni per horam imponit. Refrigeratam hanc massam in partes frangit. Opti-
mus*

mus itaque phosphorus sistit puluerem album, in phiala bene obturata seruandum. Exponatur paululum lumini diei, ac deinde in tenebris multum luminis emittit. Cl. Auctor septem describit experimenta, hoc phosphoro instituta, e quibus praecipua tantum hic adnotemus. Frustrula huius phosphori in globo vitreo, hermetice sigillato, per annum radiis solis exposuit, et alia frustrula similiter seruata in tenebras per annum posuit, ac vterque phosphorus deinde aequali modo lumen emisit. Puluis phosphori, quem pauxillo aquae adfixit lateribus globi vitrei hermetici sigillati, amisit vim emittendi lucem, ipsamque albedinem. Quodsi vero ope spiritus aetherei adhaereret, haec vis minime imminuebatur. Affusa maiori copia spiritus vini in simili globo hermetice sigillato, hic post aliquot menses flauescebat, sed in tenebris radios lucis emittebat. Affusus spiritus aethereus in simili globo colorem non mutabat et ille semper lucem spargebat. Phosphorus ficcus, in globo vitreo lumini, expositus, iuxta ferrum candens ponatur, atque ab hoc accipiet vim emittendi lucem.

46) *Observationes* Cl. CHRISTIANI MAYE p. 345.
RI Swezingae a. 1767 et 1768 factae ex litteris eius
ad Ill. MORTON.

47) *Observationes transitus veneris per discum solis et* p. 355.
eclipsis solaris, d. 3 Iun. 1769 factae in obseruatorio
Regio a Cl. MASKELYNE.

II.

Histoire des poissons, contenant la description anatomique de leurs parties externes et internes, et le caractère des divers genres rangés par Classes et par Ordres. Avec un vocabulaire complet, des tables raisonnées en latin et en françois, des expériences sur le mouvement natatoire et musculaire, sur le mécanisme de la respiration, sur les organes de l'œuf et de la génération et des estampes qui représentent les principales parties anatomiques et quelques genres nouveaux. Par ANTOINE GOÛAN Conseil. du Roi et Médec. ord. Profess. Roy. de Médec. dans l'Univ. de Montpellier etc. à Stasbourg chez Amand Koenig, 1770. 4. 2 Alph. 15 pl. tab. aen. 4.

i. e.

Historia piscium sistens ipsorum anatomen externam, internam, atque genera in classes et ordines redacta. Accedunt vocabularium locupletissimum, indices latini ac gallici, experimenta circa motum natatorium et muscularem, respirationis mechanismum, auditus ac generationis organa. Cum iconibus generis noua ac praecipuas partes anatomicas exhibentibus. Auctore ANTONIO GOÛAN.

Opus hoc egregium gallice et latine conscriptum, quo Cl. Auctor se non minus in zoologiae, quam in botanices studio egregios fecisse profectus ostendit, elementarem tantum ichthyologiae partem philosophiam scilicet *ichthyologicam* et genera piscium continet. Singulorum enim piscium seu specierum histo-

historiam alio volumine se traditurum esse, Cl. Auctor pollicetur. Excludit vero *piscium* numero *pisces plagiuros* vel *cetaceos*, nec non *chondropterygios* siue *amphibia nantia* LINNAEI; *branchio-plegi* contra, quos LINNAEUS etiam *nantibus amphibiiis* adnumeravit, ad *pisces* proprie sic dictos a Nostro referuntur.

In philosophia ichthyologica primum externum *piscium* corpus et singulares eius partes accuratius describit artisque vocabula explicat et exemplis illustrat. Variarum appendicum, quibus nonnullorum *piscium* capita ornantur, ut *cirrhorum* (quales in *cyprinis* variis, *acipensere* etc. inveniuntur) *pinnularum* seu *tentaculorum*, *aculeorum*, *clypeorum* *) (ut in *echeneide* usus, cum eae omnes tantum in *piscibus*, capite crasso et obtuso praeditis, obseruentur, forte in eo consistit, ut aequilibrio corporis inseruiant et motum quemlibet iuuent. *Officula palatina* primae triturationi *alimentorum*, vel deglutitioni, vel *alimentorum* regressui impediendo inseruire, Cl. Auctor suspicatur, etsi verus eorum usus nondum constat. *Pisces*, etsi palpebris carent, saepius tamen *membranam nictitantem*, ex integumentis capitis productam, habent, quae semicircularis; vel integra, vel annularis et medio foramine instructa est. *Pupilla* in plerisque sphaerica vel oblonga est, in *salmone* vero et *coregone* antè in acutum angulum terminatur. *Membrana branchialis* seu *branchiostega* pinna est, officulis cartilagineis incurvis, radiorum loco, instructa. Haec et *opercula branchialia* communem usum habent. Coercent scilicet aquam e faucibus per branchias, a se inuicem discedentes, transcolatam, succedente mutua

*) Sunt appendices setaceae, inter oculos vel nares positae, quas *gadi*, *mustelae* et *gymnoti* genera ostendunt.

tua branchiarum appensione, operculorum depressione et aperturae branchialis clausura. Opercula deinde iterum eleuantur et apertura patet, membranae branchialis explicata, aquam propellit aperturamque claudit. Tandem opercula quoque sensim deprimuntur et membrana contrahitur. Hinc opercula et membrana branchialis, ut valvula, ex duabus laminis composita, considerari possunt, quae ad libitum animalis eleuatur vel deprimitur. *Caudae*

- p. 42. nomine Cl. Auctor non, ut LINNAEUS et ARTEMIUS fere semper fecerunt, *pinnam caudalem*, sed eam partem trunci, quam vertebrae lumborum formant, insignire solet. Auulsis anticis cuiuslibet pinnae ossiculis, pinna haec motum amittit, quod experimentum docet, potentiam motricem his tantum ossiculis inhaerere. Pinnae dorsales eum usum habent, ut pisces in aequilibrio seruent. Hinc plani pisces ut *solea*, *pleuronestes* etc. (cum pinnis ventralibus valde paruis instruantur, ideoque aquae minorem superficiem obuertant, maioreque vi ad situm verticalem seruandum opus habeant, quam qui latitudine maiore et corpori reliquo proportionata gaudent) pinnam dorsalem habent, quae omne dorsum ad caudam usque occiput pinnamque analem, quae ab ano, capite in eiusmodi piscibus valde propinquo, ad caudam usque protenditur. Pectorales pinnae in piscibus pro brachiis sunt, earumque oper nonnulli pisces extra aquam eleuantur et in aerem euolant. Pinnae ventrales vero pedum loco sunt.
- p. 51.
- p. 53. Semper illae, quemcunque etiam situm habeant, dum expanduntur, horizonti parallelae sunt, angulumque rectum cum corpore efficiunt, atque expansae id praestant, ut caput et corpus in aequilibrio maneant. Pisces crassissimo capite praediti v. c. *uranoscopus* eas in iugulo, ii, qui caput reliquo corpori proportionatum habent, in thorace et abdomine, pisces vero, qui capite
- exiguo

exiguo aut in longum rostrum desinente praediti sunt, plane nullas habent, Analis pinna, vt dorsalis pi-p. 55. scem in verticali situ seruat. Caudalis gubernaculip. 56. quasi loco est omnemque mouendi vim piscibus impertitur.

Praemissa externi corporis consideratione, anato- men piscium Cl. Auctor, omissis subtilioribus disquisi- P. 58. tionibus, tradit. Ossa primum considerat, quorum periosteum difficulter detegitur. Caput piscium longe plura ossa, quam reliquorum animalium capita habet, cum in nonnullis percis ad octoginta ossa numerentur. Incertus tamen est ossium capitis numerus, et non solum in variis generibus, imo speciebus, insigniter variat, sed et ea, quae in iunioribus piscibus distincta sunt, ossicula in adultioribus inter se con- crescunt. Hinc octo tantum capitis ossa Cl. Auctor enumerat, cranium scilicet, duo ossa maxillaria, duo ossa palatina, duo opercula branchialia et os hyoideum. Quae in cerebro et cerebello piscium reperiuntur ossi- cula, organon auditus eorum esse, vt KLEINIUS alique p. 61. autumarunt, Cl. Auctor negat. Plurimi enim pisces iis carent, eorumque numerus in diuersis piscium gene- ribus variat. Atque in vniversum pisces surdos esse Noster putat. Nullos enim externos vel internos meatus aut alias partes ad organon, auditus pertinentes in iis reperire potuit, obseruauitque pisciculos in vase detentos, nullo strepitu vel clamore adstantis moueri, dummodo inter clamantis os et aquam papyracea charta interponeretur, ne motus aëris tremulus aquam moueret; hac vero remota et aëre ac aqua trementibus, pisces exterritos fugam petiisse*). Columna ver- p. 62. tebrarum in piscibus crassior est ad caput, quam in re- liquo corpore sensimque versus caudam extenuatur, quod in homine aliisque animalibus pluribus secus

Cc 2

esse

*) Organon auditus in piscibus adesse vt alia taceamus Cel. CAMPERTI obseruationes probant in Actis so- ciet. Harlemensis relatae Vol. VII. p. 79. Conf. Coni. nostr. Vol. XVI. p. 581.

- esse nouimus. In *piscium* proprie sic dictorum vertebris circuli concentrici, quales in *piscium chondropterygiorum* vertebris reperiuntur et annos aetatis designant, defunt; apophyses vero vertebrarum lineas transuersas numero variantes exhibent, ex quorum numero forte aetatem singulorum piscium colligi posse, Cl. Auctori videtur.
- p. 63. Thorax vertebris tantum, sterno, clauiculis scapulisque constat, abdomen vero vertebris costis ossibusque peluis, quo nomine duo ossa Cl. Auctor designat, quae abdomini piscium subiecta eius cauum tuentur. Falciformia ea sunt, iisque in *piscibus abdominalibus* pinnae ventrales adhaerent, quae in *piscibus iugularibus* clauiculis, in *thoracicis* sterno adnectuntur. Cauda vertebris solis formatur. Pinnae vero dorsalis et analis, quae
- p. 67. non, vt aliae, maioribus ossibus cohaerent, per plurima officula minora, inter musculosa strata haerentia sustinentur, quae Cl. Auctor *ossa interspinosa* vocat. His de sceleton piscium expositis, iam ad myologi-
- p. 69. am Cl. Auctor transit. Omne corpus a capite et margine posteriore clauicularum ad caudam vsque duobus musculis maioribus tegitur, quos Auctor Cl. *laterales* musculos vocat. Hi ex pluribus minoribus musculis formantur, transuersis, ex tendine carneque intermedia compositis. Lineae vero minores, hosce musculos a se inuicem distinguentes, in alepidotis piscibus maxime conspicuae, a LINNAEO aliisque *interstitiales* dicuntur et *lineam lateralem* secant, vt itaque ARTEDI et LINNAEUS recte dixerint, *interstitiales* lineas *laterali* neutiquam esse parallelas. Caudalis pinna quatuor musculis regitur, praetereaue quatuor alii minores adsunt, qui pinnam priorum contractione expansam iterum constringunt. Pectoralium pinnarum quaelibet duos erectores duosque depresso- res habet, quorum priores pinnam dilatant, posteriores coarctant. Ventralibus commune est

vnum erectorem duosque depresso- res habere. Sul- p. 75.
 cum longitudinalem, in dorso inter duo musculorum
 lateralium strata relictum, muscoli carinales dor- si et
 caudae occupant, quorum numerus pro numero
 vel defectu pinnarum dor- si variat. Ere- ctioni et de-
 pressioni pinnarum dor- si et ani inferuiunt muscoli
 interspino- si proprii. Ex membranae branchialis
 musculis a DUVERNEYO descriptis, Cl. Aucto- r di-
 latatorem tantum huius pinnae distincte conspici-
 re potuit. Ad rationem motus piscium declarandam p. 77.
 plurima experimen- ta instituit, quae, ne nimis longi-
 simus, omittimus. Patet vero per ea, pinnae omnes
 quandoque eandem actionem praestare et alias alia-
 rum munere fungi. In splanchnologia piscium ex- p. 79.
 ponenda Cl. Aucto- r singulorum viscerum structuram
 non adeo subtiliter describit, ut ex recentioribus ex-
 emplis loco HALLERUS et CAMPERUS fecerunt.
 Omissis vero iis, quae minus a vulgari pluribus ani-
 malibus fabrica recedunt, sequentia annotamus.
Vesica aërea intra peritonaeum sita est. In maribus p. 81.
 saepe ad fundum usque vesicae vrinariae descendit;
 longitudo vero in vniuersum secundum magnitudi-
 nem piscis, figura in variis piscibus variat. *Pleu-
 ronestes* hac vesica carent. Communicat cum oeso-
 phago et ventriculo. In piscibus, sub antliae pneu-
 maticae campana aëre extracto occisis, vesicam aë-
 ream depletam, non autem disruptam, Cl. Aucto- r ob-
 seruauit. Intestinum rectum in piscibus quoque p. 82.
 proprio sphinctere clauditur. Vesica vrinaria piscium p. 83.
 non, ut multi putant, cum intestino recto communi-
 cat, sed propriam aperturam inter anum et pinna-
 malem sitam habet. Renum magnitudo integram fere
 abdominis longitudinem aequat. Siti sunt extra pe-
 ritonaeum ad spinam dor- si et ad vesicam usque de-
 scendunt, quo in loco vreteres confunduntur et in
 vesicae fundum inferuntur. Testes seu organa ge- p. 84.
 nitalia

nitalia marium Cl. Auctor accuratius describit, quam ab aliis, qui ante eum scripserunt, factum est. Sunt vero duo viscera cylindrica, rubra, retro intestinum rectum sita, quae a se inuicem vesica aërea distinguit, antèius vero a recto intestino duobus fasciculis adiposis, totidemque similibus posterius a peritoneo separantur. In eorum anteriore superficie vena decurrit, quae in dextro latere ad hepar in sinistro ad splenem tendit. Caua sunt, cavitaeque haec plicata, glandulis referta et papillosa est, animalium ruminantium reticulum aemulans. Communicat ea cum vesica vrinaria, in cuius superficie inferiore et anteriore duo orificia horum canalium inueniuntur, ut itaque testes commune orificium cum vesica vrinaria habeant. In nonnullis piscibus ut *gobio*, *ophidio*, *cepola*, ad anteriorem marginem communis orificii vesicae et horum viscerum tuberculum conicum eminet, quod utrum utriusque sexui commune, an feminis tantum loco clitoridis sit, Cl. Auctor, observationibus ulterius destitutus, non determinat. Ovarium in feminis simplex vel duplex est, eiusque apertura etiam in vesicam hiat. Cicatriculam microscopii ope Cl. Auctor videre non potuit. Branchiae ex ARTEDI et DUVERNEYI *) observationibus describuntur.

p. 88. Addit Cl. Auctor duo ossicula, quorum vnum utrimque post ultimam branchiam reperitur. Haec accurate mespili nucleum referunt. Clauiculae quasi internae sunt et superius capiti, inferius sibi inuicem adhaerent, et anticam pectoris partem component. Mobilia sunt, et dum opercula attolluntur, antrorsum extrorsumque abducuntur. His vero hac ratione motis, branchiae sibi inuicem applicantur et spatium inter eas et clauiculas residuum imple-

*) *Mem. de l'Acad. 1701. p. 224 et oeuvres anatomiques T. II, p. 565.*

impletur. Operculis branchiarum filo ita constri-
ctis, vt aperiri nequeant, piscis os frequentius aperit,
tandemque aequilibrium et motum perdit et mori-
bundus in latus recumbit; adempto vero vinculo,
motum et aequilibrium recuperat. Hinc opercu- p. 90.
lorum alternum motum alternae dilatationi et con-
tractioni thoracis similem esse Noster concludit.
Cor in pectore non transuersalem situm, vt ARTE-
DI asserit, sed perpendicularem habet, ita tamen vt
apex caput, basis diaphragma respiciat. Vnilocu-
lare est, intus vero rugas et loculamenta habet. Su-
perius et anterieus cum aorta, lateraliter cum auricu-
la communicat. Haec in sinistro latere collocata,
cordi multo tenuior est, sed eo duplo maior et in-
ferius cum sinu venoso cohaeret. Vbi auricula in
ventriculum hiat, valvulae adsunt, regressum sangui-
nis prohibentes, in ipsa vero auricula trabes, nimiam
dilatationem impediētes, Cl. Auctor vidit. Sinus
venosus auriculam magnitudine multum superat,
similem vero fabricam habet, diaphragmati insidet,
et inferius tres ramos venosos maiores recipit. Eo-
rum medius est vena caua inferior, vertebris subia-
cens, laterales vero rami sunt venae illae duae su- p. 91.
perius descriptae, ex organis genitalibus reduces, quae,
vbi hepar et lienem permeaverunt, ad sinum venosum
tendunt. Aorta superiori cordis apici adhaeret, bul-
bosa quasi et conica, intus columnis et fibris referta.
Haec in ascensu suo coarctata in medio sulco inter
branchias collocata, secundum Nostri descriptionem
quae ab ea, quam ARTEDI et DVVERNEYVS com-
municarunt, differt, vtrinque ramum dat, qui mox in
duos alios diuiditur, quorum inferior, arcu facto, in
branchiam posteriorem, superior recta via in tertiam
branchiam tendit. Deinde aortae truncus ramum
vtrinque ad branchiam secundam dat, tandemque
in duos diuisus, ramos ad primam branchiam excur-
rit. Rami autem omnes ad branchias tendentes, in
Cc 4 sulco

fulco in conuexitate arcus cuiuslibet branchialis excavato decurrunt, tandemque omnes iuxta cranii basin ante pectus in vnum truncum, venarum in modum coeunt, non absimilem ei, ex quo orti sunt. Truncus hic descendens, arteriae in modum, ramos ad hepar et lienem, et ad latus venae cauae decurrens ad renes viscera abdominalia etc. dat. Venosa capitis vasa, nec non reliquas arterias capitis Cl. Auctor detegere non potuit. Nervenos piscium non describit.

P. 95. Transeamus nunc ad alteram huius libri partem quae genera piscium continet, in quibus coordinandis Cl. Auctor Artedianam et Linnaeanam methodum ita coniunxit, ut classes ab ARTEDIO, ordinum vero diuisionem a LINNAEO sumeret. Diuidit itaque *pisces* in eos, qui *branchias completas et incompletas* habent, id est, branchias, quae operculo, vel membrana branchiostega, vel vtraque carent, et etiam denudatae dici possent. Ad priores *acanthopterygiorum* et *malacopterygiorum* classes pertinent; incompletas vero branchiae *branchiostegorum* classi propriae sunt. Singulae vero classes secundum pinnarum ventralium defectum et situm in quatuor ordines apodum scilicet, *iugularium*, *thoracicum* et *abdominalium* distinguuntur. Ad pisces *acanthopterygios apodes* pertinent 1) *trichiurus*, 2) *xiphias*, cuius membrana branchiostega sex radiis secundum Nostrum, non octo ut LINNAEVS scribit, instruitur et 3) *ophidium*. Hoc genus caput obtusum, os obliquum, pinnamque dorsali, ani, caudaeque unitam habet. Ad secundum ordinem huius classis *iugularium* scilicet Cl. Auctor refert 4) *trachinum* 5) *uranoscopus* 6) *callyptopomum* et 7) *blennium*; ad *thoracicos* vero 8) *gobium* 9) *cepolam* 10) *coryphaenam* 11) *scombrum* 12) *labrum* 13) *sparum* 14) *chaetodontem* 15) *sciaenam* 16) *perca* 17) *scorpaenam* 18) *mullum* 19) *triglam* 20) *cottum* 21) *zeum* 22) *trachipterum* et 23) *gasterosteum*.
Labrum

Labri genus pinnas pectorales *rotundatas*, non, vt LINNAEVS scripsit, *acuminatas*, *spari* contra genus, cui idem *rotundatas* tribuit, *acuminatas* habet, quod etiam Cl. BRÜNNICHE iam obseruauit *) *Chaetodontis* membrana branchioſtega radios quinque vel ſex habet. *Sciaenae* caput decliue Cl. Auctor tribuit. Nouum eſt *trachipteri* genus (*la rape* p. 104. ou *le ſabre*) quod piſcem ſiſtit, quem ARTEDI *tæ-153. niam*, GESNERUS in *hiſtoria animalium falcem Venetorum* dixit, LINNAEUS vero ad *cepolam* retulit. Caput habet decliue, lineam lateralem rectam, ſquamis ſerie ſimplici, maxillam vtramque fornicatam. Pinna ani deeſt. *Gaſteroſteo* caput ouatum tribuit. Ad *acanthopterygios* tandem abdominales ab Auctore referuntur 24) *ſilurus*, 25) *mugil*, 26) *polycnemus*, in quo membrana branchialis radios 5 ad 7 habet, 27) *theutys* et 28) *elops*. *Malacopterygiorum* claffis habet *apodes*: 29) *muraenam* 30) *gymnotum* 31) *anarrhicham* 32) *ſtromateum* et 33) *ammodytē*. *Iugulares* ſunt 34) *lepadogaſter* et 35) *gadus*. *Thoracici*: 36) *pleuroneſtes* 37) *echeneis* 38) *lepidopus*. *Abdominales*: 39) *loricaria* 40) *atherina* 41) *ſalmo* 42) *fiſtularia* 43) *eſox* 44) *argentina* 45) *clupea* 46) *exocoetus* 47) *cyprinus* 48) *cobitis* 49) *amia* et 50) *mormyrus*. In *ſtromatei* membrana branchioſtega Cl. Auctor 5 vel 6 radios numerat. *Lepadogaſter*, nouum genus, (*le barbier* ou *porte-ecuelle*) corpus habet cuneiforme: caput ouatum corpore latius planiusculum: roſtrum anſerinum: pinnas pectorales vtrunque binas, ventrales coalitas: ſcutum in pectore: membranam branchialem radiis quinque: aperturam tubuloſam. *Lepidopus* corpus enſiforme, argenteum, caput porrectum, membranam branchialem radiis ſeptem; ſquamas tres in toto corpore, duas ſcilicet pro pinnis ventralibus et tertiam pro pinna ani. In

*) In *ichthyologiae Maſſilienſis* praefatione.

tertia classe piscium *branchioflegorum* continentur
apodes: 51) *syngnathus* 52) *balistes* 53) *ostracion* 54)
tetrodon 55) *diodon*. *Iugularis*: 56) *lophius*. *Tho-*
racicus: 57) *cyclopterus*. *Abdominales*: 58) *centri-*
scus et 59) *pegasus*. In *syngnatho* feminis praegnan-
tibus abdomen pone anum tumere longitudinaliter-
que dehiscere in duas laminas longitudinales paral-
lelas planas, inter quas et caudam coaceruatim in-
cluduntur oua, Cl. Auctoris est obseruatio, quam
olim cum LINNAEO quoque*) communicauit. Su-
spicatur oua inter has laminas incubari. In *lophio*
membrana branchiostega radios nouem, in *centrisco*
vero tres habet. In figuris adiectis prater partes ex-
ternas et internas, in ipso opere descriptas, *triglae* spe-
cies, *lepidopus* et *lepadogaster* delineantur.

III.

GEORG ALBRECHT FRIED, *der Arzney-*
Gelahrheit Doktors und Geburtshelfers der Stadt
Strasburg, Anfangsgründe der Geburtshülfe zum
Gebrauche seiner Vorlesungen. Strasburg, in Ver-
lag bey I. G. Bauer, 1769. 8, 14 pl. tab. aen. 6.

i. e.

GEORGII ALBRECHT FRIED M. D. et Me-
dici obstetricii Argentoratensis elementa artis
obstetriciae in vsum praelectionum suarum.

Cum Cl. Auctor dignissimus celeberrimi medici
obstetricii FRIEDII filius et successor, inter
scriptores, qui artem obstetriciam germanica lingua
proposuerunt, nullum repererit, cuius libro com-
mode in praelectionibus suis vti posset, hoc demum
cepit consilium, vt ipse laborem hunc in se suscipe-
ret et eiusmodi compendium in vsum Auditorum

con-

*) Vid. Syft. Nat. Vol. I, P. I, p. 417.

conscriberet. Vfus vero est eo ordine, quem Cl. THEBESIUS olim in suis artis obstetriciae elementis *) secutus est. Composuit enim THEBESIUS, vt ipse in praefatione fatetur, suum librum ad normam institutionum manuscriptarum Cl. FRIEDII patris, cuius discipulus THEBESIUS fuit, a quo etiam ordine Cl. FRIEDIUS filius non discessit, omiſſis tamen iis capitibus, quibus de morbis puero- rum exponitur. Multa tamen emendauit, plurima addidit, nec pauca, quae ei superflua videbantur, reiecit.

Primo libro de *structura partium in feminis generationi inferuentium earumque usui* exponit, subtilioribus tamen anatomicis disquisitionibus omiſſis. Pelvis mensuras ita constituit, vt maximus superioris aperturae diameter inter duo ossa ilium ex Nostri obseruatione $4\frac{1}{2}$ pollices, minor inter synchondrosin ossium pubis et partem superiorem ossis sacri 4; diameter inferioris aperturae inter duo ossa ischium 4 et inter synchondrosin ossium pubis et apicem ossis coccygis etiam 4 pollices aequet; monet tamen in partu hoc os ita retrocedere, vt vltimus hic diameter nunc 5 pollicum sit. Infantis capitis minor diameter inter aurem vtramque $3\frac{1}{2}$, ab osse vero frontis ad os occipitis 4 pollicum est. Ex qua re et horum diametrorum cum diametris aperturarum pelvis comparisonem Cl. Auctor recte colligit, naturalem capitis fetus situm, dum per aperturam superiorem transit omnino mutari debere. Ossa pelvis in partu naturali capiti fetus transeunti in coniunctione sua cedere negatur. Nympharum vsus minime in eo consistit, vt lotii profluentis iter dirigant. Augent potius voluptatem in coitu et partus tempore dilationi

*) D. IO. EHRENF. THEBESII *Hebammenkunst*, Hirschberg und Liegnitz, 1756. 8. c. f. vid. Comment. Vol. VI, p 340 seq.

- tationi orificii vaginae inferuiunt. Vaginae longitudo in virginibus trium pollicum, diameter $1\frac{1}{2}$ pollicum est; in iis autem, quae saepius coiuerunt vel pepererunt, longitudo ad 7 et diameter ad tres pollices augetur. Puella, quae nondum experta est menstrua, tamen grauida fieri potest, si modo signa adsint, catamenia proxime accessura esse. Quae vero aetate iam prouecta est femina et nunquam menstrua experta est, ea ex Nostri obseruatione sterilis manet; quod tamen assertum uero uero semper assumi posset dubitamus. Ad coitum foecundum exigit, ut liquor quem feminae, salaces inprimis, sub coitu emittunt, eodem tempore profluat, quo a viro spermata ei aculatur; quod etiam dubium nobis esse videtur, cum non omnes feminas eiusmodi profluum ex-
p. 17. periri experientia doceat. Caput fetus sensim sub grauiditate versus orificium descendere, non fetum subito circumuolui sub fine septimi mensis, probat.
- Secundo libro *de grauiditate et de iis, quae in ea*
- p. 25. *obseruanda sunt* agitur. De partu serotino Cl. FRIED-
p. 44. dubie loquitur. Retentionem urinae primis grauiditatis mensibus haud raro ex compressione colli vesicae ab utero descendente accidere, notum est. Hinc Cl. Auctor pessario descensum uteri impediens grauidas plures ab hoc molestissimo malo ita liberauit, ut catheteris applicatione raro vel nunquam opus esset. Applicatione uero pessarii eam retentionem, quae ultimis grauiditatis mensibus accidit, non impediri posse monet.
- p. 55, Tertio libro Cl. FRIEDIUS *de partu* exponit. *Naturalem* vocat eum, qui capite praeuio fit, *praeternaturalem* uero illum, in quo alia pars fetus ad orificium descendit. *Facilis* ei est partus, qui naturae vel manuum ope facile terminari potest, *difficilis* uero, in quo fetus manuum ope extrahi debet vel
p. 68. instrumentis excutitur. Ouldianum situm atque directio-

rectionem capitis sub descensu per aperturas mutari defendit. In extractione placentae adhuc iubet, ut ob- p. 72.
stetrix, funiculi leui attractione solutionem et expul-
sionem placentae adiuuet, quam ob plura, quae in-
de oriri possunt damna, nos omitteremus. In so- p. 73.
lutione placentae totam manum immittit, quod ni-
mium dolorem facit, cum digiti et vola tantum suf-
ficient, inferior vero pars manus, quae longe crassior
est, commodè extra vterum adhuc manere queat.
Dubitamus quoque placentam vtero accrescere (*an-* p. 74.
wachsen) posse. In funiculo prolapso, ob situm capi- p. 94.
tis obliquum, versionem tantum pulsu in funiculo ad-
huc praesente instituit. Putamus tamen, eam com-
mode quoque in infante viuo applicari, et eius ope fe-
tus seruari posse, qui alias periissent. Smelliana forceps p. 97.
cuius hic mentio fit, recta tantum est, non ea, quae
ad Leuretianae modum incuruatur. Supra iam ad- p. 99.
duximus, Auctorem cum plurimis recentiorum putare,
caput fetus per superiorem aperturam ita descende-
re, ut facies eius et occiput ossa ilium, aures vero
os pubis et sacrum respiciant: in transitu autem capi-
tis per peluim et inferiorem aperturam hunc situm
ita mutari, ut facies nunc coccygis os respiciat, qua-
ratione in partu naturali semper fetum procedere
notum est. Ad hoc in forcipis applicatione, si caput
supra aperturam superiorem haereat, ita attendere iu-
bet, ut si facies iam in superiore apertura os sacrum
respiciat, illud forcipis ope in latus, et, si ad inferio-
rem aperturam deuenierit, iterum ad coccygem con-
uertatur. Crudele forte multis videbitur Auctoris p. 99.
Cl. consilium; si ossa capitis, quantum fieri possint,
compressa sint, caputque multum turgeat, in infante
viuo quoque perforationem, neglecta vltiore forci-
pis applicatione instituendam esse. Vix enim puta-
mus quemquam, vel in arte obstetricia iam satis exer-
citatum, tactu cognosci posse, vltiorem capitis com-
pressio-

pressionem impossibilem esse; nec facile quisquam negabit forcipis ope caput magis adhuc comprimisse. Quid vero tirones et empirici facient, si proprio eorum iudicio hoc committimus? nonne morae

p. 100. pertaes si omnia capita incuneata aperient? Perterebratione facta forcipis dentatae ope, quam foramini facto immittit, cranium comprehendit, quae cum SCHURERI

p. 102. forcipe *) conuenit. Si facies fetus versus lateralem partem peluis conuersa sit, Smellianam forcipem rectam ita applicat, ut vnum cochlear inter aurem et os pubis, alterum inter caput et os sacrum immittat; fetu vero usque ad inferiorem aperturam protracto,

p. 106. caput in naturalem demum situm conuertat. Inter signa fetus mortui, qui in vtero adhuc continetur, etiam refert: si ossa cranii ita sibi inuicem compressio- nis vi imposita sint, ut alterum super alterum emi- neat; quod paululum dubium nobis esse videtur. Re- gulas sub versione obseruandas, inter quas plures ele- gantes omnique attentione dignae sunt, omittimus.

p. 125. cum in compendio hic vix tradere queant. Fundam

p. 128. ad pedes in versione bacilli ope ducit. In dissec- tione, fetus caput, collo discisso, a trunco separat, trun- cum extrahit vnci ope et deinde caput. Partum fe- tus mortui semper difficilius procedere partu viui au- tumat, cum partes eiusmodi fetus laxae et molles vte- ro se contrahenti minus resistent. Signa, ex quibus fetus viuis vel mortuus post partum dignosci possit, eleganter proponit.

p. 167. Quartus liber de puerperio inscribitur. Lochia sub fine fluxus eorum mucosa, non lactea esse, contra nonnullos recentiorum monet. Puerperas, in quibus versionis ope fetus extractus fuerit, nullos vel par- uos tantum dolores post partum experiri Cl. FRIE- DIUS Auctor est.

Quinto

*) vid. WALLENBAUMII versionem observationum LEURE- TI p. 522 et tab. III. fig. 13. Confer. fig. 11 eiusd. tab.

Quinto tandem libro, quae circa neonatorum curam observanda sunt, breuiter explicantur. In tabulis aeneis adiectis delineantur: fella obstetricia **FRIEDII** patris, quae Deuenterianae correctionem sistit, lectulus **EIUSDEM**, **LEVRETI** forceps, forceps dentata **FRIEDII** filii, uncus incuruus **Smellianus** a **LEURETO** emendatus, eiusdem **LEURETI** perforatorium (*perce-crane à deux lames*) idemque instrumentum ab Auctore Cl. additi elateris ope egregie emendatum, **LEURETI** scalpellus ad operationem caesaream et instrumentum ad ligaturam polyporum vteri ab eo excogitatum, bacillus cuius ope Cl. Auctor fundam sub versione in vterum demittit, **FRIEDII** patris instrumentum in feminis, quae ob collum vesicae dilaceratum perpetuo vrinae stillicidio laborant, adhibendum, pessarium, cet.

IV.

PETRI CAMPER epistola ad Anatomicorum Principem Magnum **ALBINUM**. Groningae apud Henricum Crebas. 1767. 4. pl. 4. tab. aen. I.

Emissae huius epistolae occasionem pariter atque consilium satis perspectum habebunt Lectores, si haec tenuerint. Cl. **CAMPER** in demonstrationibus suis anatomico-pathologicis, quas alio loco indicauimus *) plures accusauerat anatomicos, quod in tabulis suis delineandis e pictorum regula agere et punctum opticum seu visus adhibere consueuissent. Huius consuetudinis exemplum inter alios commemorauerat **EUSTACHIUM** et Ill. **ALBINUM**, atque ne frustra id aut sine ratione dixisse videretur, indicauerat quoque, quae putaret tum in Eustachianis, tum in **Albi-**

*) Vol. I. vid. Com. nostr. Vol. X. p. 503. Vol. II. Vol. XIII. p. 270.

Albinianis tabulis incommoda inde fluxisse, quaeque ipsum mouissent, ut vulgarem et magis usitatam methodum, nempe architectorum modum delineandi praestantiorē indicaret. Id vero aegre non parum tulerat ALBINVS eiusque rei causa litteras ad CAMPERVM miserat, quibus de iniuria ipsi hac re facta conquestus fuerat. Inde factum est, ut Cel. CAMPERVS iudicium suum de ratione et regula, ad quam Albinianae et Eustachianae tabulae factae sunt, hac ipsa epistola defendere susciperet. Pluribus itaque exemplis studuit probare, non sine causa ita semet sentire. Ista vero exempla, cum sine comparatione tabularum ipsarum nullo modo intelligi, nec commode in epitomen redigi queant, nunc omittimus. Illustravit quoque totam hanc rem figura, in qua pars basis cerebri et medullae oblongatae architectorum more delineata, comparatur cum figura secunda tabulae decimae octauae EYSTACHII. In quo exemplo ostenditur, EYSTACHII tabulam pictorum more delineatam, nervis origines adsignare, quales re vera non habeant. Reliqua huius epistolae pars in eo occupatur, ut varios alios leuissimos errores in Albinianis tabulis deprehendendos indicet, quas tabulas Beatus Vir, nimis forte humanis viribus confidens perfectas omnibusque plane numeris absolutas et erroris prorsus expertes esse crediderat, ideoque iusto acrius semper defenderat. Ultima ad descriptionem, quam ALBINVS anno huius seculi vicesimo quinto de methodo Rauiana calculosos curandi dedit, pertinent, ubi asseruerat, ipsam vesicam proxime ad ceruicem eius incidendam esse *); quod, si de sola vesicae sectione sine ceruicis et prostatae laesione intelligendum esset, impossibile esse, plura multisque aegris fune-


*) vid. Demonstr. Orat. Pathol. L. II, p. 15. Com. nostr. Vol. XII, p. 274. Confer quoque ALBINI Annot. Acad. L. IV, p. 148. Com. nostr. Vol. eod. p. 646.

hæc experimenta docuerunt. CAMPERVS itaque ALBINI verba obscura esse dicit, nec vnquam eum in lectionibus suis eorum explicationem suppeditasse confirmat.

V.

S. ALBINI Academicarum Annotationum Liber octauus, de tabulis scriptisque suis oportunitate epistolae nuperae PETRI CAMPER V. Cl. Leidaë apud Io. Verbeek. 1768. 4. pl. II.

Totus hic liber annotationum contra præcedentem CAMPERI epistolam directus est, veluti ex ipso titulo patet. Tantum tamen abest, vt ea, quæ in Albinianis scriptis rerum et obseruationum præstantissima copia deprehenditur, hic quoque expectari possit, vt pauca tantum in hoc vltimo annotationum libro occurrant, quæ vltiore attentione vobis digna visa sint. Examinatur vero Camperia epistola, a verbo quasi ad verbum, et methodus, qua Albinianae tabulae confectæ sunt, omnibus viris defenditur. Quod ad descriptionem methodi Albinianæ attinet, docet ALBINUS Ill., se non de fossa vesica incidenda locutum esse, sed id potius voluisse, vt ceruicis quoque et prostatae sectio fieret. Quam operandi rationem licet varii Chirurghi non recte intellexerint, rectius tamen demonstratam esse GARENGETO, HEISTERO cet. nec hac de re CAMPERUM litem sibi mouere debuisse, ALBINUS docet.



VI.

Spicilegia zoologica, quibus nouae inprimis et
obscurae animalium species iconibus, descri-
ptionibus atque commentariis illustrantur cu-
ra P. S. PALLAS, fasciculus quintus. Be-
rolini apud G. A. Lange 1769. 4. pl. 5. tab.
aen. 5. Fasciculus sextus ibid. eod. pl. 4.
tab. aen. 5. Fasciculus septimus ibid. eod.
pl. 5¹/₂. tab. aen. 6. Fasciculus octauus 1770.
pl. 7. tab. aen. 5.

Ex praefatione, quarto fasciculo praefixa et Petro-
poli mense maio a. 1768 conscripta, intelligi-
mus, Cel. Auctorem, antequam iter per australem
Russiae Imperii prouincias iniret, in cuius vltiori
progressu ad Chinense nunc regnum iam venisse no-
uissimae relationes ex his terris testantur, sex fascicu-
los horum spicilegiorum *) ad prelum parasse et Be-
rolinum transmississe. Describuntur vero in qua-
tuor his, quos iam indicamus, fasciculis inter ali-
plura quoque animalia, quae Cel. Auctor in museo
Petropolitano vidit, a STELLERO quondam ex
Kamschatka eo translata, ignota antea vel perquam
obscura. Quintus et sextus fasciculus aues, septi-
mus vero et octauus pisces continent. In quarto
fasciculo de *alcarum* genere exponitur, cuius species
licet rostro insigniter a se inuicem discrepent, inter
mediis tamen speciebus coniunguntur. Omnes a-
cae conueniunt corporis anatina forma, id est obe-
et depressiuscula; rostro satis magno, sed breui
vtruncque conoideo, plerumque compresso et ful-
obliquis scabro; pedibus pone aequilibrium positi

p. i.

*) Quatuor priores fasciculos vide Comm. nostr. Vol.
XV. p. 491. sequ.

tridactylis palmatis. Alae pro corpore paruae, color corporis superius plerumque niger, inferius albus. Omnes praeterea *alcae* stolidae sunt, in cauer-
nis vel cuniculis excauatis nidulantur ac noctu lati-
cant, et ouum vnicum tantum ponunt, maximum.
Pertinent vero ad hoc genus: *alca arctica*, LINN.;
alca impennis, siue *pinguin arcticus*, L. cum qua specie Cl.
Auctor, quamquam rostri figura paullulum differunt,
phaethon them demersum et *diomedeam demersam* LINN.
coniungendos esse monet; *alca torda*, L. eiusque varie-
tas (an *alca pica* LINN. ?); *alca alce*, L. His cognitis
am speciebus nouae: *alca* scilicet *cirrhata*, quae cum p. 7.
alca arctica satis conuenit, *alca psittacula*, *alca cristatella*,
et *alca tetracula* adduntur, earumque descriptiones ico-
nibus illustrantur. Omnes vero ex Kamtschatka et mari
inter Asiam et Americam a STELLERO transmissae sunt. His additur duarum aliarum auium histo p. 28.
ria: *diomedae* scilicet *albatris* siue *exulantis* LINN.
et *cepphi lacteoli*. Et prior quidem auis, quae in
australi potissimum hemisphaerio reperiri solet, ex
STELLERI obseruationibus etiam quotannis ex
hoc hemisphaerio, hyemem ibidem faeuientem fu-
giens, ab Austro in Kamtschatkense mare venit et ibi-
dem per aliquot menses commoratur, non tamen ni-
lificat. Figuram Cl. PALLAS non addidit, cum
EDWARDI praestantissima sit. Monet vero quae-
dam de colorum varietate, quae inter has aues ex orien-
tali et australi mari allatas intercedit. *Cephus la-* p. 33.
steolus vero, qui ad *colymbos* LINNAEI pertinet,
a Cl. Auctore in Belgico littore semel tantum et
quidem mortuus repertus est.

Initium sexti fasciculi facit descriptio noui gene-
ris, quod Cl. Auctor *xanthorni* nomine insignit.
Icterus vocauit BRISSONIUS aues plurimas huc
pertinentes, quae LINNAEUS ad *Orioli* genus re-
tulit. Omnes huius generis species Americae pro- p. 2.

- priae sunt, et medium quasi inter *sturnos*, *oriolos* et *fringillas* genus constituunt. Sunt vero *xanthornis* aues mediae magnitudinis, quae ad *picarum* ordinem pertinent, et rostro recto, conico, subulato, vndique conuexo, acutissimo, integroque et in frontem angulo corneo excurrente instruuntur. Nares iis sunt paruulae oblongae, denudatae, ad imam rostri basis collocatae. Lingua angusta, canaliculata, profunde bifida, laciniis acutis; pili ad oris angulos vel ternarii vel nulli; pedes tetradactyli, digitis anticis ternis extimo medio basi accreto. Habitu corporis omnes conueniunt et, uti Cl. Auctor colligit, omnes quoque nidos in extremis arborum mirabili fabricae exstruunt, e fibris *tillandsiae usneoidis* compositos. Noua species hic proposita a Cl. Auctore *xanthornis decumanus* siue *maximus* vocatur. Sequitur *graculae longirostrae* Surinamensis auis descriptio, quam ad hoc genus pertinere, licet rostri figura quodammodo differat, Auctor pluribus demonstrat.
- p. 5. *manaci* porro *superbi*, qui ad *pipras* LINNAEI pertinet;
- p. 8. *alcedinis tridactylae* et *maximae*; *todi leucoccephali*; *anseris ruficollis* et *hyperborei* atque *anatis curvirostrae* et *anatis* STELLERI. *Alcedo tridactyla*, a SEBA iam et KLEINIO descripta fuit, sed pedum singularis structura a Nostro primum observata est. *Picus tridactylus* per totam Sibiriam inquilinus est et a MESSERSCHMIDIO iam in *ornithologia Sibirica* manuscripta descriptus est. D.
- p. 12. varietatibus in rostris auium observandis, quibus tirones ad novas species constituendas induci possunt.
- p. 17. atque de genere *todus* vocato in vniuersum, varietatibus lectu digna, hic monentur. *Picum semirostre* LINN. tantum monstrosam formam rostri exhibere asserit. *Anseris ruficollis* anatome breuiter ex MESSERSCHMIDII observationibus traditur. *Anser hyperboreus* stolidissima auis est et insigni copia quotannis

annis a Kamschadalis leuissimo artificio capitur. Aues et pisces quotannis ea potissimum loca repetere, ubi adultae antea nidificarunt et proles exclusa fuit, Cl. Auctor probat.

Septimo fasciculo primum ranae species describitur, quam Auctori nostro Cl. ELLER pharmacopoeus Lubecensis communicauit. Videtur vero ea esse rana, cuius ROESELIIUS mentionem tantum fecit *), qui eius descriptionem a Cl. I. C. D. SCHREBERO Professore Erlangensi accepit. Primus tamen fuit ELLERUS, qui mirandam huius ranae seu potius *bufonis* naturam, qua, ut chamaeleon, colores mutat, detegeret, quapropter etiam Cl. PALLAS *ranae variabilis* nomen ei tribuit. Color animalis eo, quo primum illud conspiciebat ELLERUS, tempore albus erat maculis latis praeasini seu graminei coloris verruculisque fuluis conspersus. Contactu vero inquietata toto corpore inflari visa est, et albus color simul in cinereum diuersissimum mutabatur, persistente macularum virore et verrucarum fuluedine. Somni autem tempore naturalis inter maculas albedo remanebat, color vero viridis macularum in cinereum abibat. Solis tandem ardor, quem animal maxime auersabatur, totius corporis colorem variegatum mutabat in uniformem cinereum. Ranam, quam SCHREBERUS torpentem inuenit, colorem pallide carneum inter maculas ostendisse, ex ROESELIO patet, ita ut omnino haec rarissima species, ob singularem hanc colores mutandi facultatem, (quam tamen et in aliis amphibis reptilibus, licet minori gradu, reperiri forte futura tempora docebunt) nomine *variabilis* digna omnino iudicanda sit. Reliqua huius fasciculi piscium rarissimorum descriptionibus dicata sunt. Sunt vero pisces, qui hic proponuntur: *cyclopterus dentex*, cy-P. 6.

Dd 3

clo-

*) Hist. ranarum. Sect. VII. Cap. I. p. 108.

- clopterus minutus*, *cyclopterus ventricosus*, et *cyclopterus gelatinosus*, qui omnes Katschatici maris incolae sunt; ultimus escae minime idoneus venenati quid
 p. 26. alere videtur; *scorpaena* porro *didactyla*, paradoxae formae piscis, ex oceano Indico allatus; *cottus Iaponicus*; *gymnotus albifrons*, qui a LINNAEO iam in Syst. Edit. XII. describitur, cuius tamen descriptio hic emendatur. E regione pinnae ani ex dorso cir-
 p. 40. rhus longissimus dependet. Ultimus piscis est *gymnotus notopterus*, in cuius dorso pinna septem radio-
 rum inuenitur.

- Iam ad octauum fasciculum transimus, in quo
 p. 1. sequentes pisces recensentur. *Gobius SCHOSSE-RI*, in quo, vt in duabus sequentibus speciebus, oculi extra cranium protuberant, in vertice summo positi; *Gobius KOELREUTERI* in *Nou. Comm. Petropol.* Vol. VIII. p. 421 iam descriptus; *gobius BOTTARTI*;
 p. 19. *gobius lagocephalus*; *gobius cyprinoides*; *coriphaena velifera*, enormi amplitudine pinnarum dorsalis et analis insignis, quae forte volatui piscis inferuiunt, *coriphaena fasciolata*, *callyonymus ocellatus*; *callyonymus sagitta*; *fistularia paradoxa*, quae medium locum inter *syngnathum hippocampum* et *fistularias* tenet; *centriscus velitaris*, quem habitu et fabrica euincire docet Auctor Cl., *centriscos* piscibus, non amphibiiis nantibus, annumerandos esse; *diodon mola* a KOELREUTERO etiam in *Nou. Comm. Petrop.* Vol. X p. 440 descriptus, quem LINNAEUS pro varietate *molae SALVIANI* habuit; *sparus insidiator*, qui ore seu maxillis emissilibus animalcula capit; *labrus trichopterus* a KOELREUTERO iam *Nou. Comm. Petrop.* Vol. IX p. 452 propositus; *gadus blennioides*; *salmo gasteropelecus*, seu *gasteropelecus GRONOVII*, quem salmonibus adnumerandum esse, pinna adiposa
 p. 33. dorsalis docet, et tandem *salmo rhombeus*. Inter syngnathos omnes, quos Auctor Cl. vidit, nulli mares fue-

fuerunt, ita vt dubitet, an dentur masculi huius speciei. Pisces non classe, sed ordine tantum ab amphibiiis differre, Cl. Auctor ex branchiarum structura, qua sensim ad *amphibia* reliqua *natantia* imo *pedata* et ad *serpentia* accedunt, probat.

VII.

*Schwaben zur Arzneygelahrheit und Naturkunde.
Erster Band. Nördlingen. 1769. 8. Bog. 18.*

i. e.

*Sueuia ad medicinam et historiam naturalem.
Vol. I.*

Debemus hoc opus, cuius continuatio promittitur, assiduitati atque studio Cl. GESNERI, Nordlingensis in Sueuia physici. Offert hic primam partem, quae observationes medico practicas complectitur, et hoc quoque titulo *) prodiit. Antequam vero ad eius summam, quam hic tradere animus est, deueniamus, instituti huius rationem reddere liceat. In continuatione Cl. Auctor ea, quae medicinam et scientiam naturalem vtriusque historiam attinent, partim a se, partim ab aliis elaborata, colliget, nec non summam libellorum Sueuicorum dignorum, quae recenseantur, breuiter tradet. Quod medicinam spectat, curabitur aequae theoria ac praxis, ac imprimis ea theoria, qua praxis nititur. Nec hic vtilis practicae hypotheses, nec eae psychologicae contemplationes, in quas medici cognitio paullo intimius penetrare potest, ac philosophus, plane omittentur. In historia naturali vero ad Sueuica potissimum producta et ad eorum affinitatem cum chemia, physica et oeconomia respicietur.

Dd 4

I) De

*) D. IO. AUGUST. PHILIPP. GESNER *Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneygelahrheit. Nördlingen. 1769. 8.*

p. 1.

1) *De dysenteria Nordlingensi 1766 epidemica.*
 Nulla febre, nullaque inflammatione praegressa, nec ventriculo duodenoque laesis appetituque non prorsus imminuto, excrementa cum sincero sanguine, qui saepenumero et sine excrementis effluebat, solito cum foetore et sine tenesmo ac doloribus copiose emittebantur. Alii magnis doloribus vexabantur, excrementa cum cruore magis foetebant, fusca, viridia et atra apparebant, ubi prognosis erat valde dubia. Carnium usum spernebant aegri, vegetabilibus tamen et lacte vires per quatuor et sex hebdomadas sustentabantur. Alii rursus de nullis conquerebantur doloribus, etiamsi deiectiones erant copiosae, raro autem cum sanguine, nec multo, coniunctae. Appetitus erat plane prostratus, nec potulenta cupiebant aegri. Ab initio sphincter ani visus non destituebatur, qua paulo post fracta, involuntarie excrementa effluebant cum frigore membrorum, quod, tribus, quinque, ad summum septem diebus praeterlapsis, mors sequitur. Dispescuit hanc ob rem hanc dysenteriam in tres species, quarum prima neminem, altera nonnullos et tertia omnes interimebat. Euacuantia, et inter quae rhabarbaro praefert oleum, sal et manna, opium, antiseptica et tandem roborantia adhibita sunt remedia. Gummi Arabicum et salab radix frustra dedit.

p. 31.

2) *De phtisi.* Cum plurima pulmonum ulcera, phtisin pulmonalem efficientia, de qua hic differitur, in superficie pulmonum et ulcera artificialia, externe facta et tum, cum vlcus internum non detegebatur, utilia esse Noster autumet, incisiones pectoris in hoc morbo magnopere laudat. Iniectiones suadet et cortici Peruviano praefert balsamica. Porro et observavit Noster, aegros, sitos in latere aegrotato, maiorem sentire molestiam, quam in latere sano.

no.

no. Sinistram manum in duobus, qui sinistro pulmone laborabant, tumidam vidit. In aliis pedes tuebant quidem, sed ille, cuius latus aegrotabat, magis.

3) *De morbo nigro.* Primarium morbi nigri p. 55. symptoma est materia plus minus atra per os siue per aluum eliminata. Eam varii coloris enim Noster vidit. Porro frigus membrorum cum sudore frigido, quod symptoma, quamquam alii neglexerunt, aequè certum est in hoc morbo, lipothymia et pulsus debilis. His accedunt dolores et tormina abdominis cum anxietate praecordiorum coniuncta. Inter medicamenta laudat Noster aequè vt Cl. MEDICUS magnesia cum cremore tartari commixtionem. Id quod medicamentum biliosis morbis admodum conuenire videtur Nostro.

4) *De peripneumonia.* Vbi non semper mollem p. 80. pulsum, quem aliè vrgent, obseruauit. Quapropter disputat Cl. Auctor de molli et duro pulsu in peripneumonia, variorum Auctorum sententias, hac de re latas, colligit et examinat. Peripneumonia dispescitur in siccam et humidam. Haec est periculosior illa. Caeterum dulcia caute sunt danda, et gummi ammoniacum praecipue in hoc morbo laudat.

5) *De pleuritide in aestate.* Mense augusto 1766 p. 108. pleuritide sicca laborabat iuuenis, qua occasione Cl. Auctor quaedam de inflammatione, febre et crusta inflammatoria proponit. Inter causas inflammationis externas refert refrigerium, in quibus morbis sanguis inflammatorius saepenumero sine dolore fixo et febre adest. Inflammationes verae in viuis vasis sanguiferis sunt, et quae in contextu celluloso aliisque vasis deprehenduntur, sunt continuationes verae

inflammationis. Ita namque obstructionem vasorum sequitur inflammatio, suppuratio, gangraena et extrauasio sanguinis in contextum cellulosum. Quod autem crustam inflammatoriam attinet, eam dubiam Noster reddit. Grauidae enim, asthmatici tussi humida laborantes, tumoribus chronicis affecti saepenumero saltem mentiuntur crustam inflammatoriam in sanguine e vasis eorum misso.

p. 131. 6) *De rheumatismo.* Quo cum et sine febre descripto, observationes huc pertinentes Cl. Auctor collegit. Diurnos vagos rheumaticos dolores leniuit purpura scorbutica chronica. Rheumatismum calidum discutiebatur febre urticata. Cuius sede erat sub mamma dextra, et excretio cutanea occupabat totum dextrum latus a regione subscapulari usque ad inguina. Alium, brachii motum impediens, vidit Noster interne abire in suppurationem etiamsi coeruleae maculae externae gangraenam minabantur. Vesicatoriis adscribit Noster vim antispasmodicam et carminatiuam. Nec non extracto aronis tribuit resolutionem sine stimulo et expectorationem sine relaxatione. Confecit hoc extractum ex radicibus et foliis, illud vero, quod ex foliis foliis praeparatur, magis stimulare, minus vero expectorationi inferuire obseruauit.

p. 156. 7) *De glandularum morbis.* Puero, variolis et morbillis feliciter superatis, circa finem anni decimi quarti, parotis dextra, nec non aliae glandulae ante et post aurem et circa collum tuebant. His accedebat in deglutitione boli et haustus magni sensatio molesta, quam pariter ut et tumores per quinque annos habuerat. Tum lenem aliquando ibi animaduertit pressionem, ubi resistantiam in deglutitione sensit, quem sequitur ronchus cum eiectione mucatri

atri, vti aeger referebat. Hac mucī autem grisei, tenacis, pellucidi, striisque atris immixti eiectione per medicamenta promota et continuata, tumores sensim sensimque euanuerunt.

8) *Exemplum morbi neruosi.* Porro obseruauit p. 163. Noster in iuvene tredecim annorum variarum corporis partium spasmos, ex impuritate infimi ventris ortos, et ex consensu neruorum abdominalium cum reliquis neruis a Nostro explicatos, qui mox dextrum, mox sinistrum corporis latus inuadebant, et ab vna parte in alteram, vnius tamen modo lateris, transibant. Incipiebat nimirum oculus debilitari et obscurari, quo restituto, in vna nasi ala eiusdem lateris frigus leuiusculum, motus vermicularis insecti parui instar, tensio in et externa, tum in labio superiori et gingiuis, in lingua, faucibus animaduerebatur. His partibus relictis, digiti minimi apicem stupor occupabat, dein reliquos digitos, vt totam manum vsque ad cubitum. Haec migratio durabat per quartam propemodum horae partem.

9. 10) *De pinguedine in vrinae superficie et euomita.* In vrina iuuenis sani cuticula pinguis, quae et lateribus matulae adhaerebat, obseruabatur et vir satis insignem pinguedinis, quae optimi adipis albedinem et duritiem habuit, euomuit copiam. Quae eiecta, cardialgia, de qua antea conquestus erat aeger, prorsus euanuit.

11. 12. 13. 14. 15. 16.) *Erysipelas* finiebatur p. 179. *ulcere auris*, cuius suppuratione imminuta, coecitas subsequerebatur, quae, noua suppuratione excitata, euanuit. *Scarlatinam sine febre* Noster vidit. Porro *naeuum* in tertia post partum hebdomate obseruauit, et puerum, *chorea St. Viti* laborantem, curauit. Nec

Nec non in puerperis duabus *delirium et mania* cessarunt. In delirio camphora praecipue utilis, et in mania, multis frustra adhibitis remediis, lochiisque ac paulo post et menstruis rite fluentibus, supermanente, pilulas Starkeyanas polychrestas, quibus aegra sanitati penitus est restituta, valdopere laudat.

p. 194. 17) *De colica spasmodica.* Quacum hernia et alui obstructio erant coniuncta. Praeter opium, quod dolores quidem leniebat, obstructionem autem augebat, nihil erat, quod iuaret. Dedit hanc obcausam extracti hyoscyami tria grana vna vice, quod aluius liberior non solum est facta, sed haemorrhoides, quae huc usque tantum moliebantur, per octo dies fluebant cum aegri leuamine.

p. 196. 18. 19) *De pertinaci arthritide.* In qua nec non in hysterico malo extractum napelli ab initio secundum STÖRCKII methodum, dein granum semister de die cum fructu dedit. In aliis sex grana, vna vice data, nihil effecerunt. Infusum foliorum aurantii in epilepsia utile fuit.

p. 199. 20) *De tussi epidemica Nordlingensi infantum.* Aestate 1768 finita, haec grassabatur, quae per duos menses quadraginta et quod excurrit, infantes interimebat. Erat vera tussis ferina, quae, variis remediis frustra a Nostro propinatis, optime vsui pilularum, ex moscho et extracto nicotianae compositarum, cedebat.

p. 204. 21) Finem harum observationum faciunt tentamina cum *cicuta*, interne et externe a Nostro adhibita. Mammam cancrösam nihil iuuit extractum cicutae, nec compescuit perpetuam fere abscessuum, in contextu celluloso iuuenis mox huc, mox illuc for-

formatorum, fanatuque difficillimorum generationem. In ganglio autem, abdominis tumoribus, arthritide, in genuum tumoribus et vlceribus, in glandulis colli obduratis, in tumore subaxillari puerperae, in parotidis tumore, in pertinaci inflammatione ac tumore manus et scabie humida multum praestitit cicuta.

In acerbis doloribus digiti et cum rigiditate eius p. 220. coniunctis, post inflammationem totius manus relictis, applicuit Noster magnetem artificialem felici cum successu. Quamquam enim ab initio dolores usque ad animi propemodum deliquium augebantur, et per totam extremitatem superiorem usque ad mammam vagabantur, tamen, eo ter applicato, dolores sensim euanescebant, cum digiti mobilitate et totius manus integritate.

VIII.

JOSEPH IACOB PLENCK *Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzneykunst. 1ster Theil. Wien zu finden bey Rudolph Gräffer. 1769. 8. Bog. 12 $\frac{1}{2}$.*

i. e.

JOSEPH. IACOB. PLENCK collectio observationum, chirurgiam spectantium. Pars I.

Variis causis, quibus chirurgi ab observationibus dignis, quae posteritati relinquantur, vulgandis detinentur, a Nostro memoratis et refutatis, Cl. PLENCK variis scriptis iam clarus, secum constituit, chirurgicas observationes in continuato quodam opere cum viris, hac arte clavis, communicare. Ad quod opus eo utilius atque perfectius reddendum Cl. Auctor inuitat et alios eruditos, qui rogantur

tur, suas obseruationes tradere bibliopolae huic, atque pollicetur, eas ita, vti sunt traditae, inferere. Facit hinc Cl. Auctor cum hac, cuius summam cum Lectoribus communicabimus, parte huius operis initium. Quae quamquam praeter nonnullas theorias, quarum suo loco mentionem faciemus, et iudicio Lectorum submittemus, nouitatem rerum non adeo prodit, tamen vtilia, ex aliis Auctoribus mutuata et Nostri obseruationibus partim illustrata, partim correctata in se continet.

P. 15. 1) *De optima methodo, vtilis chirurgos reipublicae tradendi.* Ac primum quidem agitur a Cl. Auctore de iis, quae scitu sunt necessaria ei, qui chirurgiae destinatus est. Huc pertinet linguarum cognitio, vbi Cl. Auctor solummodo latinam vrget. Dein ad ea, quae chirurgum callere oporteat, progreditur.

P. 59. 2) *De fulguris ac tonitru effectibus in corpore humano.* Cum ante aliquot annos fulgure tactos atque interfectos inspicere oporteret, nec vllam laesionem externam Noster animaduerneret, paulo accuratius in hanc rem inquisiuit Auctorumque obseruationes, huc spectantes, cum recentiorum physica contulit indeque hunc commentarium conscripsit. Effectibus fulguris itaque omnino consideratis, eos potissimum Noster, qui in humanum cadunt corpus, contemplatur. Atque hos persequitur hoc ordine: fulgur interficit saepenumero sine conspicua corporis laesione; non raro vnus interimitur sine alterius laesione; interdum multos humo proster nit sine vllius destructione; oriuntur sugillationes in cute et in aliis corporis cavitatibus; relinquit paralyses, ac vulnera, sclopetorum ad instar; ossa sine mollium partium labe diffringuntur et vestimenta,
mem-

membra, cutis ac crines comburuntur a fulgure; porro ab eo saepe fit totius corporis incineratio et metallorum solutio.

Materia fulguris est materia electrica. Quo fun- p. 67.
damento nititur Noster ad effectus iam commemoratos fulguris explicandos. Materia enim electrica, quam celerrime in solidissimas penetrat partes, atque, quidquid resistit, disrumpit, nec non fluidas partes summo opere expandit. Quod si itaque electrica aut fulguris materia humanum tangit corpus, tum omnes humores in vasis suis praeter modum expanduntur. Quo facto, vasa dilatantur, relaxantur, non raro rumpuntur, inde sugillationes et extrauersiones sanguinis in variis corporis partibus fulmine tactorum sequuntur. Quod vasa hic patiuntur eorumque fluida in se continentia, id quoque in nervos eorumque fluidum, in quos pariter ac in alias corporis partes agit tonitru et fulgur, cadit. Quibus nimirum paralyti affectis eorumque sensibilitate orbata, irritabilitas organorum vitalium est sublata, sine qua nulla est vita.

His demonstratis, singulos, a nobis supra indi- P. 93.
catos tonitru effectus persequitur et exempla, eosdem illustrantia, ex variis Auctoribus Noster colligit, tandemque curam addit, quam breuiter hic trademus. Cum vero hi effectus partim totum corpus, partim quasdam corporis solummodo tangant partes, curationem illorum et vniuersalem et particularem esse oportet. Curatio itaque vniuersalis cernitur in vasis euacuandis, roborandis et electrica materia e corpore eliminanda. Primum fit venaesectio et laxantibus antiphlogisticis, alterum cortice Peruuiano et tertium absorptione materiae electricae. Hanc absorptionem iuuant, vti Nostro videtur, omnia martialia cum cortice Peruuiano et remediis antiphlogisticis mixta. Quemadmodum enim

enim ferrum omnino, materiam electricam ad se trahit, vti recentiores docent, sic, in et externis martialibus remediis adhibitis, his miseris in hunc modum opitulari Noster opinatur.

p. 96. Haecenus de vniuersali, nunc de particulari curatione videamus. Paralyfes postulant cantharides epithemata ex vino seu aceto, aqua diluto, in quibus globuli martiales sunt soluti. Irritabilitate ac sensibilitate imminuta, deliquioque animi subsequente anodyna, spirituoſa excitantia iuuant. Atque ita singulis laesionibus in et externis ita, vti chirurgi praecipit, et Nostri hypothesis suadet, prospiciendum est. Tandem rationem, cur, vti et HUXHAMUS iam obseruauit, externe tonitru tacti facilius resipiscant, in eo posuit, quod fortasse materia in organa vitalia non penetrauerit. Caeterum, ii, qui hoc experti sunt, optimum barometrum in suis corporibus habent.

p. 99. 3. *Tentamen nouae theoriae effectuum, quos globulus, ex tormento explosus, in aerem impingendo edit* (*Luftstreiffschüsse*). Variis obseruationibus, hanc rem illustrantibus, a Nostro praemissis, ratiocinando eandem persequitur, vbi nec totam hanc rem esse negandam, nec ad impulsum globulorum, vti LE VACHER *) placuit, respiciendum, sed in potentiores vim, quam globulo ipsi inesse oporteat, inquirendum esse arbitratur. Atque hanc vim quae-rit Noster in electricitate cum globulo bellico communicata. Quod si enim globulus per cylindrum tormenti bellici fortissimo impetu atque validissima vi truditur, hac frictione celeri quidem, attamen fortissima, fieri debet electricus. Accedit et hoc, quod globuli hi bellici ex ferro sint constructi illud-que

*) Mem. de l'Acad. roy. de chirurg. Tom. IV. p. 22. à Paris. 1768. 4. et Comm. nostr. Vol. XVI. p. 8.

que ad materiam electricam deriuandam et declinandam sit pronissimum, et quod horum globulorum, validissima vi propulforum, effectus cum fulguris et electricae materiae effectibus, quam accuratissime conueniant. Id quod a Nostro, accurata comparatione effectuum, a fulgure ac tonitru productorum et supra a nobis indicatorum *) cum globulorum, ex tormentis bellicis eiektorum, effectibus instituta, studiose demonstratur. Rebus itaque sic se habentibus, adducitur Noster, vt credat, exire ex hoc globulo, e tormento bellico validissime protruso materieque electrica imbuto, scintillam electricam, quae intret et laedat illas corporis partes, quas propius progreditur.

Hac itaque theoria defensa et contra dubitationes, quas Cl. Auctor ipse fecit ac refellit, tuita, ad methodum horum effectuum sanandorum deuenit. Incisione, si opus est, facta et extrahato sanguine separato, suadet fomenta non nimis calida ex aqua seu leni oxycrate, in quo globulus martialis solutus est, ad inflammationem arcendam, dolores leniendos et ad electricam materiam e vulnere attrahendam. Spiritum vini, cum non solum augeat dolores, sed impediat suppurationem et promoueat gangraenam, nec non emollientia epithemata prorsus reiecit. Interne laudat ab initio antiphlogistica, dein, suppuratione imminente, corticem Peruvianum cum extracto martis pomato. Reliquarum praeterea laesionum, quas inde oriri oportet, in vasis e. c. neruis, ossibus e. f. p. curatio ex chirurgia omnino diiudicanda est.

4) *De usu opii chirurgico.* Annititur Noster ex p. 143. acri opii, quem sentit lingua, sapore, et ex effectui
irritan-

*) vid. Comment. nostr. h. Vol. p. 430.

irritante, si externe applicatur, demonstrare, illud ad irritantia, dolorem, aestum, ut inflammationem efficientia remedia, potius esse referendum, quam ad refrigerantia ac stupefacientia, ideoque Ei opii coniunctio cum irritantibus atque causticis ad sensibilitatem imminuendam valde absona videtur. Ex effectibus itaque opii, a Nostro recensitis, e. c. in cute sana, in partibus inflammatis, in vulneribus, et in hisque venenatis, in spasmodis, a vulnere proficiscens, in ossium fracturis, ante et post operationes chirurgicas, in herniis incarceratis, in cancro, in odontalgia, apparet, opium nec refrigerans, nec stupefaciens, sed acre, calidum et irritans esse remedium; illudque in omni omnino inflammatione nocere. Quapropter illius usum in odontalgia, cum inflammatione coniuncta, reiecit, in serosa autem atque rheumatica, quam irritando et salivationem excitando iuvat, laudibus extollit. Porro in ossium fracturis interne adhibitum opium non lenit convulsiones, sed auget inflammationem et accelerat gangraenam ac sphacelum. Opii usum ante et post operationem chirurgicam reiecit, et in cancro mortem praecipitare monet.

p. 167. Caeterum non negat anodynam et stupefacientem opii virtutem. Cum autem illa solummodo a volatilibus eius partibus proficiscatur, eaeque a poris cutis parum inhalentur maximamque partem in auras avolent, non potest ille effectus opii, si externe applicatur, expectari. Interne autem opio exhibitum, praeter eius anodynam et antispasmodicam virtutem hac facultate est praeditum nervos atque vasa irritandi et humorum motus augendi. Omnia autem omnino, quae hic de opii legimus externo usu, reperimus quoque in materia chirurgica *) a Nostro nuper edita.

5) Ob-

*) vid. E I U S D. materia chirurgica oder Lehre von den Wund-

5) *Observationes de vulnere diaphragmatis.* Vul-p. 169.
 nere pectoris quatuor digitorum lato, a spina dorsi
 inter sextam et septimam costam veram, inflicto,
 aeger ab initio nihil dolorum sentiebat, dormiebat
 bene et crastino die ad labores consuetos se confere-
 bat. Versus horam autem huius diei decimam atro-
 cissimos experiebatur dolores, qui subinde augeban-
 tur, nec villo remedio cedebant ac sequentem no-
 ctē fere totam perdurabant, quibus remissis, ae-
 ger iterum dormiebat. Tum mane pulsus febrem
 indicabat et feri, sanguine tincti, vnciae duae emana-
 bant e vulnere. Postea erat difficilior respiratio, at-
 que aeger dolorem magnum sub vulnere sentiebat,
 qui, remediis in et externis adhibitis, non cedebat,
 sed in deglutitione et profunda respiratione cresce-
 bat. Tercio die respiratio magis magisque retar-
 dabatur, abdomen apparebat tumidum, nec febris,
 nec dolor cessabant. Atque sic, symptomatibus au-
 ctis, die sexto aeger subito est mortuus.

Cadauere aperto, sinistrorsum in media prope-P. 175.
 modum diaphragmatis et eius musculosa pariter, ac
 aponeurotica parte vulnus vnus pollicis detegeba-
 tur. Per quod transibat coli aliqua pars, quae
 sphacelosa erat et turgentibus scatebat vasis. At-
 que haec incarcerationio intestini symptomata ac mor-
 tem ipsam effecerunt. Cum enim in hoc aegroto
 nec delirium, nec singultus, neque tussis, neque ri-
 sus Sardonicus, nec sternutatio, nec vllum symptoma,
 quod diaphragmatis laesionem proderet, adessent, et
 alii sanationem vulnerum diaphragmatis sint largiti;
 haec vulnera, nisi viscus abdominis per vulnus pre-
 mitur, posse sanari, inprimis si musculosa eius pars
 est vulnerata, et spasmus caninum, qui sequitur
 laesionem diaphragmatis, vti nonnulli obseruarunt,

E e 2

non

*Wärckungen der in der Wundlarzneey gebräuchlichen
 Heilmittel. Wien. 1771. 8. p. 376.*

non pendere a laesa aponeurotica diaphragmatis parte, sed a neruo laeso, Noster arbitratur.

p. 179. 6) *De usu corticis Peruuiani chirurgico* *). Col-
legit hic Cl. Auctor exempla, vbi cortex est adhibi-
tus, nimirum in gangraena humida atque sphacelo,
in suppuratione, in sanandis vulneribus ac vlceribus,
in carcinomate, in morbis scrophulosis, in haemor-
rhagiis, in putridis febribus, spasms, morbis oculi,
in tumoribus induratis, veris inflammationibus, gan-
graena sicca atque huius medicamenti cominoda et
incominoda recenset. His praemisit disquisitionem
partium, corticem constituentium, ex qua hoc so-
lum annotare volumus: particulas ferreas inesse cor-
tici demonstrat Noster ex eo, quod magnes corti-
cem attrahere dicat.

IX.

Mémoire sur les argilles, ou recherches et ex-
periences chymiques et physiques sur la na-
ture des terres les plus propres a l'agricultu-
re et sur les moyens, de fertiliser celles, qui
sont steriles. Par Mr. BAUME'. A Paris
chez Lacombe. 1770. 8. Pl. 7.

h. e.

Commentatio de argilla, seu disquisitiones et
experimenta chemica nec non physica, de
natura terrarum, ad agriculturam aptissima-
rum, deque methodo, terras, quae steriles
sunt, fertiles reddendi. Auctore Cl. BAUME'.

Commentatio haec, vti Cl. Auctor in praefatio-
ne notat, cum aliis de praemio, quod Acade-
mia

*) Eadem a Cl. Auctore sunt repetita in materia chi-
rurgica supra iam memorata p. 280.

mia Burdigalensis pro explicanda quaestione de argilla in usum agriculturae chemice disquirenda ad annum 1767. constituerat, certauit, neque tamen obtinuit. Conqueritur autem Cl. Auctor, ambitum huius quaestionis nimis amplum esse, et academiam melius egisse, si quaestionem in duas diuideret, duplexque praemium constitueret. Quaestio autem haec fuit: *Quae sint principia argillae constitutiuæ, et mutationes naturales, quas ea patitur, et quae sit methodus, ad quam argilla fertilis reddi possit.* Cum videret Noster, quaestionem hanc ex tribus memoris constare, tractationem quoque in tres partes diuisit. Primo nimirum ostendit, quae sint argillae partes constitutivæ, deinde mutationes naturales, quas patitur argilla, pertractat, tandem methodum, ad quam argilla fertilis reddi possit, explicat.

Argillam ex terra vitrescibili, cum acido vitrio- p. 4.
lico coniuncta, constare, per experimenta chemica probare annititur, ita tamen, ut pro diuersis argillae speciebus diuersam dicti acidi copiam, in aliis maiorem, in aliis contra minorem animaduerneret. In vniuersum tamen, acidum vitriolicum argillis coloratis maiori semper in copia inesse, quam albis, easque semper minus tenaces minusque glutinosas, quam coloratas, esse notat. In causas inquirens Noster, cur argillae albae minus glutinosae sint, primo ostendit, defectum hunc eo deducendum esse, quod molecule earundem minus subtiles fereque semper cum magna quantitate micae commixtae sint, qua in re tamen Cl. Auctori assentiri non possumus, siquidem manifesta exempla argillae albae proferunt, quae partes subtilissimas et ab omni micae interpositione liberas ostendunt. Altera causa, quam addit, magis probabilior videtur, si dicit, eiusmodi argillas naturam sensim mutatam ostendere, et acidum earum quoad partem euanuisse, ita, ut cha-

raſter argillae ſenſim paulatimque ceſſare incipiat. Glutinoſam itaque et tenacem argillarum indolem extremae molecularum diuiſioni, et ſtatui ſalino adſcribit, atque ob has cauſſas argillam ad retinendam aquam idoneam fieri, autumat. Ad phlogiſton illud ſubtiliſſimum, argillis maiori minoriue copia inhaerens, non attendit Cl. Auſtor, licet per experientiam edoſti nobis perſuadeamus, hoc omnino cum acido vitriolico coniunctum ad glutinoſam tenacemque argillarum indolem, multum conferre.

p. 12.

Sed audiamus argumenta, per quae ſtatum argillae ſalinum et acidi vitriolici praesentiam probare ſtudet Noſter. Argillam cum nitro et rurfus cum ſale marino commiſcuit, et deſtillationi ſubiecit, ſicque ſpiritum nitri et ſpiritum ſalis prodire, ex capite vero mortuo, vel arcanum duplicatum, vel ſal mirabile obtineri, perhibet, maniſeſto indicio, quod acidum vitriolicum, ex argilla proveniens, cum alcali nitri et ſalis connubium inierint. Immo, quod magis mirandum, ſex vncias porcellanae chinenſis, in pulverem redactae, cum vncia vna nitri commixtas deſtillationi ſubiecit, et ad primum ſtatim ignis gradum vapores acidi rubros tranſiiſſe, animaduertit. Itaque acidum vitriolicum, licet vaſa porcellana igne fortiffimo coſta ſint, ad minimum tamen quoad partem vaſis iſtis adhuc inhaerere, coniicit. Cum alcali fixo et carbonum pulvere argillam mixtam et fuſam hepar ſulphuris largiri, ex quo ſulphur praecipitari poſſit, praehibet. Argilla, vt porro oſtendit Noſter, aqua ſaepius decoſta, poſthac colata et euaporationi ſpontaneae relicta, materiam puluerulentam cum parvis cryſtallis ſquamofiſ, micae inſtar, remixtam praebet; caeterum aqua cum argilla decoſta ſaporem fatuum et durum, vt durae fontium Pariſienſium aquae, excitat. Ex decoſta aqua, ſi alcali fixum ei additur, terra alba praecipitatur, quae ſiccata terrae aluminis

nis similis est; liquor vero, post praecipitationem superstes, si euaporatur, tartarum vitriolatum praebet. Ex his itaque, argillam substantiam salinam, ex terra et acido vitriolico compositam esse, colligitur.

Terram hanc eiusdem naturae esse, ac terram p. 22. aluminis, experimenta euincunt. Si terra aluminis, per alcali fixum ex alumine praecipitata siccatur et igni exponitur, sonitum crepitantem ea excitat; humida adhuc glutinosa et tenax est, aquam fortissime retinet ignique fusorio exposita non funditur, fortissimo igni resistit, cumque aequalibus partibus cretae igni exposita in vitrum non verti dicitur. Eadem experimenta cum terra, ex decoctione aquae cum argilla praecipitata, si instituuntur, eadem phaenomena praebent. Si porro quatuor vnciae terrae aluminis cum duabus vncis aluminis decoquuntur, decoctio saporem aluminosum vltro non excitat, sed saporem aquae crudae fontium Parisiensium habet, sique eadem decoctio euaporationi spontaneae in aere libero exponitur, post aliquot menses crystallos paruas, squamosas, vt argilla, cum aqua decocta praebet. Si insuper argilla cum acido vitriolico diluto coquitur, et euaporationi spontaneae posthac relinquitur, crystalli aluminis perfectae obtinentur. Argillam cum acido nitri vel acido salis digestam, post longum tempus liquores tinctos praebuisse, hosque euaporationi spontaneae relictos, crystallos aluminis dedisse, Noster perhibet. Eadem phaenomena obseruari, si terra aluminis cum acido nitri vel acido salis digeratur, asserit, et ex cunctis hisce experimentis terram aluminis, terramque argillae, per acida solutam, vnius eiusdemque naturae esse, concludit.

Quod ad naturam terrae, ex argilla separatae, p 36. eademque terrae, ex alumine obtentae, attinet, easdem naturae vitrescibilis esse, et eandem indolem, quae in quarzo, arena, aliisque lapidibus vitrescibilibus puris vel pene puris obseruatur, habere No-

ster nunc ostendit, et experimento probat. Ostendit nimirum vncias arenæ bene tritæ cum libris duabus cinerum clauellatorum forti igne fudit, et massam obtinuit, ex qua, si aeri libero exponitur, notus ille liquor silicum per deliquescentiam spontaneam obtinetur. Massam hanc aqua soluit, posteaque acido vitriolico ad saturationem vsque instillato, præcipitatum terram obtinuit, quæ, adhuc madida cum acido vitriolico diluto digesta, per euaporationem spontaneam sex septimanis præterlapsis, crystallos aluminis perfectas præbuit. Eandem hanc terram cum acido nitri digestam crystallos nullas, cum acido salis vero spicula parua saporis styptici dedisse Noster notat. His itaque obseruatis, terram argillæ, terram aluminis et terram ex liquore silicum præcipitatum vnius eiusdemque naturæ esse, colligit.

p. 41. Progredimur cum Cl. Auctore ad alteram partem quaestionis, vbi de mutationibus naturalibus argillæ agitur. Ad tria momenta hic attendit Noster. primo enim exponit, quæ sint mutationes, quas patitur argilla, ita tamen, vt formam nondum exuat, licet natura eiusdem paululum mutetur; deinde eas mutationes recenset, per quas natura argillæ proprius mutatur, ita, vt nouam formam induat, nouaque corpora producat; tandem mutationes annotat quæ argillæ contingunt, quando in corpora vegetabilia et per hæc in animalia transit. Quod ad primum momentum attinet, leuissima argillæ mutatio est, si colorem temporis tractu perdit, quod fit, si phlogiston eiusdem cum aliis corporibus coniungitur, quo facto natura eiusdem quodam modo mutatur, et ad alborem perfectum obtinendum non nisi tempus requiri dicitur, sed hæc mutatio non nisi præparatoria ad alias maiores subeundas esse videtur. Si enim argilla album colorem obtinet, eandem subtilitate et glutinosa indole destitui, tactu mi-

nus

nus mollem seu lubricam fieri, moleculas eiusdem agglutinari inter se inuicem et materias terrestres, fabulosas et micas coloratas vel non coloratas formari, immo adeo ex argilla sicmutata, talcum, amianthum et cretam brianzoniam ortum ducere, Noster autumat.

Terram, quae in vegetabilibus et animalibus p. 47. continetur, argillaceam esse, ideoque ad nutritionem vegetabilium argilla opus esse, Cl. Auctor asserit et experimenta, hunc in finem instituta, communicat. Si cineres vegetabilium aqua elixantur, elixati autem cum acidis digeruntur, solutio eorum cum calore et efferuescentia perficitur. Solutio cum acido vitriolico facta, crystallos aluminis, cum crystallis seleniticis mixtas, praebet; crystalli tamen seleniticae ab illis, quae cum terra calcarea, in acido vitriolico soluta, obtinentur, aliquantum differunt. Solutio, cum spiritu nitri facta, crystallos valde adstringentes, cum materia mucilaginosa remixtas, largitur, et solutio, cum acido salis facta, crystallos valde adstringentes exhibet. Ex his patere putat Noster, terram argillaceam eam esse, quae partem vegetabilium constituat, ita tamen, ut cum aqueo et oleoso principio coniuncta sensim, sensimque ad naturam terrarum calcarearum quidem inclinet, sed nequitquam in eiusmodi terram mutata sit. Si enim cineres cum acidis vegetabilibus digeruntur, factaque posthac solutio in aere libero euaporatur, crystalli obtinentur, quae quidem crystallis, ex terra calcarea et acido vegetabili obtinendis, similes sunt, minime autem, si calcinantur, calcem viam praebent, cum tamen crystalli, ex terra calcarea vera et acido vegetabili obtentae, si calcinantur, calcem viam praeberent. Quod tandem ad terram animalium spectat, ossa cum acido vitriolico digessit Cl. Auctor, et ex solutione eorundem alumen cum multis cry-

stallis feleniticis sese obtinuisse, perhibet. Terram ex selenite hoc per alcali separatam, calcinationi quidem subiecit, sed nullam calcem viuam obtinuit. Itaque terram animalium, terram argillaceam magis adhuc, quam in vegetabilibus mutatam esse, et ad terrae calcareae naturam magis accedere, valde tamen adhucdum ab ea remotam, quodammodo inter terram argillaceam et calcaream medium locum tenere, colligit.

P. 59.

Ad tertiam partem quaestionis, vbi ostenditur, quomodo argilla fertilis reddi possit, accedimus. Argilla sola absque aliis admixtis terris vegetationi non fauet, sed potius nocet. Firma enim eius compages et consistentia facit, vt neque radices vegetabilium se extendere, neque germen prorumpere possit. Caeterum quoque argilla, semel humefacta, ob tenacitatem impedimento est, quo minus aqua pluuialis penetret; cumque insuper aqua, nequaquam penetrans, in superiore parte retineatur, fit omnino, vt caules, aquae continuo immerfi, putrescant et corrumpantur. Cum itaque argilla has ob causas vegetationem impediat, nihilominus tamen ob terram suam maxime necessaria esse videatur, alias terras et materias ei admiscendas esse, sequitur. Vt pateat, quae sint illae materiae, quae cum successu admisceri possint, humum seu terram fertilem optimae notae Noster disquisiuit. Vncias nimirum sedecim eiusdem cum aqua commiscuit, posthac partes subtilissimas, aquae inhaerentes, a crassioribus, fundum statim petentibus, leni vasis inclinatione separauit, sicque sex vncias sabuli crassioris, in fundo collecti, obtinuit. Terram illam subtilem cum aqua separatam posthac collectam et exsiccatam cum aceto digessit, sicque terram calcaream extraxit, quae, ope alcali affusi separata, quatuor vncias pondere aequauit; terra autem superstes, pondere sex vnciarum, argilla communis

munis fuit. Itaque suadet Noster, solo argillaceo terras calcareas, sabulum et arenam, margam et similia admiscere, sicque solum argillaceum aptum reddere. Cum autem sola terrarum miscela agrum nondum fertilem reddat, nisi in iis fimus adhibeatur, varias tunc eiusdem species examinat. Primo igitur ostendit, distinctionem receptam inter fimum calidum et frigidum falsam esse, et fimum equinum vaccino calidiorem non esse, licet accumulatus finus equinus prae vaccino calidior appareat. Hanc verorem ab eo, quod finus equinus siccior semper sit, deducendam esse, nec unquam, nisi in cumulos collectum fimum equinum calorem fouere, asserit. Discrimen tamen omnino inter varias fimi species admittendum esse, aliumque magis siccum, alium humidum reperiri, inque aliis maiorem copiam materiae salinae et saponaceae, in aliis vero minorem eiusdem deprehendi, ideoque alium maiorem aliumque minorem utilitatem praestare, concedit, et praereliquis ob indolem bonae notae fimum ouillum commendat. Ad effectus fimi attendens ostendit; 1) fimum terras minus tenaces reddere, et eo disponere, ut aquae aerisue transitum permittant; 2) fimum, putrefactione absoluta, materiam saponaceam et terram vegetabilem valde diuisam relinquere, sicque fertilitati quouis modo prospicere. Tandem cineres vegetabilium ob terram inprimis vegetabilem et argillaceam, quam contineant, porro urinam putrefactam et excrementa humana, si per longum prius tempus aeri libero exponantur, ut sal volatile, plantis noxium, dissipetur, optimo cum fructu adhiberi posse, arbitratur.

X.

HENR. IOACH. NEPOM. CRANTZII S. C. A.
Maiestatis Consilarii etc. Stirpium Austria-
carum Pars I. continens fasciculos tres, edi-
tio altera auctior; Pars II. continens fascicu-
los tres, editio prima. Viennae, impensis
Krausii 1769. 4 mai. alph. 2 pl. 20. tab. aen. 18.

In colligendis, examinandis, describendis et ad
sua genera speciesque reducendis Austriacis plan-
tis singularem operam collocasse Ill. Virum, alio
tempore monuimus, simulque instituti rationem,
per partes scilicet, siue fasciculos earum descriptio-
nem euulgandi, notauimus et fasciculi primi ac se-
cundi, quibus plantae *antiscorbuticae* et *multistamineae*
continentur, recensionem exhibuimus *). Accessit
postea tertius fasciculus siue classis *umbelliferarum*.
Tres hosce separatim editos fasciculos, nunc denuo
altera hac editione auctos et in vnum volumen con-
gestos accepimus, simulque tres alios, quibus clas-
sis *ringentium*, *papilionacearum*, et *orchidum* compre-
henditur, nunc prima vice obtinuimus. Hoc itaque
volumine maxima parte absolutam euulgauit suis-
que obseruationibus egregie illustrauit Austriacam
Floram Ill. Auctor; reliquas, quae adhuc desideran-
tur, classes, ab indefesso Eiusdem labore expecta-
mus et exoptamus.

Cum e primo et secundo fasciculo, de quibus iam
dictum est, accessiones nouae difficile eruantur, per-
gamus ad Partis I. fasciculum tertium, antea seorsim
quoque editum, hac altera editione auctum, qui
plantas *umbelliferas* continet. Harum genera prima-
rio ex seminibus definire, et duos ordines consti-
tuere

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XIII. Part. III. p. 410.

tuere voluit Cl. Auctor. Semina enim gerunt vel *alata*, vel *costata*, quae vltima et *striata* dici possent. *Alata* vel *alam* habent *marginalem* tantum, vel *marginalem* et *dorsalem* simul; *Costata* autem siue *striata* semina vel *nuda* sunt, vel *teſta*. Ad *alatas marginales* pertinent *Tordylium*, *Heracleum* et *Selinum*, quas porro inter se ſeparauit Cl. Auctor propriis characteribus. *Tordylio* florem radiatum, ſemen ſuborbiculatum et *alam* crenatam; *Heracleo* florem plerumque radiatum, ſemen plano cordiforme, *alam*que membranaceam, et *Selino* florem regularem, ſemen rotundatum aut oblongum *alam*que membranaceam tribuit. *Marginalem et dorsalem alam* habent *Angelica* et *Laſerpitium*; vtrumque genus florem regularem, prioris autem ſemen alis dorſo nucleari abſciſſis, poſterioris ſemen molendinaceum eſt. *Semina costata nuda* gerunt plures plantae, ſcilicet *Siler*, flore regulari, ſemine late longo, 4. 5. coſtato: *Chaerophyllum* fructu oblongo, aut in acum terminato: *Ligusticum* fructu oblongo et chaerophyllo paulum brevior: *Oenanthe* fructu ex cylindrico anguloſo, armis coronato; *Bupleurum* fructu profunde ſulcato, foliis integris, petalis flauis; *Seseli* fructu plus minusue ouato, foliis diuiſis, corollis nunquam flauis; *Coriandrum* fructu ſphaerico: *Apium* fructu ſolide cordiformi, aut ex lata baſi acuminato minutulo. *Semine teſto* conueniunt, aſt fructu membrana plicata teſto *Aſtrantia*, fructu villoſo vel lanugine obducto *Libanotis*, et fructu aut pilis, aut ſetis, aut aculeis armato *Caucalis* differunt. Haec genera omnia habitu *abſoluto* umbelliferas referunt; ſunt vero et quaedam, quae cum iisdem maximam ſimilitudinem habent, aſt aliqua vel vmbraculi, vel ſeminum binorum, mediae axi affixorum, ratione deſeſcunt et ita *habitum deliqueſcentem* ſiſtunt, vt eſt *Eryngium* umbella.

bella simplici multiflora, in receptaculo communiconico capitata praeditum. Specierum ad haec genera pertinentium et in Austria crescentium, non solum nomina enarrauit, synonymisque ac locis natalibus additis illustrauit, sed et fere omnes copiosius descripsit; rariorum delineationes adiecit et in varietates, more solito, studiose inquisiuit Cl. Auctor. Et cum in speciebus rite constituendis et ordinandis praecipue versatus fuerit, nonnulla quoque de iisdem annotemus. *Heracleum* hirsutiae et dissectione foliorum admodum variare frequenter vidit, hinc et *Brancam ursinam* offic. *Panacem Botanicorum*, elegantem aut *problematicum*, *palmatum* denique et *angustifolium* p. 155. in vnam speciem coegit nomine *Heracleum prothierii* p. 161. *forme foliolis pinnatifidis, petalis auriculatis. Pastinacae* genus forte totum ad *Selinum* amandauit, officinalem dixit *Selinum Pastinacam* off. *foliis pinnatis lanceolatis basi semitrilobis*. Ita et *Peucedanum officinale Imperatoriam*, nec non *Athamantae species, Ceruicariam* et *Oreoselinum* LINN. *Selini* fecit species. *Caruifoliam* CHABRAEI stirp. Icon. p. 389. etiam pro *Selini* specie assumpsit, longumque addidit de hac controuersa planta commentarium, quo miram, qua eadem laborat, confusionem aliquo modo extricaret. Inter alia monuit, *Caruifoliae* suae semina, *Pastinacae germanicae* similia, tribuisse IOH. BAUHINUM et delineasse VAILLANTIIUM, minime autem cum *Angelicae syluestris* semine conuenire, vt contendit DILLENIIUS; vix condonando hinc errore eandem semper *Seseli* generi inclusisse. LINNAEUM. *Selinum caruifolia* LINNAEI edit. Spec. II, p. 350 nec p. 183. CHABRAEI, nec Auctoris planta esse videtur. *Laserpitii* quaedam species genus, *Siler* dictum, constituunt. Ita *Laserpitium Siler* LINN. *Siler montanum foliis integris glabris longe ellipticis sine aculeatis*, et *Laserpitium trilobum* L. *Siler trilobum foliis amplis laurinis trilobis*

tritobis incis, dixit et de vltima in specie monuit, in magnam incidere LINNAEUM confusionem, dum *Laserpitia* et *Silera*, quae multo botanico iudicio distinxerunt alii, ita confundit, vt stirpes foliis conuenientes, discrepantes semine, distingui amplius non possint. *Scandicis* genus cum *Chaerophyllo* combi-
 nauit. *Chaerophylli bulbosi* semina ouata non bene pinxisse RIVINUM, monuit, cum sint longa, angusta, striata, immatura vero in principio sursum latiora videri, obseruauit. Non florentem plantam in *Cicutae* extractum cogi a Viennensibus pharmaco-
 paeis certo nouit Auctor, et eiusmodi extracto Viennensi plurimae decipiuntur nationes. In *Chae-*
rophyllo hirsuto caulem aequalem, folia incisa acuta, et semina subulata pro charactere specifico habuit
 LINNAEUS, plantam autem primum modo signum ostendere, secundum et tertium vix multae vtilitatis esse in distinguendis *Chaerophyllis*, Ill. Auctor contendit, eamque definitionem magis *syluestri*, quam *hirsuto* conuenire asserit, hinc dixit plantam *Chaerophyllum hirsutum*, caule aequali seminum striatorum corniculis maxime distantibus. *Mutellina* IOH. BAUH. a LINNAEO ad *Phellandrium*, ab HALLERO ad *Seseli* relata: idem *Phellandrium aquaticum*, nec non *Aegopodium* et *Meum* factae sunt *Ligustici* species; *Meo* semina glabra striata haud bene LINNAEUM tribuisse, monuit, cum sint costis foliaceis satis eleuatis in alpibus praedita. *Pimpinella tenuifolia* RIV. est *Seseli bienne* caule erecto admodum folioso, et *Hippomarathrum* KRAMERI dicitur *Seseli articulatum*, inuolucro peluiformi. *Falcaria* a Sio ad *Seseli* quoque amandatur. *Coriandri* species aliis huc relatis, multum auctae fuerunt. *Aethusa* dicitur *Coriandrum Cynapium*, caule distorto, inuolucellis dimidiatis pendulis; *Conium maculatum* nominatur *Coriandrum cicuta*, caule
 maculato foetidum et *Sium latifolium* LINN. *Coriandrum*

p. 189.

p. 194.

p. 199.

p. 204.

p. 210.

drum latifolium caule argute angulato, foliis latis pin-
 p. 214. *natis serratis. Pimpinella saxifraga, Ammi maius*
 p. 222. *et Carum carui Apii factae sunt species. Libanotis*
genus restitutum, Athamantam cretensem et annuam
 LINN. imprimis continet, de vtriusque speciei diffe-
 rentiis copiosius exposuit Ill. Auctor. De *Cauca-*
 p. 224. *lide grandiflora et leptophylla* monuit, qui duas has
 plantas sub eodem genere cogunt, in charactere ge-
 neris inuolucris vniuersalis mentionem facere haud
 quaquam debere; cum illud saepe nullum sit, no-
 tante iam HALLEO, quod et in *leptophylla* sae-
 pius Cl. Auctor obseruauit. Inuolucris *grandiflorae*
femina coercentur, dum *leptophyllae* nuda sunt inuo-
 lucris linearibus reflexis; etiam in feminibus est dif-
 ferentia: cornicula perianthii in *grandiflora* praelon-
 ga deflexa sunt; in *leptophyllae* feminibus autem ad-
 modum exigua conniuentia. Ad *Caucalidem* etiam
 reduxit *Daucum* et *Saniculam*.

Fasciculus IV. ringentes continet plantas. In
 p. 243. *Saluiis* stamina bifurcata esse, negauit, vnum potius
 vectis crus stamini supponi, vt mediante articulatione
 mobile sit, assumfit; in *glutinosa* et *verticillata* lacinia-
 rum calicinarum supremarum coalescentiam vidit et
 hinc calicem bilabiatum, in quinque dentes fissum ex
 charactere generico expungi debere, monuit. In *Leo-*
nuro Cardiacae, antheras, glandulis ornatas, nunquam
 inuenit, vel eiusmodi esse, quales in plurium rin-
 gentium antheris e. g. *Teucrio montano* existunt.
Teucrium et *Aiugam* coniunxit, *geneuensem pyrami-*
dalis varietatem statuit et in vtraque bracteas flora-
 les fere semper tridentatas, mediamque laciniam
 hastatam esse, cognouit. *Galeopsidem* ad *Lamium*
 reduxit et calicem quinque aristatum, corollae fau-
 cem vtrinque in plerisque denticulo plus minusue
 spectabili praeditam, et labium superius fornicatum
 pro charactere assumfit. *Lamium Galeobdolon* denti-
 culis

culis destituitur et peculiare genus constituere commodè posset. *Stachys annua*, quae dicitur *Stachys betonica* foliis basi attenuatis, corollae galea erecta, in umbra nata, galeae dorsum pilosum, eamque in summitate tridentatam, aut crenato fimbriatam, albam, lateraliter punctis purpureis pictam, barbam vero sulphuream longo ex fauce sulco donatam et stamina villosa, apice geniculata, suspendentia, antheras punctis osseis quasi coralliis albis, asperfas, obseruauit; plantae vero, in sole educatae, strictior asperiorque habitus, rictus maior, faux recte fere dimissa, stamina purpurea, superius vtrinque geniculata, antheras punctis osseis haud asperfas habebant. *Stachys alpina*, quae ab *alpina* LINNAEI forte differt, P. 269. versa est, galeam intus pilosissimam et stamina posteriora, crure instructa, gerit, ideoque, annon nouum inde genus constitui debeat, a Cl. Auctore quaeritur. *Ballotem* ad *Marrubium* reduxit et pro charactere assumpsit calicem hypocrateriformem seu quinque aut decemdentatum, semper decem striatum, cum constanti vna in vtraque harum notarum praesentia, scilicet verticillorum involucris linearibus, aut galea superiori recta semibifida. *Clinopodium*, quod confundi posset cum *Ballote*, habet calicem bilabiatum et nunquam decemstriatum. In *Prunella* calicem praecipue descripsit mirumque dixit: est bilabiatu plicatilis, labio superiore ex gibbositate ascendenti, lato, tridentato, ex latere in facie anteriori dependent duae auriculae, quae inferiore iunguntur labio, latiores superne in angulo coniunctionis cum labio superiori in spinulam terminatae; labium inferius, in duas lacinias ascendentes aristatas sectum, delapso flore, ad superius accedit, naturaliter plicatile, ne semina elabantur; stamina non bifurca, sed in summitate duplici tubere instructa vidit Ill. Auctor, antherasque in nondum apertis floribus didymas, Tom. XVII. Pars III. Ff orbi-

orbiculari placenta, cuius lateri filamentum inferatur, iunctas, hinc turgentibus antheris solummodop. 282. findi, probabiliter concludit. In *Origano vulgari* antheras in singulo stamine, mediante divergente crura articulatas, duas inuenit, hinc in staminibus quatuor antheras octo, quae autem marcidae contrahuntur et ad se accedunt. In *Orobanche* calicem constante bifidum, stigma vero bifidum, tri- et quadrifidum obseruauit; inter *maiolem* et *laeuem* LINNAEI, distinctionem certam non inuenit, hinc *laeuem* praevarietate *maioris* assumsit. Praeter veras labiatae siue ringentes hoc etiam fasciculo recensuit reliquas flore monopetalo irregulari praeditas, quas, quoniam niam multum cum labiatis commune habent, *deliquescentes* dixit, vt sunt *Lycopus*, *Verbena*, *Mentha*, *Veronica*, *Digitalis* et *Limosella*. Cur vltima didynamiis, dum nulla hic subordinationis potentia appareat, LINNAEUS inscripsit, cur alii ringentibus, et vltimo personatis, qui manifestiori errore eius folia opposita argutulataque facit, et flores solitarios axillares, *Centunculum minimum* cum *Limosella aquatica* confundens Cl. ADANSONIUS? quaestionem addidit Ill. Auctor; nil ringentis seu personati se vidisse asserit et characterem generis, a LINNAEO traditum, intelligi non posse, contendit hinc alium dedit: Calix scilicet est quinquesidus corolla campanulata, quinquesida, aequalis, stigma capitato minores in quadrato antherae quatuor subiectae, capsula vnilocularis, bialuis, polysperma.

Papilionaceas comprehendit *Fasciculus V*, ex quibus illae, quae *habitus absolutum* referunt, vel stamina omnia connata et stigma imberbe habent, vt est *Genista*, *Ononis*, *Anthyllis*, vel stamina nouem modo coalita, harumque aliae vel stigma pubescentes vt *Orobus*, *Lathyrus*, *Vicia*, vel stigma imberbe, vt *Cytisus*, *Lotus*, *Eruum*, *Trifolium*, *Astragalus*, *Phacelia*, *Hedysarum*.

Hedysarum, *Coronilla*, *Hippocrepis* et *Medicago*, habitum deliquescentem referunt *Fumaria*, *Polygala*. *Genistae* fructum unilocularem non bene tribuit LINNAEUS, cum in nonnullis etiam multilocularis esse soleat, quod praecipue in *tinctoria* observauit Ill. Auctor, in *sagittali* alae reliquis petalis breviores non sunt, sed carinae longitudine, neque vexillum carina dimidio brevius, sed alarum et carinae longitudine, stigma involutum in hac specie videre Ill. Auctor non potuit. In *Lathyrorum* historia defini- p. 380.
tiones, ex cirrhis desumptae, saepe erroneae sunt, imo et foliorum, verbis non satis expressa forma, saepe in errorem ducunt. In *Lathyro cicera* cirrhos polyphyllos, imo saepe ramosos folia minime lineari lanceolata, sed ex ovatis oblonga, plantamque totam hirtam et asperam, internodia membranacea rigida hispida et petiolos latere membranaceo siue stipulato praeditos observauit et in *pratensi* cirrhos modo monophyllos, mododiet triphyllos, immo etiam ramosos, et folia vtrinque acuta, eandemque mutationem et in *sylvestri* vidit Ill. Auctor. *Eruum tetraspermum* p. 389.
LINN. *Viciam* dixit gemellam, foliis linearibus, siliquis obtusis gemellis, seminibus globosis quaternis. Est autem *Vicia* non *Eruum*, nec enim perianthium et longitudine corollae, nec est subaequale, nec legumen ceras, etsi demum a *Vicia* solo stigmate *Eruum* differt, ut in observatione LINNAEUS monuit; stamen decimum, HALLERO connatum visum, solutum inuenit Cl. Auctor. In *Viciae lathyroidis* icona, quam p. 393.
cederat OEDERUS, cirrhos nullos adesse, eos autem et HERMANNUM pinxisse, et se in viuis plantis vidisse, praeterea in vtraque figura folia caulina diuersa, et nulla cum suis plantis conuenire Ill. Auctor monuit. *Cytisus Genistis* apponi posse existima- p. 396.
uit licet separatim haec genera conseruauerit; an in reuoluto vexillo, lateribus non reflexo, manifestum
Ff 2 distin-

- distinctionis signum, maxime dum stigma inuolutum
- p. 402. haud in omnibus *Cytisis* obtineat? *Nigricans Cytisus* calicem habet bilabiatum, labio superiore quasi indiviso, aut dentibus ita confluentibus, ut videntatum videatur, stamina omnia connata et siliquam utrinque acuminatam, non obtusam, gerit. *Lotus Dorycnium* non bene dicitur capitulis aphyllis, illa namque folio vno, duobus tribusue suffulta vidit Auctor. De *Trifolio agrario*
- p. 412. monuerat LINNAEUS, calicem ante efflorescentiam, vix manifeste villosum esse, aut neque in flore deflorato villosum, eam vero caulis partem, quae floralem spicam sustinet, villosissimam observavit, et
- p. 414. speciem triuiali nomine *Trifolium strepens* dixit Ill. Auctor. In *Astragali* genere definiendo calicem inuersum descripsit LINNAEUS, denticulosque inferiores gradatim minores esse perhibuit, qui tamen
- p. 435. constanter maiores apparent. *Fumariae bulbosae* vnam modo assumsit speciem et in ea, quae radice non caua dici solet, praeter colorem nullam vidit differentiam Cl. Auctor.

Fasciculus VI. Orchides continet; de quarum ordine et generibus sermonem singularem praemisit in eaque ea fere repetiit, quae Ill. HALLER de hac familia exposuit. Assumsit etiam HALLERIANA genera, modo *Corallorhizam* omisit, eamque in naturali potius *Epipactidum* familia conseruauit. Eiusdem quatuor ouatos globulos siue antheras, quas Ill. HALLER et CHATELAIN in hac planta descripserunt, cognitu difficiles, easque a se ipso haud visas esse, declarauit et secundo statuit, aequae obscurum esse in *Epipactidibus* antheras se aliter, quam in *Orchidibus* habere, et observari, stamina in his, ut in aliis, non adeo euidentia esse, antheras saepe sagittatas bifidas, imo, dum in integrum relaxatae sunt, diuisas videri et quatuor, quae tamen non sint. In hac classe species quoque Austriacas omnes copiose et accurate descri-

descripfit; et vbique proprias animaduersiones ac ob-
 seruationes adposuit. Ita inter *Orchidem maculatam* p. 496.
 et *latifoliam* differentiam non adeo euidentem esse
 monuit; nec enim de soliditate aut fistulositate cau-
 lis semper quaerendum, licet post HALLERUM in-
 sistat LINNAEUS, nec variabilium bractearum
 longitudo certius signum exhibet et priorem notam
 non semper inuenire potuit, et bracteas in *maculata*
 frequentius ouario longiores vidit Ill. Auctor; in vtra-
 que trifidum est sextum petalum et reflexa lateralialia
 segmenta in *latifolia*, plana in *maculata* solummodo
 infidam notam constituere valent, licet aliter con-
 tendat LINNAEUS. Nec id, quod de his segmen-
 tis notauit HALLERUS et dein assumsit LINNAEUS,
 in omnibus varietatibus locum habebit, medium
 enim segmentum aequae acuminatum in *latifolia* ac in
maculata apparet, et in vtraque planta haec circum-
 ferrata sunt, vt itaque ea modo constans sit differen-
 tia, quod in *latifolia* solum lateralialia duo extrema pe-
 тала sursum flexa patula sint, supremo cum duo-
 bus infimis cucullum faciente, contra vero in *macu-
 lata*, dum cum duobus lateralibus extremis etiam su-
 premum erectum reclinatumque sit. In *Orchide militari*
 varias plantas, vt varietates coniunxit LINNAEUS,
 quarum aliquas denuo separauit HALLERUS; ast *Or-
 chidem galea et alis cinereis*, *Orchidem magnam latis fo-
 liis galea fusca s. nigricante* IOH. BAVH. et *Orchidem
 militarem minorem*, *sive Orchidem* 20. 21. et 22. HAL-
 LERI *Enum. stirp. Helv.* etiam Illustris Auctor con-
 iunxit et addidit: limites non video, nec, vt separa-
 rem, adduci potui, dum viua exemplaria omnium
 trium simul inspicerem, et vidi nil valere, aut spi-
 cae conicae, aut breuissimae, aut longae lufum, nec
 partium labelli angustam, aut maiorem aliquantulum
 latitudinem, nec dentes aut ferras, aut ipsa demum
 puncta purpurea scabra; inter haec enim exemplaria
 etiam collegeram vnum totum niueum, omni macula

et puncto vacuum; in his omnibus id demum superfuit signi constantioris quoad colores et picturas, quod cuculli perpetua purpura perfunderentur. Addidit et aliud monitum. HALLERVM: scilicet labellum quadrifidum descripsisse, mediamque inter crura spinulam neglexisse, ad quam LINNAEVS et Ill. Auctor attendentes, quinquefidum id dixerunt.

Non autem contentus fuit Ill. Auctor, plantas Austriacas his fasciculis accuratius descripsisse et ordinasse, sed et eodem tempore, quarundam classium emendationem repetito labore suscepit, genera speciesque indigenarum aequae ac exoticarum denuo disquisiuit, plurimaeque noua ratione ordinauit et disposuit, neque solum aliorum errores correxit, et a LINNAEO saepissime recessit, sed etiam se ipsum multis modis emendauit, ac institutionibus Rei herbariae et nunc indicatis fasciculis assumpta, immutauit. Commode itaque prioribus iungamus duos libellos, qui haecenus ad manus nostras peruenerunt, et quae illis noua atque mutata insunt, breuiter indicamus. Primus est:

**Classis Umbelliferarum emendata cum generali
feminarum tabula et figuris aeneis, in necessarium
Institut. Rei herbar. supplementum. Lips.
impens. Krausii 1767. 8 mai. pl. 8. tab. aen. 6.**

Praemisit a pagina secunda ad quadragesimam generalem de umbelliferis tractationem, in qua praecipue de umbellatae plantae definitione, dein diuisione eiusque fundamentis disseruit, de inuolucris aestimatione speciatim et copiose egit, illud vero inconstantissimum characterem praebere et hinc nihil valere contendit, multisque exemplis comprobare studuit. Characteres dein genericos, a LINNAEO stabilitos, perlustrauit, eosque nec sufficientes nec constantes, hinc et ipsa ab Eodem atque AR-

TENDO assumpta genera dubia et fallacia esse, declaravit. Familias umbellatarum, ab ADANSONIO compositas, postea seorsim perlustravit et in his quoque plura monenda inuenit. Quae in ipsa generum et specierum recensione aliter constituit atque mutauit Ill. Auctor, huc redeunt:

Tordylium latifolium, *anthriscum* et *nodosum* ab p. 56. hoc genere separavit et ad *Caucalides* reduxit; e contrario autem cum priori coniunxit et *Artemidam* et *Hasselquistiam*, in posteriori ADANSONIUM secutus. *Anethum* ad *Selinum*, *Cuminum* et *Foeniculum* p. 63. ad *Ligusticum* amandavit, addidit et huic generi *Bunium*, licet adhuc dubius sit, an non ad *Chaerophyllum* potius referri debeat. *Sium rigidius* distinctif- p. 86. simo *Oenanthes* femine praeditum est, hinc denuo huius generis speciem fecit. *Sium sisarum* dicto *Sesileos* genus auxit. *Cynapium* et *Conium* a *Coriandro* iterum separavit et genus assumpsit *Cicutae* nomine, p. 96. eidemque fructum plus minusue globosum et petala regularia tribuit, ab *Apio* autem fructu maiori et involucribus nonnullis in hoc genere dimidiatis distinct: retulit huc *Sium amomum*, *sium latifolium*, *nodiflorum*, *graecum*, *sciculum*, *Ninfi*, *Conium maculatum*, *Aethusam*, *Cicutam virosam*, *bulbiferam* et *maculatam*. *Anisum* *Apio* adposuit, addiditque *Daucum Visnagam* p. 101. et alias. *Libanotis* genus et nunc retinuit, eoque p. 105. non solum plures *Athamantae* species comprehendit, sed et *Bubon macedonicum*, *galbanum*, *gummiferum*, *rigidumque*, et porro *Seseli turbith* adiecit. Ita genera umbellatarum multum imminuit, et 42 LINNAEANA, ab ADANSONIO ad 47 multiplicata, ad 21 reduxit Ill. Auctor. Icones primo fasciculo additae, et hic accesserunt omnes immutatae. Alter libellus inscribitur:

Classis Cruciformium emendata in necessarium
 Instit. Rei herbariae supplementum. Ibid. im-
 pens. eiusd. 1769. 8. mai. plag. 9. tab. aen. 3.

Praemisit et huic a p. 5 ad 48 sermonem de ad-
 stringendis firmandisque generibus, in quo multum
 et contra LINNAEUM, et ADANSONIUM, et
 GIESEKENIUM disputavit, quae legi merentur,
 vt et eae, quas de glandulis cruciformium repetitas
 a pag. 49-55 dedit obseruationes; ex quibus luculen-
 ter cognouimus horum corpusculorum pro generibus
 definiendis insufficientiam, eamque vel vnico exem-
 plo comprobemus. *Erysimum offic.* habet labia vtrin-
 que duo spectantia, stamina maiora et in centro de-
 pressam scutellam, cui stamina minora insident. *Ery-*
simum cheiranthoides ad stamina minora, scutellas di-
 midiatas duas, et ad stamina maiora glandulam vniam
 cristatam. *Erysimum barbarea* extus inter stamina
 maiora et calicem, cornua exstantia glandulosa duo et
 scutellas exiguas duas patentes et margine sectas. *E.*
alliaria ad maiora stamina extus duo glandulosa tu-
 bera complanata, duasque scutellas connexas,
E. pannonicum glandulas scutellatas pro minori-
 bus staminibus duas, inter quadratum tuberculum
 quasi coalitas, et inter stamina maiora et calicem
 glandulas confluentes duas latas atque bicornes. Ex
 quibus, addit Ill. Auctor, patet non duo Erysimi vi-
 figurae, positionis glandularum et numeri sibi simil-
 ima esse. Harum plantarum tres ordines constituit;
 1) continet *filiculosas*, quae breues fructuum capsulas
 non adeo in gracilem longitudinem protensas gerunt,
 2) *siliquatas*, quae inter priores et subsequentes me-
 dias crassiori solidiorique materie productas et elon-
 gatas capsulas habent, 3) *siliquosas*, quarum gracilis
 et elongata biualuis capsula futuris duabus, alterna-
 tim semina affigentibus, gaudet. Omnis cruciformis
 planta, quae florem irregularem quasi radiatum habet,
 ad

ad *Iberis* genus referri debet. *Thlaspi* character con- p. 71.
 sistit in capsula, alis, si adsunt, non consideratis,
 plus minusue verticaliter obcordata apice hylo ex-
 sculpta; *Camelina* antea ab Ill. Auctore pro genere pe-
 culiari assumpta, septo, valvis parallelo, a reliquis qui-
 dem differt *Thlaspeos* speciebus, ast et filicula nuda
 non alata cum *Bursa pastoris* conuenit, et hinc ad
 idem genus reducitur. *Nasturtium*, quo *Lepidii* p. 79.
 LINN. species plures complectuntur, fructum gerit
 plus minusue basi obcordatum, siue crassiori basi in-
 fera sensim in tenuiorem apicem, vnum aut duos,
 extenuata; quorsum et *Subularia*, nomine *Nasturtium*
palustre fol. subulatis filicula ouata, vt et *Cochlearia*
draba amandantur. Differt ab hoc *Lepidium* fructu p. 82.
 nec supra, nec infra striete obcordato, sed orbiculato
 magis, raro elongato, valvis carinatis, dissepimento
 contrario; et distinguitur ab *Alyss*o staminibus puris
 non calcaratis, a *Clypeola* dissepimento, quod in hac
 valvis parallelum, prout et ipsa siliqua magis com-
 planata est. Neque *Nasturtium Iberis*, neque *Lepi-*
dium bonariense diandrias esse monuit Cl. Auctor, et in
 vltima stamina manifeste sex, in concauitate foliorum
 calicinatorum degentia, antheris flauis, repetita obser-
 uatione vidit. *Peltaria* LINNAEI, quam *Bohad-*
schiam dixerat Ill. Auctor, nunc nominatur *Clypeola* p. 91.
alliacea fol. radicalibus cordatis, caulinis amplexicauli-
bus lanceolatis; Biscutella vtraque LINNAEI etiam
 ad *Clypeolam* refertur. *Cochlearia* fructum subglobo- p. 96.
 sum vni et bilocularem gerit, hinc et *Crambes species*
*Myagr*um *saxatile, paniculatum, et rugosum* LINN.
 huc reduxit, et ita hoc genus specierum numero au-
 xit; e contrario *Cochleariam coronopum* ad *Myagr*um p. 100.
 amandauit, quorsum et *Anastaticam, Bunias cornu-*
tum, erucaginem, et orientalem reduxit, et ex *Myagri*
 Linnaeanis speciebus solum *perfoliatum* hic retinuit.
Ricotia nunc facta fuit *Isatidis* species, sumpto cha- p. 114.
 F f 5 ractere

- raetere a valuis nauicularibus, quibus differt a *Luna-*
p. 105. *ria.* *Rapistri* genus definitur fructu articulato, seu
 per angustatas et quasi abruptas phalangas in longi-
 tudinem disposito; huc pertinet *Myagrum perenne*,
orientale, *hispanicum* et *aegyptium*, *Bunias cakile*, *Ra-*
phanus sibiricus et *raphanistrum* LINNAEI. Quae-
 dam cruciformium genera tuberculo inter stamina
 breviora et tubam, interque longiora et calicem, con-
 veniunt, scilicet *Raphanus*, *Sinapi*, *Brassica*, calice
 autem patente vel conniuyente, erecto vel clauso fru-
 ctuque plus minus longo, nunc cornu fungoso simili,
 nunc alio modo constructo, diuersa; quae nihilomi-
 nus coniunxit vno genere Cl. Auctor, nomine *Ra-*
p. 105. *phani* conseruato, hinc praeter *Raphanum satium* et
caudatum, decem *Sinapeos* et nouem *Brassicae* spe-
 cies LINNAEI huc reduxit, *Brassica orientali* ad *Ery-*
p. 113. *simum* relata. *Eryfimo* filiquam adscripsit quadran-
 gulam, angulis oppositis vel persistentibus, vel duo-
 bus depressioribus, et cornu non longum; retinuit
 hic LINNAEI species, addidit autem *Brassicae orien-*
talem, *Cheiranthum cheiri* et, auctoritate aliorum per-
p. 118. motus, duas *Turritides*. *Cheirantho* tribuit germen,
 vtrinque denticulo tuberoso, in aliis euanescente, in
 aliis accrescente ornatum, calicem clausum, gibbum,
 stamina plana et filiquam variam non quadrangulam.
p. 126. Numerum *Cardamines* specierum, a LINNAEO re-
 censitarum tribus *Dentariis* auxit et ita hoc genus
p. 132. integrum huc amandauit. *Sisymbrii* genus, aucto-
 ritate LINNAEI, conseruasse, ast et emendationem
 postulari, monuit. In *Hesperide*, *Heliophila*, *Arabi*,
Lunaria, *Draba* et *Vella* LINNAEUM presse secutus
 fuit. Icones fasciculo Cruciformium Austriacarum
 adpositae, et hic repetitae inueniuntur omnes.

XI.

Verhandelingen uitgegeeven door de Holland-
sche Maatschappye der Weetenschappen te
Harlem IX Deels I Stuck 1766. 2 Stuck
1766. 3 Stuck 1767. 8. 5 alph. 6½ pl.
6. tab. aen.

h. e.

Commentarii societatis scientiarum Harlemen-
sis. Vol. IX. P. I. II. III.

Continet prima pars responsionem Cl. FORMEY P. I.
ad quaestionem a Societate Harlemensi ad an-
num 1763 propositam: *Quomodo animus infantum,*
ingeniumque sint tractanda, quo frugi tandem bonique
evadant? qui praemium monetae aureae d. 21. maii
1765. reportavit.

In altera parte reperiuntur:

P. II.

1. Responsio Cl. A. HULSHOFF ad eandem P. I.
quaestionem. Cui praemium monetae argenteae
tributum est.

2. Responsio ad eandem quaestionem Auctore P. I. 21.
Cl. H. A. CHATELAIN, quae eodem praemio
ornata est.

3. Responsio Cl. CORNEL. VANDER PALM P. I.
ad eandem quaestionem, quae idem praemium re-
portavit.

4. Responsio ad eandem quaestionem, omisso P. I. 95.
nomine Auctoris.

Insunt

Insunt in parte tertia:

p. 1. 1. *Noua solutio comparationum astronomicarum potentiae quartae et potentiae tertiae*, Auctore Cl. WILH. OTTO REITZ.

p. 44. 2. *Contemplatio vis particularum fluidarum, aquam potissimum constituentium*, Auctore Cl. I. F. HENNERT, quam ex idiomate Franco-gallico transtulit I. I. BLASSIERE.

p. 136. 3. *Quid de arbore cognitionis boni et mali, de interna eius natura, forte venenata, sentiat*, refert Cl.

p. 163. p. VERSLUYS. Demonstrat Noster, fructum huius arboris ex insita sua letifera indole corpus humanum corrupisse, et ad mortem subeundam aptum

p. 180. reddidisse. Obiectiones huic sententiae obuias solvit, et ad difficultates denique, ab aliis sibi obiectas, espodet.

p. 193. 4. *Tractatio de organo auditus physeteris macrocephali* LINN. (Cachelot of Pot-Walvisch), Auctore Cl. P. CAMPER. Conuenit fabrica organi auditus in hoc pisce cetaceo quodammodo cum fabrica organi quadrupedum, ita vt certum sit, eum non, vt pisces, aquae tremore *) sed aeris audire. Auribus externis caret. Instruitur vero meatu auditorio membrana tympani, officulis auditus tribus, concha, atque, vti Cl. Auctor suspicatur, etiam tuba Eustachia.

*) Vide descriptionem organi auditus piscium squamosorum a Cl. CAMPERO in Actis Harlemensibus Vol. VII. P. I. p. 79. comunicatam. Conf. Comm. nostr. Vol. XVI. p. 513. Notamus hac occasione, Cl. Auctorem monere amphibiorum nantium LINNAEI organum auditus conuenire cum piscium squamosorum organo; crocodili vero cum aliis amphibiiis reptilibus.

stachiana. Malleus non mouetur in iis piscibus, sed ossi affixus est. Incus dentis duplici radice instructi figuram habet, stapes vero digiti phalangam aemulatur. Maximam autem attentionem meretur canaliculum semicircularium in piscibus his defectus, quos tamen in omnibus aliis animalibus reperiri, ita ut a DUVERNEYO sedes sensus auditus habiti sint, notum est *). Stapes basi sua duplicem aperturam conchae, quae in tympani cauitatem patet, obtegit. Tympani cauitas ipsa pro mole animalis satis parua est. Concha vero duplici spira, ut in homine, constat.

5. *Tractatus super celeritatem venti*, Auctore p. 230.
I. LULOFs.

6. *Observatio de duabus personis morfu unius* p. 277.
eiusdemque canis, hydrophobia mortuis, Auctore Cl.
I. H. OTTENS. M. D. Puer, sex annorum d. 30
maii 1765. morfu canis tribus vulneribus in sinistra
faciei parte, afflictus, post aliquot dies iterum resti-
tutus est. Noster d. 28 iunii accersitus, aegrum de p. 279.
dolore faucium, et impedita deglutitione conque-
rentem, ut adeo, si quid fluidi ori admoueretur, sta-
tim conuelleretur, inuenit. Pulsu celeri et paulum p. 282.
durioze existente causam in angina latere credens,
postero tamen die, signis iisdem, symptomatibus
vero peioribus, sensimque incrementibus, ita, ut
d. 30. iun. pulsus celer et debilis, extremitates vero
frigidae essent, veram hydrophobiam adesse cogno-
vit. Enemate applicato, conuulsionibus vehe-
mentioribus correptus obiit. Vir, quinquaginta p. 286.
trium annorum, referebat d. 1. iul. Nostro, se ab
eodem cane, eodemque die, quo puer ille mordere-
tur,

*) In serpentibus forte ob exiguitatem reperire non
potuit Cl. GEOFFROY Mem. prés. T. II. p. 179.
vid. Comm. nostr. Vol. VI. p. 513.

- tur, leuiter in naſo et labio ſuperiore vulneratum
verum ſine alio incommodo ex his curatum eſſe.
- p. 288. Mercurialibus ei datis d. 4. iul. de dolore capitis et
gingiuarum queſtus eſt, qui d. 6. iul. auctus uſum
- p. 290. maxillae aegro non conceſſit. Saliuatione d. 8. iul.
orta, dolor d. 15. remittens d. 18. plane ceſſauit
Continuato uſu mercurii ad 1 d. aug. bene ſe habuit
aeger praeter obtuſum dolorem capitis, qui tamen
poſtea ceſſauit. Hinc Cl. Auctori, cum per vnde-
cim hebdomadas nullum hydrophobiae ſignum pro-
diret, nulla amplius eius ſuſpicio relicta eſt; atta-
men d. 22. aug. Noſter, aegrum, conuulſionibus
agitatum, et de anguſtia faucium conquerentem, vt
- p. 293. quominus biberet, impediretur, inuenit. Cum cau-
ſam huius anguſtiae in ore non poſſet detegere, ae-
ger vero, magno niſu fluidi quid ingerens, conuul-
ſus ingratum ſonum ederet, aegrum Noſter, vt hy-
- p. 301. drophobum tractauit, ſpecifico Cl. NUGENT da-
to. Symptomatibus d. 24. aug. ingraueſcentibus,
nec iuſtis remediis compeſcendis, aeger poſt con-
- p. 311. uulſionem placide exſpirauit. Eſſectu veneni in hoc
lentius conſpicio quaestiones mouet Noſter: num-
ne huic minus veneni communicatum ſit, puero il-
lo? an oriatur haec varietas ex diuerſa fabrica cor-
porum, vt ita ſyſtema neruoſum pueri facilius, quam
ſeneſcentis viri poſſit commoueri? eſtne veneni vis
in hoc viro per medicamenta ita fracta, vt ſolito
tardius (d. 85.) prodiret vel mitius ſaeuaret, cum in
puero citius (d. 31.) cerneretur? vel pendet tan-
dem haec varietas ab ipſa huius veneni indole?
- p. 313. 7. *Adnotationes circa inſitionem variolarum* edit
Cl. I. HOOVIVS. Amplam ſatis exhibuit Cl. Au-
ctor tractationem, quam omnem hic explicare fini
noſtro eſſet contrarium; ſufficiat ergo, ſi breuiſſi-
mis indicemus, quid Cl. Auctor velit; profert ni-
mirum

nirum plurimas Auctorum, de insitione variolarum, sententias: argumenta eorum, quibus vel insitionem impugnarunt, vel eam defenderunt, ipse vel soluit, vel ab aliis iam soluta adducit: comparantur naturales variolae cum insitis, ut pateat, quibus conueniant, vel differant: recenset variam methodum Auctorum, qua vel ad praeparationem vel ad dispositionem corporum, in inferendis variolis, respicerent, nec non signa et symptomata percurrit, quibus diagnosis verarum constet variolarum, ne prognosis male formetur. Reliquis praetermissis hoc addere liceat, ex adductis omnibus haud obscure patere, Cl. Auctorem, ab insitione variolarum, omnibus bene obseruatis, non esse alienum, videri eum potius eam commendare, et, ut inuentum hominibus salutare ac frugiferum, non esse reiiciendum, iudicare.

8. *Altera relatio de deformitate singulari, in pelui P. 583.*
fetus humani reperta, Auctore Cl. M. VAN GEUNS.
 Quae praeternaturalia in pelui fetus, alio loco descripti *) detexit, nobis communicat: corpus vesic- P. 586.
 am vrinariam inter et intestinum rectum, vesicae vrinariae imaginem referens, modo, ut paulo maius esset, magisque prominere, inuenit. Sulco verticali, sursum profundiore, deorsum planiore bifurcatum hoc quasi videbatur. Vaginem vteri hoc P. 587.
 repraesentare exinde cognouit, quod sursum in vterum intrabat, tubulo vero, pudendis externis immisso, vesicam primo vrinariam poterat inflare, et, hac distenta, etiam vagina haec cum vtero aere implebantur. Partibus externis dissectis, cognouit, vaginam hanc, apice obtuso ad collum vesicae vrinariae sese adiungere, et cum ea per orificium, quod
 inter

*) vid. Verhandeling. Vol. VIII. P. I. p. 169. et Comm. nostr. Vol. hoc p. 124.

inter vtriusque vreteris aperturam paulo profundius erat, communicare, reliquam vero vaginae viam, vrethram, vaginae magnitudini aequalem, cum de-

p. 590. fectu clitoridis, explere. His per quinquennium in spiritu seruatis, et vagina aperta, eam intus, tanquam foueam, orificio illo paulo maiorem, ori vteri, mediante membrana musculosa, quae abhinc ad vaginae superiorem partem et ad hanc vsque foueam sese extenderet, agglutinatam conspexit. Membrana haec, frenulo non multum absimilis, valde tensa, impressionem illam vaginae efficiebat. Vagina et vterus liquore albicante glutinoso impleti erant. Vagina ampla et crassa erat. Vterus obliquo gaudebat situ, vt tuba Fallopiana sinistra paulo altius dextra illum intraret: Ovarium sinistrum ad tubam sinistram, et dextrum ad vterum conspexit, nec non ligamenta rotunda a lege naturali erant deflexa.

p. 597. Nomen huic dat Cl. Auctor *aberrationis vaginae*, et statuit, hunc fetum, etsi deformitas in pectore et abdomine non adfuiſſet, ex harum praeternaturali partium situ, vitam diutius, ob varia inde oriunda incommoda, protrahere non potuisse. Adiicit tandem quaedam, quae praeter naturam in arteriis, in fine intestini ilei, et in manu dextra inuenit, quae omnia, cum ad finem nostrum parum faciant, omittimus.

p. 598.

p. 603. 9. *Usus olei, ex asphalto parati ulterius declaratur* a Cl. M. HOFKENS DE COURCELLES *). Soluit Cl. Auctor obiectiones ab aliis, circa hunc usum, sibi illatas, vt ostendat, medicos illos non bonam formasse indicationem, vel eos ideam, quam de vlcere inueterato haberet, adeo extendisse, vt omnes, quae demumcunque essent, exulcerationes, ex natura sua varias, in variis morbis prodeuntes, ad

*) vid. Verhandel. Vol. VIII. P. I. p. 475. et Comm. nostr. hoc Vol. p. 132.

ad eam referrent; vel denique eos oleum hoc non genuinum adhibuisse. Tribus exemplis hoc pro- p. 606. bat, in quibus, cum ad mentem suam oleum hoc non indicaretur, eius vsus male successit. Idea ex- p. 612. vlcerationis, cui oleum ex asphalto bona fit medicina, vlterius definita, oleique variis defraudationibus indicatis, exemplum vlceris cum acrimonia curati addidit. Femina trigintaquatuor annorum, do- p. 613. loribus rheumaticis iamdudum vexata, frigori se exponens, rheumatismum experiebatur. Hoc non curato, nec grauiditatis suae gnara abortiebat, relicta tussi cum dolore, in dextra scapula fixo. His per tres fere annos cum febre et anxietate continuatis, magnam subito, animo delinquens, copiam puris ex ore eiiciebat, ex rupta vomica pulmonali, quae ex signis adductis patebat. Hanc Noster p. 615. mense ian. 1765, corpore macilento, bilioso, dolorifico, febre continua, pulsu paruo et debili, materia eiecta, modo vere purulenta et fetida, modo aquae ad instar cum grumis, modo sanguinolenta, sapore falso, cum summa tandem debilitate inuenit. In qua, vsu olei non succedente, alia bona tentauit remedia, quibus melius se habuit; medicis aliis tradita (nam sumtibus publicis curabatur) d. 1. iul. Nostro iterum commissa est, vbi acrimoniam fere correctam conspexit, febre et eiectionibus illis continuantibus. Ibi vsu olei iterum adhibuit, eamque breui restituit. Duos tandem infantes variolosos, tempore p. 617. suppurationis et exsiccationis febre purulenta laborantes, oleo hoc sanauit; vtrum vero haec febris vsu olei, an ex morbi indole, per se curata sit, non audet determinare.

10. *Observationes de eclipsi solis, d. 16. aug. 1765. p. 621.*
Parisiis a Cl. MESSIER institutae, ex idiomate
Franco-gallico, translatae a Cl. I. LULOFs.
Tom. XVII. Pars III. Gg 11. Eius.

p. 627. 11. *Eiusdem eclipsis solis observatio Lugduni facta*
a Cl. LULORS.

p. 632. 12. *Observatio de rhinocerote*, Auctore Cl. SAM.
GMELIN. Cum inter scriptores historiae natura-
lis magna orta sit diuersitas de natura et varietate
rhinocerotis, Noster, quid naturae veri inesset, no-
p. 634. biscum communicare non dubitauit. Africanum ab
Asiatico non differre: adultum hoc animal duobus
cornubus, natu minus vno tantum, recens vero na-
tum nullo gaudere: interim tamen varietates etiam
in his sibi reperisse asserit, ita, vt alia vno, alia duo-
bus, alia demum tribus instructa sint cornubus.
Cum vero sint, qui Asiaticis maiores vires, cornua-
que altiora et maiora tribuant, hoc Nostro a diuer-
so climate, diuerso pabulo vel etiam alio vitae gene-
re pendere videtur, communiq; fato cum aliis be-
stiis, vt adeo ex variis cornubus ad diuersam eorum
naturam non sit concludendum.

p. 637. 13. *Quae de chamaeleonte in capite bonae spei ob-*
seruauit, refert Cl. A. E. VAN BRAAM HOUCK-
GEEST. Comparationem instituit Cl. Auctor in-
ter chamaeleontem, quem Cl. HUSSEM descri-
psit *) et inter eos, quos in capite bonae spei repe-
rit. Parum inter se differunt, modo vt hi paulo
minores sint, linguam vero maiorem, quam ii, quos

p. 639. Cl. HUSSEM descripsit, habeant. Dentibus quo-
que instructos in vtraque maxilla vidit, quibus se de-

p. 640. fendunt, vocemque, vt mures, edunt. Conueniunt
quoque in mutandis coloribus; in procreandis vero
foetibus magnum discrimen est: nam eos non oui-
paros, vt ab omnibus haecenus traditum est, sed vi-

p. 641. viparos obseruauit: vidit porro, chamaeleontem sex
tantum pullos vno partu excludere. Dissectis qui-
busdam

*) vid. Verhandelng. Vol. VIII, in relatt. p. 229. Comm.
nostr. Vol. hoc, p. 137.

busdam, duodecim in aliis, in aliis sex tantum pullos, singulos peculiari membrana, alteri altera adnexa, inclusos reperit, vt ex his posset colligere, chamaeleontem, duobus stadiis partum absolueret sole-re. Hi neonati lingua statim, vt veteres ad insecta capienda vtuntur; colorum vero mutationem non subeunt.

14. *Observationes de frigore mensis ian. 1767.* p. 645.
Auctore Cl. I. C. PALIER.

15. *Additamenta ad tractationem de celeritate* p. 661.
Auctore Cl. I. LULOFS.

Adduntur observationes meteorologicae Zwanen-bourgenfes anno 1764. factae.

XII.

Traité-Pratique de l'inoculation, dans le quel on expose les Régles de conduite relatives au choix de la saison propre à cette opération; de l'âge et de la constitution du sujet à inoculer; de la préparation qui lui convient; de l'espèce de méthode qui doit être préférée; et du traitement de la maladie communiquée par l'insertion. Par Mr. GANDOGER DE FOIGNY, Docteur en Médecine, Médecin Consultant du feu Roi de Pologne Duc de Lorraine et de Bar etc. A Nancy, chez I. B. Hiacinthe Leclerc, Imprimeur-Libraire, et a Paris, chez Merlin, Libraire. 1768. 8. mai. Alph. 1. plagg. 10. absque dedicatione et praefatione.

i. e.

Tractatus practicus de inoculatione, Auctore Cl. GANDOGER DE FOIGNY.

G g 2

Etsi

Etti in commentariis nostris varia, quae inoculationem variolarum concernunt, declarauimus; ab aliquo tamen tempore in hac doctrina explicanda segniores fuimus: tanta enim est libellorum copia, tantus dissensus in iis, tanta repetitio saepius propositorum argumentorum, ut taedeat plura tradere. Ne vero hoc doctrinae medicae caput prorsus seponamus, Lectoribus nostris aliqua ex parte nos satisfacturos credimus, si praesentis libelli recensionem exhibeamus.

Praemissa introductione, exhibetur historia inoculationis et variarum, quas ipsa subiit, reuolutionum, satis exacta quidem, quod originem eius atque fata in Anglia potissimum et Gallia concernit, ea autem, quae in reliquis regionibus acta sunt, brevius complectens, ac, quod miramur, de Germania nostra prorsus silens. Haec autem omnia, quum collecta sint ex scriptis, quae in omnium manibus esse putamus, prolixius indicare superfluum ducimus, et protinus ad opus ipsum recensendum nos accingimus, quod in quatuor partes distinxit Cl. Auctor, in prima considerans momenta, quae operationem antecedunt, in altera, quae in ipsa operatione attendi oportet, in tertia, quae operationem sequuntur, et in quarta quaestiones nonnullas, ad inoculationem spectantes.

p. 88.

In parte prima primo loco de examine subiectorum, operationi submittendorum, agit: ex viginti septem, quos inoculauit, quindecim puellae et duodecim pueri fuerunt, aetatis variae a quadrimestri infante ad homines septemdecim annorum, constitutionis etiam diuersae, vitae generis propemodum vnius eiusdemque, exceptis iis, qui ob nimis teneram aetatem victu animali nondum utebantur, sanitatis satis bonae, nisi quod puer septemdecim annorum haemorrhagia narium periodica, puella octo

anno.

annorum diarrhoea habituali, et alia septem annorum scabie, quae tamen maximam partem curata fuerat, laborabant. Aetas aptissima ea est, in qua p. 97. infans iam a natura ipsa praeparatus est, nempe primorum sex mensium, quibus elapsis, operatio differenda ad tertium quartumue annum, ne dentitio, diarrhoeae, conuulsiones aliique morbi infantiles simul concurrant: vt alia argumenta, quae sedulo ex Auctoribus collecta sunt, nunc taceamus. Quod p. 102. ad constitutionem subiecti inoculandi spectat, in eo absint oportet vitium cognitum v. c. scrophulosum, scorbuticum, morbi haereditarii, constitutio nimis tenera, corpus quocumque modo debilitatum vel quocumque morbo grauiore actu laborans; prudentiae est, subtrahere huic operationi feminas grauidas, aut eas, quibus catameniorum origo instat, aut quibus ea irregulariter fluunt, imo laudanda est solertia TISSOTI, qui etiam pueros ad pubertatis p. 107. terminum accedentes ab eadem excludendos suadet. Admitti e contrario debent infantes sani, temperamenti boni, humoribus bonae indolis praediti, morbo grauiori nullo laborantes; leuiiores enim affectiones solae eandem vix vetant: temperamentum phlegmatico sanguineum opportunius est bilioso et melancholico. Temporis etiam anni, in quo instituenda est operatio, omnino rationem haberi oportet: convenientissimum quidem est ab initio martii ad finem iunii, et rursus ab initio septembris ad finem nouembris: quodsi vero epidemia variolosa et in reliquis mensibus grassatur, solum tempus ab inoculatione suscipienda deterrire non debet. Hoc autem sedulo attendendum est, inoculationem p. 120 tunc locum non habere debere, cum alius quicumque morbus epidemice regnat, cuius characterem vel naturales variolas assumere, ex observationibus patet.

- p. 122. His expositis, Cl. Auctor praeparationem subiectorum considerat. Cum alii eandem nimis strictam exigant, alii eandem prorsus negligant, medium tenet Noster, et assertum Cl. PETIT sequitur, praeparationem sine eo, quod absolute necessaria sit, vtilem esse posse, idque cum ratiociniis factis ponderosis, tum aliorum ac sui ipsius experientia comprobatur. Neque vero ipsa in omnibus subiectis vna eademque esse poterit, sed in genere ad tria momenta reduci se patitur: constitutio nimis debilis ac tenera roboranda; nimis fortis ac robusta debilitanda; quocumque modo vitiata, corrigenda est. Prioribus victu largiori et bonae nutritionis, lactisque usu succurrendum est, concessio in prouentore aetate paucio vino aqua temperato, et praeter reliquis exercitium in aere liberiori commendatur: purgantia ad minimum semel exhiberi debent, pro varietate circumstantiarum repetenda, et caute, nec nisi mitiora, seligenda. Infantibus mercurius dulcis ob vim anthelminticam egregie conducit. Si acrimoniae humorum suspicio quaedam adest, decoctum hordei cum aequalibus partibus lactis remissum mane exhibetur. Secunda classis diminutionem virium exigit; omnia iis subtrahenda sunt, quae vel multum nutriunt, vel calefaciunt; vitae genus sensim mutetur, ne eneruatio subita subsequatur; totum regimen debet esse temperans, parum nutriens, antiphlogisticum; exercitium fortius, non tamen eo usque protractum, ut corpus fatigetur, animi contentio quaeuis remouenda. Venaesectio raro omitti potest, et Cl. Auctor in iuuenibus plethoricis saepe duabus usus est, altera in principio praeparationis, altera die post operationem: rarius tamen in feminis eadem opus est, quia operatio nonnisi tertio die post menstruorum cessationem instituitur. Balnea maximi usus sunt: saepe etiam pedi-

pediluua iis praestant, de quibus tamen recte vsurpandis ad **TISSOTUM** lectores suos Auctor noster amandat. Purgationes minus necessariae sunt, quam in classe priori: vna tamen vix supersedere possumus. Mercurius autem dulcis, ab Anglis tanti aestimatus, hic minus conuenit, sed laxantia vegetabilia seligenda sunt. Seri lactis in tota praeparatione egregius vsus est. Tertia classis correcti-**p. 151.** onem morborum, qui subiecto inhaerent, ex aliis doctrinae capitibus desumendam postulat, neque generaliter quicquam hic praecipi potest. Tempus **p. 152.** praeparationis in subiecto sano quindecim diebus terminari potest: si iam morbosa quaedam dispositio adest, nihil certi hic statuendum est. Mittimus exactiorem descriptionem singulorum punctorum praeparationis, cum ex iis, quae iam adduximus, momenta eiusdem satis patere arbitremur. Specifica antiuariolosa, a quibusdam Auctoribus magno-**p. 156.** pere in praeparatione commendata, Noster reiicit, praeter mercurium dulcem in infantibus verminosis, et in adultis temperamenti pituitosi vel viscida lympham laborantibus. In genere denique repetit, modum seruandum esse in praeparatione, ne eadem iustos limites transgressa corpus vltra modum debilitetur, morbiq; ipsius coctio et eruptio impediatur.

In parte secunda primo de selectu materiae va-**p. 159.** riolosae et loci insertionis differitur. Prior ad quatuor momenta redit, ad subiectum, ex quo ea desumitur, ad modum eandem colligendi et seruandi, ad tempus, per quod illa efficacitatem suam exferit, et ad praeparationes quasdam, quibus indigere eandem nonnulli putant. Quod primum attinet, tu-**p. 162.** tiffimum est, depromere eam a subiecto, quod variolis benignis, discretis, bonae indolis, aut si fieri possit, artificialibus laboret, neque vlllo alio morbo affectum sit: optimum etiam erit, si tum colligatur,

- p. 165. cum variolae non sunt epidemicae. Secundum momentum differt pro diuersitate inoculationis seu incisionibus seu punctura cum lanceolae apice peragenda: in priori casu, vbi fila gossypina pure impraegnantur, eadem ad ignem siccanda sunt, priusquam asseruentur. Materia vtrum ante vel post coctionem colligatur, perinde est: in posteriori casu optimum est, si protinus inoculatio fieri queat, simulac lanceola pure impraegnata fuerit; quod si fieri nequeat, itidem exsiccatione opus est. Sin ex subiecto inoculato desumitur, lanceola vesiculae facta immittenda est, quae eo loco oritur, vbi punctura fuit, quippe in qua pus copiosius, quam alibi, haeret. Quod ad tertium momentum pertinet, absolute quidem dici nequit, quamdiu efficacitas puris asseruati, perduret: optimum tamen est, pure, quam recentissimum haberi poterit, vti, ne inoculatio successu
- p. 173. destituatur. Praeparatio puris, si qua vmquam locum habet, in eo tantum ponenda videtur, vt successiue ex vno subiecto inoculato in alterum transferatur: tota autem haec res mera coniectura est, experimentis demum comprobanda.
- p. 176. Quod locum insitionis concernit, brachia praefenda sunt femoribus, quia idea reuulsionis, quam nonnulli sibi finxerunt, nulla est, vulnera femorum difficilius sanantur, crebriusque decubitus ad glandulas inguinales efficiunt, quam ad axillares, si operatio in brachio instituta fuerit; porro, quia incessum sub statu conualescentiae impediunt, quia Angli illam in solo brachio peragunt, et denique, quia in feminis decori ratio iusta habenda est.
- p. 179. Pertractantur postmodum diuersae inoculationis methodi, in Europa vsitatae, nempe per vesicatorium, per incisionem ac per puncturam. In incisione praestat filis, pure impraegnatis, vti, quam pustulis ipsis exsiccatis et in puluerem reductis. Cauendum praeter-

praeterea, ne incisio profundius in cutis ipsius sub- p. 186.
stantiam penetret, ex qua causa periculosissima
symptomata ipsamque mortem euenisse compertum
est. Proficuum etiam censetur in quouis brachio p. 188.
incisionem facere, quo certius euentus respondeat.
Methodus puncturae, Suttoniana vulgo dicta, ex
epistola Cl. MIDDLETON ad Cl. DEPOTEUX
data, copiose et exacte describitur, et varia de ea p. 190.
iudicia ex notissimo DIMSDALII opere *)
vna cum correctionibus ab eodem in usum vocatis
adduntur, vbi tamen, demonstrata contradictione, ab
hoc viro Cl. admissa, monet Auctor, se multum ca-
uere, ne aliqua inter aegrum variolosum et inocu-
andum communicatio intercedat, sed vterque licet
in vna eademque domo, singulus tamen in peculiari
conclauui contineatur.

Quaeritur ergo, quanam ex tribus recensitis p. 204.
methodis prae reliquis sit eligenda? Methodus per
vesicatorium id tantum commodi habet, vt meticu-
losiores aegri nullum instrumentum videant, neque
sub ipso operationis momento dolorem percipiant:
incommoda autem inde oriunda, et multo grauiora,
quam vt leuioribus istis commodis aequiparari pos-
sint, iam id effecerunt, vt haec methodus nostro
aeuo plane obsoleuerit. Methodus per incisionem
multa incommoda cum priori communia habet, prae- p. 211.
sertim quod mutatio per vnguenta et emplastra su-
perficieis partis, in qua incisio facta est, dignosci ne-
queat, quae in eadem geratur, neque ergo euen-
tus morbi praeuideri possit, item quod frequentis-
sime vulneribus istis erysipelas brachii superueniat.
Methodum Suttonianam reliquis anteponendam
esse, suadent ratio praeparationis, quamquam in
ea Noster purgantia mercurialia, vti iam ex supe- p. 214.
rioribus patet, minus probat; comoda ex ratione

G g 5

vulne-

*) Comm. nostror. Vol. XVI, p. 694.

vulneris inflicti redundantia: regimen et admissio aeris moderate frigidi; exempla innumera fere in Anglia occurrentia, quibus patet, contagium aequè bene hoc modo, ac reliquis, cum corpore communicari, p. 222. immo methodum istam naturae maxime conformem atque adeo antiquissimam, neque nunc demum a SUTTONIO inuentam esse, siquidem puncturae iam multos ante annos in regionibus, orientem versus sitis, adhibitae, aer frigidus in tempore eruptionis variolarum naturalium iam a SYDENHAMIO, BOERHAAVIO aliisque summi nominis medicis commendatus, et virtutes specifica mercurialium et antimonialium ab eodem BOERHAAVIO multis laudibus euectae fuerint.

p. 225. Quo autem de successu operationis certiores redamur, varias cautelas ab insitore obseruandas, praescribit Cl. Auctor. 1. Si effectus inoculationis primis diebus sese non monstauerint, non ad trium hebdomadam, quod Angli faciunt, sed ad nouem solum aut decem dierum spatium nouam, nec, si haec quoque frustranea fuerit, eodem rursus tempore elapso, tertiam repetendam operationem differt. 2. Praestat, quod Anglis itidem solenne est, plures simul operationi submittere, ne deficiens successus operationis in malam puris indolem coniiciatur. 3. Probe dispiciendum est, ne subiectum, inoculationi subiiciendum, naturalium iam variolarum contagium occulte delitescens secum gerat: qua in re definienda dici vix potest, quanta circumspectione, vel in ipso operationis actu, opus sit, ne fallamur. 4. Si variolae naturales familiae cuidam constanter exitiosae fuerint, causam huius funesti euentus quouis modo indagari, indagatamque remoueri oportet. 5. In feminis inoculatio, non nisi altero vel tertio post menstruorum profluuium cessans die, instituenda est. 6. In infantibus prospiciendum, ne infortunia ex casu aliisque, externis iniuriis enata inoculationi tribuantur.

Progredimur ad partem tertiam, in qua momenta post operationem factam animaduertenda describuntur: et primo quidem capite historia morbi exactissime exposita exhibetur, quam in quatuor pe- p. 235.
riodos Cl. Auctor diuidit, nempe eruptionis localis, febris inuasionis, eruptionis generalis, ac denique suppurationis et exsiccationis pustularum. In singula periodo sollicite discrimen inter symptomata localia ab incisione, et a punctura profecta annotat, et ex eorum inter se comparatione hanc illi omnimode praefert, in duobus aegris altero febris die eadem duplicatam animaduertit, qui postmodum insigni copia pustularum variolosarum affecti sunt, quod procul dubio maximam partem calori intensiori temperiei anni adscribendum erat. Vlcus ab incisione relictum diutius suppurat, quam quod a punctura superstes est, vnde nonnulli posteriorem methodum suspectam reddere allaborauerunt, quod p. 277.
eadem corpus non satis depuretur; verum pus istud non amplius variolosum esse, cum pustulae reliquae exsiccatae fuerint, ex eo patet, quod inoculatio, eiusmodi pure facta, plane frustranea est. Interim tamen experientia Cl. Auctoris eum docuit, etiam post puncturam in corpore cacochymico vlcus p. 279.
diuturnius relinqui posse, quo rite tractato, corpus tandem meliorem sanitatem acquirat.

Caput secundum ea exponit, quae medico in p. 281.
morbo ipso peragenda incumbant. Proprie nonnisi secunda periodus medici attentionem et moderationem exigit; reliqua omnia naturae committenda sunt. In febre ergo moderanda omnis cura adhibenda est, vbi inprimis copiose agitur de liberiore ac frigidiore aere admittendo, et de commodis inde expectandis. Quamquam autem Angli neque insigniorem frigoris gradum reformidant, Noster tamen conuenientissimum eum iudicat, in quo ther- p. 292.
mome-

- mōmetrum Reaumurianum ad 10 vel 11 gradus ascendit. Dispositio diaetae, remediorum, exercitii corporis cet. ample praescribitur ad normam potissimum DIMSDALII. Febris intensior, ad
- p. 310. leuiores deliria vel in infantibus ad conuulsiones vsque increfcens, folis temperantibus nitroſis et camphoratis ac clyſmatibus cedit, neque vñquam veſicatoriis opus fore Cl. Auctor exiſtimat. Eruptio
- p. 312. nimis impetuoſa copioſiorum puſtularum eodem modo, vt febris iuſto vehementior, tractari debet: conuenit etiam apoſemate aluum ducere, quae methodus DIMSDALIO optime ceſſit. Nimis parca ex aduerſo copia puſtularum nutritionem paulo plenior
- p. 315. exigit, nec tunc vini uſus improbat, quod tamen generoſum ſit et cum aqua permiſtum. Exſiccatione peracta, aegrum intra duarum hebdomadarum ſpatium bis vel ter purgare ſufficit: curationem uſus decoctionis tonicae et diureticae terminat, quae ex corticis chinae in puluerem reducti granis triginta et ſalis tartari granis decem conſiſtit, quae in aquae communis libris duabus per momentum temporis ebulliant, cui deinde parum lactis addendum eſt: in conualeſcentiae ſtatu maximopere cauendum eſt, ne, mutatione nimis ſubita, aeger ad priſtinam vitae rationem re-
- p. 318. grediatur.

- Caput tertium varietates quafdam ſiſtit in decurſu variolarum artificialium interdum obſeruandas. Cl. Auctor vidit aliquando totum morbum
- p. 319. intra nouem dies abſolui, non niſi in loco puncturae puſtula maiori enata: ſimile quid DIMSDALIVS etiam in nonnullis aegris obſeruauit, qui dubitauit quidem, vtrum hic morbus vere varioloſus dici deberet, quod tamen vtique fieri debere, Noſter variis argumentis comprobatur. In aliis contra ſubiectis morbus ſolito longius protrahitur. Illud exanthema-
- p. 328. tum, cum variolis coniuñtorum, genus, quod Angli *raſh* dicunt, Noſter numquam vidit. Nauſeae

seae et vomitus sub initium febris accedentes, si diutius durent, aqua tepida, vel ubi stimulo opus est, in adultis grano vno tartari emetici addito, vel septem aut octo granis ipecacuanha cum decem vel duodecim granis absorbentis terre remissis, euacuatio promouenda est, quae dosi tamen in infantibus et subiectis tenerioribus minui debet: quibus vsurpatis, si nauseae tamen subsistant, apozemate laxante tolluntur, non neglecto simul clysterum vsu. Secundariam eruptionem variolarum insitarum, morbo nondum ad finem P. 330. perducto, cuius DIMSDALIUS meminit, itidem Noster numquam conspexit. Inter symptomata, quae variolis hoc modo insitis superuenire possunt, so. P. 334. lummodo erysipelas et ophthalmia attentionem quamdam merentur, quae ideo breuibus adhuc pertractat, licet seipsum numquam eadem animaduertisse profiteatur.

Quarta pars operis primo inquit, num variolae insitae a recidiuis tutos nos reddere possint? quod absolute adfirmatur, si nimirum inoculatio cum successu peracta fuerit. Argumenta complura, quae maximam partem ex scriptis notissimis inoculationis defensorum deprompta sunt, ad hanc propositionem comprobendam adduxit Cl. Auctor, ex quibus, ob nouitatem rei, non nisi vltimum recensebimus, quo P. 360. narratur Cl. RICHARD DE HAVTESIERQ iuueni bono cum successu variolas inoculasse, eamque operationem, homine in domo remota detento, per integrum annum ad minimum vigesies repetiisse, quo videret, vtrum ille variolas plus simplici vice experiretur, aut a saepius applicato varioloso contagio vllo modo corpus detrimentum capturum esset neutrum autem eorum euenisse.

Quo clarius asserti huius veritas elucescat, secundo P. 365. loco variolae verae siue naturales eae fuerint, siue artificiales, et sic dictae spuriae, quas tamen hoc nomine prorsus indignas esse Cl. Auctor demonstrat, mutuo

- mutuo inter se comparantur, et discrimen inter
vtraſque, ratione durationis morbi, periculi, quod in
illis ſemper timendum, in his nullum fere eſt, eſſe
ſtium et ſymptomatum oſtenditur. Alia vero quae
ſtio eſt, num perſona repetitis vicibus inoculatione
p. 384. at ſemper ſine ſucceſſu, ſubieſta, a naturalibus va-
riolis immunis cenſenda ſit? quod quidem abſolute
affirmari non poſſe Auctor noſter putat, ſed mul-
tos tamen homines eiſmodi in tenerrima aetate
ſibimetipſis quidem inſciis, iisdem laborare potuiſſe
argumentis variis omnino verosimile reddit.
- p. 388. Tertio diſquiritur, vtrum inoculatio ſit reme-
dium vltcrius extendendi, an potius arcendi et re-
ſtringendi contagium varioloſum? quorum itidem
prius, collectis potiffimum ex aliis ſcriptoribus pro
p. 408. bationis argumentis, aſſeritur, et inde applicatio ſi-
ad influxum inſitionis variolarum in commodum vni-
verſae reipublicae, quem vt toti ſuae patriae, ita
inprimis Lotharingiae, in qua viuit, ante oculos
ponit, animumque patriae ciuiumque amore incen-
ſum dilucide ſatis declarat Cl. Auctor.
- p. 417. Additamenti loco obſervationes quaedam de me-
thodo Suttoniana cum in artificialium variolarum in-
ſitione, tum in tractandis naturalibus, ex libro Cl.
DIMSDALE deſumtae et in Gallicam linguam
translatae, ſubiunguntur.

XIII.

Tal ovn den fin-ullega Får-Afveln, hållet för Kongl. Vetenskaps Akademien, vid Praesidii nedläggande, den 25 April 1770, af CLAS ALSTRÖMER, Affessor i kongl. Commerce-Collegio, Ledamot of Botan. Societeten i Florentz. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1770. pag. 110. 8 mai.

i. e.

Sermo de ouium lana teneriori vestitarum progenie, habitus, in confessu R. Academiae scientiarum, quum munere praesidis defungeretur, a CLAUDIO ALSTRÖMER.

Ad hoc argumentum persequendum Cl. Auctorem parentis eius beati, de patria oeconomicis, et opificiorum variorum, inuentis bene meriti, excitauit et exemplum et admonitio. Vt vero tam scite periteque illud pertractaret, singularis illa effecit, qua pollet, historiae naturalis scientia, commoratio iis in regionibus, quibus laus primariae in ouibus colendis scientiae adscribenda, Hispania nempe et Anglia, diuturnior ipsa eius in patria crebro hac de re capta experientia, librorum denique cuiuscunque generis huc spectantium lectio. Nostrum erit, iudicii lati rationem in sequentibus reddere. Quum vero multa simul Cl. Auctor attingat, quae oeconomiam praecipue feriunt, in his, utpote ab instituto nostro magis alienis, licebit esse breuioribus.

In culturae ouium origine fatisque delineandis Auctor noster ad remotissima usque tempora regreditur, ouesque inter prima animalia ob cibum vestitumque curae fuisse cum VARRONE arbitratur, licet artem, lanam in telas contexendi, paullo serius homi-

p. 7. homines didicisse omnino probabile sit. Et hoc quidem genti Elamiticae videtur primum nota fuisse. Quid dein Aegyptii, gens Iudaica, Phoenicii, Graeci, Melitenses, Romani, in hac re praestiterint, ex monumentis antiquis operose Cl. Auctor eruit. Accedit tum ad initia progressumque ouium culturae texturarumque in Hispania, vrbibus Burgundicis praecipue iis, in Brabantia et Flandria sitis, in Belgio, in Anglia.

p. 20. Quod lana Hispanica teneritate et praetio Angilcae antistet, non climati, sed dignitati et solertiae, in qua ouium cultio apud gentem istam inde a primis temporibus habetur, tribuit. Pastores olim, siue, vt nunc vocantur, gregum ouillorum possessores in societatem per totam Hispaniam coierunt, quae constituto tempore et loco conuentus suos habuit. Postea hi gregum domini regia lege auctorati fuerunt.

p. 24. Greges ipsi pabuli causa ab vno loco in alium transferuntur, hieme scilicet in planitiem prouinciarum australium, et aestate in frigidiorum prouinciarum colles et subalpina loca. Et sub hac quidem ouium migratione liber pascuorum etsi alieni fundi,

p. 25. ouibus vsus concessus. Sunt et alia instituta, in commoda huius rei pecuariae parta, facta, quae hic recensere prolixum nimis foret. Indicamus modo

p. 27. locis cultis publica lege indictum, vt pro translatione ouium via latitudinis vlnarum suecicarum 126 aperta maneret, pastores a quibusdam publicis expensis immunes esse, ex promptuariis regiis mitiori pretio sal istis vendi, licere illis sub hac migratione pro necessitate arbores prostrernere, militum contra latrones vel hostes, si opus praesidium concedi, et quae alia eiusdem generis commoda sunt. Per

p. 31. totum annum oues Hispanicae, eo tempore excepto,

p. 32. quo tondentur, sub dio degunt. Ad speciei, autem integritatem et praestantiam conseruandam in primis

nis ad varia sub copula momenta et arietum pretium, quos robustos, capaces propagationis et tenera lana obteatos desiderant, respiciunt. Curam quoque haud exigua habent, ne agnis tenellis vllum damnum accedat; rarius vero in Hispania morbi ouium incidunt. Tonsio haud exigua sollemnitate p. 36. perficitur. Omittimus, quae de ipsa lanae venditione Cl. Auctor notauit.

In Suecia prisco tempore oues, ad progeniem earum p. 49. perficiendam ex Germania petita, quae quidem Suecicis praestantiores fuerunt: ob lanae autem rudioris naturam, ad telam teneriorem parandam, quotannis copiam lanae foris, praecipue ex Anglia, arcessere opus fuit. Sed b. parentis Auctoris nostri studio et vigilantia, inde ab anno 1715 quotannis ex aliis regionibus, ouium praestantia inclytis, oues in Sueciam translatae. Fuerunt inter has caprae Angolenses ob lanam sic dictam camelianam celebratae. Hae omnes et singulae, sub tanta et si climatum varietate in Suecia, probe viguerunt.

In reliqua huius commentationis parte Auctor p. 51. Cl. causas disquirat, quae lanam teneriorem ouibus concilient, et de modo, quo haec ipsa in septentrionalibus regionibus obtineri queat. Vtrumque optime demonstrari existimat legibus, quas natura in generatione animantium obseruat, perpenfis, quae, vt vltius illustretur, eandem primum cum propagatione plantarum, ad mentem Ill. a LINNE, comparat. p. 53. Stirpes nimirum diuersae speciei connubium ineunt, noua, quae ex hisce emergit progenies, similitudine, quoad florem cum matre, quoad radicem autem, caulem, folia, hirsutiem, magnitudinem, colorem aliasque conditiones cum patre conueniunt. Patet hoc generatione stirpium hybridarum vel fortuito vel studio deditaque opera facta, quarum exem-

pla hic recensentur. In hisce stirpibus mirum est, quod eousque quaedam matrum naturam seruent, vt iisdem insectis pro pabulo, ac matres, inseruiant, quod vero iam eam climatis, situs, et terrae diuersitatem ferant, quae antea neutrius parentis naturae accommodata fuit.

- p. 59. Varias plantas, hybrida generatione post creationem productas, sensim prout verosimile Nostro est: ita eadem ratione animalia varia enata, haud absonum illi videtur. Et inde deriuandum esse existimat, quod limites definire inter quosdam animalium ordines, genera et species tam arduum sit. Hanc ob nimiam affinitatem limitum statuendorum difficultatem variis exemplis Cl. Auctor illustrat. Ita pecora genus quasi intermedium inter glires et belluas constituunt; grallae inter anseres et gallinas; nantes inter serpentes et pisces. Simia medio loco inter homines et lemures incedit; phoca inter mustelam, lutram et trichechum; phasianus inter meleagridem et tetraonem. Et quoad species, difficile est distinguere simiam dasypum a sciurea; canem a lupo et vulpe; tigridem a pardo; erinaceum americanum ab europaeo; dromedarium a camelo bactriano, asinum a zebra et s. p. vt de auibus, amphibiiis, piscibus, insectis et vermibus nihil dicatur. Vt vero hanc opinionem verosimilem reddat, initio rerum assumit tot modo animalia, quot ordines naturales fuissent creata, quae inter se nuptias celebrarunt, vsque dum ea omnia genera & species emerferint, quae iam prostant. Sponte apparet, eiusmodi consociationem inter ea animalia locum habere non potuisse, quae magnitudine, figura praecipue partium generationi dicatarum, elemento circumfuso vel discordia quadam a se differunt. Hac ratione explicat copiam vel generum vel specierum, qua quidem ordines vel quaedam genera prae ceteris abundant. Fauisse autem

tem amplexui mutuo vel libidinem singularem, vel defectum coniugis commodioris, coniicit. Refert p. 65. ad ulterius stabiliendam hanc hypothesin Auctor, quae REAUMURIUS de cuniculorum cum gallinis coitu narrat, alii de taurorum cum asina vel equa nomine Iumarts, nec non de asinorum cum vacca nomine Kumrah confociatione; nam de mulorum et auium hybridarum ex connubio fringillae canariae et carduelis generatione inter omnes constat. Coniecturas suas quoque extendit ad alia animalia. Vt exempla pauca ex multis Cl. Auctoris excitemus, probabile illi videtur, viuerram ichneumonem initio a viuerra zibetha et fele ortam, ceruum camelo-pardalem a ceruo capreo-lo et capra ceruicapra, simiam inuum a syluano et cynocephalo, anserem cygnoidem a cygno et anse-re, picum medium a maiori et minori rel. Com-p. 67. modissimum connubium est inter animalia eiusdem speciei, sed varietate inter se diuersa, vt canum exemplo constat.

In animalibus hybridis vero pariter, ac in plantis, percipitur, quod quoad corporis figuram conueniant cum matre, quoad externum vestitum autem, h. e. lanam vel pilos, ad patrem propius accedant: repetitque hic Cl. Auctor LINNAEI narrationem, quod, cuniculo comprimente gallinam, exclusus fuerit pullus lanatus. Praecipuum igitur ad p. 69. praestantiam lanae in sobole conseruandam Auctoris consilium est, vt arietes eligantur optimi. Quanti momenti hoc sit, ex VARRONE, COLUMELLA, PALLADIO, VERGILIO et omnium fere, ouium culturam sibi curae habentium, consensu demonstrat, idque porro quibusdam peculiaribus exemplis illustrat. Ea tantummodo conditione putat sobolis p. 78. maiorem cum matre esse quoad externa similitudinem, quando pater robore et vigore inferior est.

p. 82. Verum etsi haec arietum vis satis experientia
vfuque confirmata esse videtur: sunt tamen alii, qui
vel climati, vel calori, vel pabulo, vel vfu liberae
aurae, vel ouium translationi crebriori, vel sal
exhibito lanae praestantiam tribuant. Sed precario
haec omnes causas esse assumtas a Cl. Auctore multis
argumentis euincitur. Observationibus palam est,
quo densioribus pilis pellis constet, eo longioribus
et tenerioribus quoque constare. Rationem huius
rei explicari existimat arietis grandioris cum femella
minori connubio, per quod, quum in sobolem ea-
dem pilorum copia transferatur, hi non possunt non
densius procrefcere et consequenter maiorem tene-
ritatem adipisci. Etenim Angliae et Hispaniae oves,
praestantia lanae celebratae, exiliores sunt, quam
reliquae rudiori lana tectae.

p. 95. Anno 1764 in Suecia ouium praestantiorum nu-
merus ad 88, 953 ascendit, praeter 23, 384, vilioris
paullo notae.

p. 97. Consilia vero Cl. Auctoris ad praestantiam lanae
conciliandam, vt rem paucis absoluamus, sequentia
sunt. Primum igitur est, vt aries ad propagationem
idoneus robustiorque acquiratur. Tanta eiusmodi
aries in Hispania in existimatione est, vt vetustissimo
tempore imperialibus 1000 fere censeretur, quia
hodie adhuc ibidem 100 nummis aureis Hispanicis
venit. Si mater pariter probae indolis est, eo melius.
Nonnisi tertio autumnio congressus concedendus,
nec nisi ad summum 15 oves femellas comprimere
vni arieti liceat. Post sextum autumnum haud faci-
le pro imprægnatione aries seruandus, nec femella
vltra septimum autumnum apta generationi iudi-
canda. Agni debilioris et vilioris notae mox seclu-
dendi. Quum emulcendo lac ouium lana perdat,ur,
ab hac re abstinendum. Pascua debent mutari, quo-
ties vnquam fieri potest, quum praestantiores her-
bae

bae sensim confumantur. Aqua sit pura, ne fascio-
lae hepaticae et hirudines deglutiantur. Pascere eas
sub dio, maxime salutare est. Lotio ouium non con-
venit, vt quae sua natura aquam reformidant. Ton-
sio semel per annum modo fieri debet. Caudam
praecidere ad exemplum Hispanorum licet, ne la-
nam, lumbis insidentes, conspurcent. Iusta propor-
tio ratione numeri arietum, ouium femellarum et
agnorum requiritur. Proficuum etiam iudicat Cl.
Auctor, vt iis in locis, vbi greges minores modo ali a
singulis possunt, greges isti conducentur et commu-
ni cura ad regulas suppeditatas comprehendantur.

XIV.

De sanguine eiusque motu experimenta refert
et ad orationem solennem, noui muneris ad-
eundi causa a d. 2. octobr. 1767 recitan-
dam, inuitat D. GEORGIUS CHRISTIA-
NUS REICHEL, Med. Prof. extraord. facult.
Med. Lips. assess. et Acad. Imperial. nat. cu-
rios. socius. Lipsiae. Ex officina Breitkop-
fia. 4. pl. 4. tab. aen. 1.

Quamuis in nullo fere alio doctrinae physiolo-
gicae capite tanta certitudo conspiciatur,
quanta ab HARVAEI inde temporibus in caput de san-
guinis circulo introducta et per iterata experimen-
ta aucta est; tamen hic quoque non desunt obscu-
riora, quae explicare et sollertissimus non poterit.
Taliū nonnulla Cl. Auctor, cuius praematuram
mortem Academia nostra adhuc luget, in hoc sche-
matismate experimentis microscopicis declarare anni-
mitur. Et primum quidem instrumentorum, quae
adhibuit, fabricam describit. Vfus autem est mi-
croscopio, quod ad LÜBERKÜHNII methodum sibi

ipse construxerat, sic adaptatum, vt, sine magno, quod in aliis accidit incommodo, solari applicari, atque ita imago rei maior et clarior effici possit.

Eorum autem, quae huius ope detexit, sequentia notatu digniora nobis visa sunt:

- p. 9. In arteriis, etiam minoribus, globulorum figura fere constanter rotunda apparuit. Color globulorum non idem; in maioribus egregie ruber, diminuta vasis diametro sensim ad flauedinem declinabat. In minimis, praeter colorem, figura quoque globulorum rotunda, in oblongam mutata est. In rana
- p. 19. 20. 21. languescente impulsus sanguinis alternum in arteriam bene distinxit. In quarundam ranarum mesenterio maculae nigrae obuenerunt, dubiae indolis, cum non in omnibus obseruarentur. Conuulsiui ranae motus globulorum progressum adeo turbauerunt, vt retrogradus appareret; languore eidem inducto nullus plane sanguinis motus conspicuus aderat. Motus, qui desuisse videbatur, irritato animali ita restituebatur, vt a maioribus arteriis ortus in minores impulsu demum propagaretur; in venis motus simili modo in maioribus primum, deinde et in minoribus restaurabatur. Ligata in diuisionis angulo
- p. 11. 17. arteria, sanguis ligatura impeditus, in alterum, priori vacuo relicto, abiit. In rupta forte vena Cl. Auctor effuso sanguine vidit colorem, in coaceruatis globulis rubrum, in singulis dilutum. Idem quoque in
- p. 23. 12. arteria rupta contingere vidit. In mure domestico arteriosus sanguis venoso dilutior, motus in vtrisque rapidior quam in rana apparuit, in venis tamen globuli exacte dignosci potuerunt. In eodem vasa minora sanguinem flauescens, et minora, vnius globuli, sanguinem albidum vehentia vidit. Eadem fere omnia in vespertilione obuenerunt. In ranae pulmonibus, sub expiratione animalis, sanguis per vasa, vnum globulum transmittentia, in membranas cellu-

cellularum, roris in modum effusus est, in inspiratione autem quieta omnia visa sunt. In rana terre-p. 16. stri venas mesenterii replebant particulae maiores, tantae molis, vt vas ab iis quodammodo distenderetur. In arteriis haec corpora non adfuerunt. Anp. 17. globuli aërei? In vasis arteriosis atque venosis, eorumque praecipue ramis maioribus globuli, in axe positi, ruborem pellucidiorum ostenderunt, in parietibus obscuriorem, quod ex tunicarum crassitie facile explicari poterit. In aliqua vena maiori ranaep. 21. sanguinem immobilem vidit, diu ita haerentem, donec moto animali concuteretur. In membrana digitorum pedis ranae, vasa duo maiora ad latera digiti excurrentia, caetera vero minora flauum humorem vehentia deprehendit. In mure color sanguinis arteriosi dilutior quam venosi apparuit; ita tamen, vt in axe globuli obscuriorem colorem, quam in parietibus ostenderent, ideoque inuersa ratione, quam p. 17 in frigidis Cl. Auctor obseruauerat. Minora ratti vasa motum progressuum sanguinis p. 26. melius quam maiora conspiciendum praebuerunt. Globulos autem in calidis animalibus*) omnibus, quae vidit, minores, quam in ranis deprehendit.

Ex his enarratis sequentia praesertim, caeteris omissis, colligi posse videntur:

Sanguinem venosum ab arterioso differre, cum globulorum figura in minimis arteriis mutetur, et globuli, sic mutati in venas transeant, imo in maioribus adeo venis ita persistant. Quanquam enim Cl. Auctor haec in frigidis tantum vidit, eorum

Hh 4

tamen,

*) Vulgo creditum est, calidi sanguinis animalia nullos globulos rubros in vasis suis vehere, vt adeo HALLERUS de ea re dubitet. Elem. Tom. II. p. 50. Id tamen Nostri experimentis iteratis extra omne dubium positum esse videtur.

H. I. pag. 12. lin. 22. ex errore typograph. pro vena leg. arteria.

tamen, quae in calidis perspexit, phaenomenorum nullum huic coniecturae contrarium est. Porro, colorem sanguinis magis minusue rubrum a numero globulorum aggregatorum pendere ex plus vno experimento elucescere videtur.

Adiecta est tabula aenea, ab Auctore delineata, in qua globulorum figura et differentia satis eleganter repraesentatur; quae, etsi naturam non prorsus exprimat, caeteras tamen icones, quae hac de re traditae sunt fere omnes superare videtur.

XV.

Adversaria medico practica Vol. I. Pars I. 1769.
Pars II. III. IV. Lips. 1770. 8 mai. alph. 2.
pl. 2. fig. aen. 4.

Non nuper Cl. LUDWIG, praefatione huius operis lecta, ubi causae, quae institutum horum aduersariorum vulgandorum retardarunt, recensentur, de his edendis cogitasse, ac eorum edendorum vnum hunc esse finem, vt doctrinae suae alumni ad medicinam faciendam sese conuertentes, his suis monitis practicis ducantur et iuuentur, intelleximus. Quapropter et hic vel a Cl. LUDWIG, vel ab aliis omnia, quae praxin medicam tam clinicam, quam chirurgicam et forensam spectant, ita colliguntur, vt harum rerum expendendarum fundamenta non solum ex practicis, sed et physicis, anatomicis, chemicis, praecipue pharmaceuticis petantur doctrinis. et, si ad rem explicandam opus est, iconibus illustrentur. Nec minus disputationes, prousiones et orationes Lipsienses, ad externos non semper venientes et ab ipsis desideratae, in his aduersariis ita repetentur, vt interdum praecipua solummodo capita cuiusdam argumenti breuiter excerpantur, interdum autem integri libelli

libelli, nouis obseruationibus ditati, prodeant. Tandem et varia doctrinae practicae capita non penitus in institutionibus Cl. LUDWIG exhausta, emendabuntur ac diligentius proponentur. Atque ita hoc opus inceptum et primum volumen, quod quatuor partibus constat, vulgatum est.

In cuius parte prima continentur sequentia: Vol. I.
P. I.

1) *Morbi epidemici, sub finem anni 1757 et initium 1758 Lipsiae grassantis, brevis recensio, mense maio et iunio 1758 elaborata.* Cum morbus Lipsiae non solum, sed etiam in variis Germaniae vrbibus, ac iis quidem, in quibus nosodochia militaria fuerunt disposita, grassaretur, non incongruum duxit Cl. Auditor eundem examinare, caussarum et symptomatum vicissitudines ac rationes, electasque medendi methodos repetere et ex obseruationibus suis aequae, ac aliorum medicorum Lipsiensium breuem eius historiam contexere. Erat febris continua putrida petechialis potissimum, interdum febris continua plus minus maligna, mox cum purpura, mox sine ea, interdum hic morbus veram indolem continuae lentae, quam HUXHAMUS neruosam dicit, prodebat. Humida ac tepida tempestas, quae frigidam sequebatur, dein contagium ipsum, in se consideratum, ex commercio cum aegris inductum et porro euolutum, huius morbi generandi occasionem potissimum prae-buerunt. Dispositio ad malignitatem suscipiendam non tantum in solidis, circulum humorum dirigentibus, sed in intima potius humorum mixtione posita videbatur, quae non satis accurate definiri potest. Ad insignem morbi differentiam perpendendam ad quinque imprimis momenta respicitur. Ac primum quidem ad ingressum morbi, secundo ad excretiones, in eo obuenientes, ex primis pariter ac se-

cundis viis, tertio ad febrem plus minusue acutam, quarto ad motus spasticos, quinto denique ad varietatem hominum, morbo correptorum.

p. 37. Nos de ingressu morbi videamus. In aliis morbus leni impetu, catarrhali simili, incipiebat et die quinto ad septimum vehementiora symptomata succedebant. In aliis quinto iam die petechiae erumpebant, illique nono seu decimo die, raro decimum quartum attingentes, peribant, sopore vel deliriis ferocibus accedentibus. In aliis mox ab initio amaror oris cum nausea, dolor capitis vehemens, celerris virium prostratio, noctes insomnes, anxietas praecordiorum, oculi tristes, facies cadauerosa, fastidium carniū, imo omnium alimentorum, haemorrhagiae incompletae, sudores copiosi viscosi, cutis siccitas cum insigni ardore, vrina turbida cum sedimento leui, tristem morbi exitum indicabant. Quod si vero sub pulsu aequali et satis forti deliria erant mitiora, cute interea leni madore affecta, aegri vix sibi conscii et praecipue surdastri, minime autem soporosi, lentam morbi solutionem interdum ad vigesimum primum diem et ultra protractam, promittebant.

p. 50. Indicatio curatoria nititur euacuando et alterando. Venaesectione non adeo opus erat, nec nisi ab initio, quoniam non ad inflammatorias sed ad putridas potius pertinebat haec febris. Vomitoria proderant ab initio interdum, laxantia, clysmata et in progressu morbi, si opus erat. Compositio rhabarbari cum ipecacuanha in sedanda dysenteria erat utilis. Diaphoretica ab initio, ad contagium arcendum in robustis felici cum successu exhibebantur, iisque opiata ad spasmos sedandos et largiorem diaphoresin excitandam non sine fructu propinabantur. Ceterum inter alia camphora, liquor cornu cerui succinatus, applicatis vesicatoriis, nec non acida et cortex Peruvianus sunt adhibita. Blandiora cardia-

ca quamquam sine noxa sunt data, tamen morbi temporis et aegri constitutionis ratione habita, haustus vini boni Rhenani seu Franconici prae reliquis praestabat. Nec alexipharmaca calidiora, etiamsi a medicis plerumque iure in putridis reiiciuntur, cum acidis dulcificatis combinata, febre exigua, deliriis aliisque grauioribus symptomatibus absentibus, sine fructu praescribebantur.

2) *De extracti hyoscyami viribus et efficacia prae-* p. 71.
sertim in melancholicis et epilepticis morbis a Lic. IO-
ANNE ERNESTO GREDING, Ptochotropheei
Waldheimensis et Mitweydenensis medico ordinario.
Selegit nimirum Cl. Auctor triginta aegros, ad quos
subinde decem alii accesserunt, quorum decem me-
lancholia et, per interualla tantum, mania laborabant,
vndecim perpetui erant maniaci, quatuordecim epi-
lepsia et quinque tam epilepsia, quam mania vexa-
bantur. Incipiebat a grano vno, saccharo mixto, et
vsque ad octodecim grana per diem dosin in non-
nullis augebat, ita vt tres propemodum huius ex-
tracti libras consumeret.

Curationum igitur historiis traditis, effectus hu- p. 113.
ius medicamenti Noster contemplatur. Erant sudor
sat copiosus, somnus plerumque profundus, placidus
tamen ac reficiens, animi tranquillitas atque sereni-
tas, corporis vigor et maior alacritas. His accedunt
temporaria brachii sinistri paralytici expeditior mo-
bilitas, nec non aliqua tam epilepsiae, quam maniae
mitigatio. Alii vero de obnubilatione, grauitate ac
dolore capitis, vertigine conquerebantur et sensuum
internorum torpore. Varia exanthemata, vt macu-
las fuscas mox apparentes, mox euanescentes, impe-
tigines, pustulas in mento et gena dextra cum nasi
exulceratione, nec non furunculos hoc extractum
cum leuamine in nonnullis produxit. In aliis vri-
nam

nam copiosam, diarrhoeam et vomitus, in paucis obstructionem effecit, menstruorum fluxum, ex quinquemestri spatio prorsus cohibitum, restituit, eumque rite succedentem omnino auxit. Saliuationem excitauit, nec non muci narium secretionem, dolores rheumaticos, tussim, vti in phthificis, singultum ac totius omnino corporis languorem ac debilitatem.

Quamquam igitur huius extracti effectus non sunt spernendi, tamen, cum ne vnum quidem ab epilepsia vel mania, nisi cum dispendio non solum sanitatis, sed etiam vitae, prorsus liberauerit, Cl. Auctor concludit, hyoscyamum nec tuto posse exhiberi vsu interno hominibus, nec remedium esse in melancholicis et epilepticis morbis, ita, vti quibusdam videtur, salutiferum.

p. 119. 3) *Responsum, principis iussu, super variolarum institutione a facultate medica Lipsiensi datum mense iunio 1761.* Commendatur inoculatio ita, ut obiectiones, quae contra eam adducuntur, primum refutentur, et dein commoda eius recenseantur, cautionesque quaedam, inoculationem spectantes, addantur. Summa obiectionum eo redit: inoculatio fundamentis rationalis medicinae, imo plane diuinis legibus aduersatur; ex inoculatione aequae prauae effectus, ac ex inuasionem naturalium sunt extimescendi; inoculatio variolarum haud praepedit verarum recursum; alii ac maiores morbi, post fomitem variolosum, per inoculationem insufficienter euolutum, oriri possunt. Atque summa commodorum haec est: morbus cutaneus in iuniore aetate optime suscitatur, cui accedit minor faciei deturpatio ab artificialibus, quam a naturalibus; haec materiae deriuatio ad cutim et febris, per inoculationem excitata, commodissimo ac opportunissimo tempore suscipi, indeque symptomatibus grauioribus occurrere potest; per
inocu-

inoculationem contagium melius, facilius ac prius per cutem transfertur, quam fortuitum per respirationem et salivae vias.

4) *De dextra cordis auricula rupta, mortis subitae caussa; observatio icone illustrata* *). Iuuenis robusti ac vegeti, vnde viginti annorum, pectus a calce equi ita percutiebatur, ut humi prosterneretur. Surrexit tamen et in stabulum indignabundus properabat, ubi mortuus concidit. Denudato corpore, nihil animaduvertebatur. Abdomen quidem tumidum erat, nullo modo autem laesum. Thorace autem disquisito sternum erat fractum: quo remoto per exigua sugillatio in mediastino conspiciebatur, nec ullum in pectoris cavitate sanguinis effusi vestigium. Pericardium sero pellucido et sanguine coagulato scatebat. Cor ipsum cum auriculis multo cruore circumdabatur. Auricula vero rupta interne tres habebat fissuras. Quae omnia in icone addita illustrantur. Tum quaedam corollaria et nonnulla alia exempla ex TISSOTO, actis Suecicis, et MORGAGNIO deprompta, adduntur.

5) *De ratione venae sectionis in haemoptoicis.* An-p. 145
tequam de sanguinis missione in tabe pulmonum laborantibus dicatur, ad causas respicit Cl. Auctor, cur in pulmonibus eorum copiosius colligatur sanguis, iisque sanguinis euacuationem accommodat. In omni nimirum corporis vehementi atque immoderata exercitatione, ut saltatione, saepenumero sanguis ad cor dextrum seu anterius ita copiose ac celeriter pellitur, ut a pulmonibus nec suscipi, nec subigi queat. Oriri exinde oportet haemoptysin, et tum suadet Cl. Auctor venae sectionem. Porro in
niniis

*) Vfus est hac icone DIETERICUS MUMMSEN in dissertatione inaugurali de corde rupto. Lips. 1764. 4.

nimiis animi commotionibus, vti ex moerore et
 continuis suspiriis ob amissos consanguineos, inopi-
 nato impeditum, sanguinis circulum reddidit venae-
 sectione liberiores. Nec non in spasmodicis grauiori-
 bus, nec ab inanitione vasorum profectis, e. c. in-
 fantum, a vermibus, dentitione, tussi conuulsiva, cum
 fructu venam secavit. Habituali vero haemoptoe
 orta, vel ex labe pulmonum scirrhusa et vlcerosa,
 vel ex obstructionibus et spasmodicis viscerum infimi
 ventris et lentore sanguinis venae portae, curet me-
 dicus, ne nimia sanguinis missione noceat. Nec
 minus caute versandum est cum iis, qui ex varia ca-
 cochymia, seu tenuitate sanguinis, seu vniuersali
 corporis imbecillitate haemoptysin patiuntur. Quam-
 quam vero rarior in his sanguinis missio conceditur,
 tamen eam non plane intermittendam esse, saltem
 interdum, probatur exemplo quodam viri cuiusdam
 viginti sex annorum, qui, ex labe pulmonum sum-
 mopere debilitatus, ad phthisin pulmonalem inclina-
 bat. Qui cum diligenti medicorum cura, diaeta
 accuratissima, imbecillis licet, per tempus conserua-
 tus esset, post moderatam corporis exercitationem
 in aëre sereno et matutino, tantam sanguinis co-
 piam reddebat, vt simul repentina subiret mortem.

P. 165. 6) *De ratione venae sectionis in vomitu cruento la-
 borantibus.* Ob argumenti similitudinem coniunxit
 Cl. LUDWIG hanc cum antecedenti tractationem.
 Causis, vomitum cruentum efficientibus, enarratis,
 venae sectionem non adeo necessariam esse in hoc
 morbo, demonstratur. Nota enim sunt plura Cl.
 Auctori exempla feminarum, quae praeterea huic
 morbo magis obnoxiae sunt prae viris ob inordina-
 tum catameniorum fluxum, in quibus sanguinis ef-
 fusio per vomitum ad tertiam vsque libram et ultra
 accessit, illisque sanitas restituta est sine vlllo medici
 consilio.

consilio. Quamobrem et suadet Cl. Auctor catameniorum fluxum attendere, de eoque rite ordinando cogitare. Qua occasione mentionem facit ancillae cuiusdam, quae, venaesectione ob catameniorum defectum et tensiones abdominales imprimis sub diaphragmate, instituta, paulo post tam enormi ac repentino vomitu cruento laborabat, ut synoptica caderet, et mortua videretur. Hanc ita excitavit, ut aliqua respirationis et pulsus indicia apparerent. Tum medicamentis analepticis aliisque adiuta, post aliquot hebdomadas sanitati restituebatur, quam quoque per viginti et, quot excurrit, annos adhuc conservavit.

Non tantum autem sanguis copiosus et grumop. 173.
fus per vomitum cruentum eiicitur, sed etiam massae membranosae cellulares, polyposis concretionibus non absimiles, simul euomuntur. Quam rem quoque non adeo esse extimescendam, a Cl. Auctore exemplo probatur.

7) *De stasi sanguinis in venis, inflammationem* p. 178.
mentiente. Ex dissectione quorundam cadauerum intellexit Cl. Auctor, venas magis, quam arterias sanguine infarctas esse; ex qua re ad putridi magis, quam inflammatorii morbi indolem concludere licet. Arteriae enim inflammationis verae characteres nullo modo prae se tulerunt. Quam ob rem quaeritur quoque a Cl. Auctore: utrum haec stasis inflammatio, an, quoniam id in venis tantum fit, inflammationi similis dici queat? Recte quoque Nostro monere visus est amicus, cui hanc tractationem perlegendam dedit, stasin sanguinis in venis varicosis tum potissimum mentiri posse inflammationem, cum ea in venis, valvulis destitutis, ideoque non nodosis, sed aequaliter distentis observatur, in systemate scilicet venae portae, cerebro, pulmonibus aliisque

nolentior; in paucis erat somnus turbulentus; porro oculorum hebetudo, caligo, scintillatio, rerum obiectarum vacillatio, visus duplex, presbyopia; alius conquerebatur de solis, absentis licet splendore. Quemadmodum hae oculorum aegritudines, vnius grani pilula vix deglutita, ab aegris animaduvertebantur, sic quoque iterum, intermisso stramonii usu, ita mox cessabant, ne vllus incommodum quoddam visus retineret.

P. 337. Porro hi effectus sunt animaduersi: lippitudo, copiosa oculorum illachrymatio et conuulsiones, vertigo, ebrietatis sensus, insignis cephalalgia, dolor pulsorius ad os dextrum temporis, eiusque ventis ex ambabus auribus crebrius erumpentibus, mitigatio, lipothymicae accessiones, phantasia laesa, mentis perturbatio plenaria, sitis ingens, clamosa, oris fauciumque siccitas, largum salivae profluuium, raucedo et linguae intumescencia, appetitus bonus nimisque auctus, ructus acidi in vno, nausea, vomituritio in aliquibus, in pluribus vomitus aquoso pituitosi, biliosi, pituita, acidum spirans, ventris tormina, interdum satis atrocia, borborygmi, ventris inflationes, epigastrium durum dolens, tensum, aluus vtplurimum aperta, rarissime obstructa, in plurimis laxa, in nonnullis diarrhoea; sudoris ac urinae excretio erat largior, menstruorum fluxus non solum augebatur, sed per quadriennium absentia restituit hoc extractum; plethoraeque inter eius usum corporis alacritas.

P. 343. His stramonii effectibus praeterea adnumerat Cl. Auctor singultum sat vehementem, dolores rheumaticos, frigus plus minus vehementens, febrem plus minus validam et pruritum totius corporis. Ita quoque tussis sicca, post largum sudorem euanescebat, sanguis per tussim euomitur, praecordiorum anxietas, purpura chronica, furunculi et dolores cordis punctorii, effectus secundarii esse videntur.

Ex his omnibus effectibus concludit Noster, p. 344. stramonio, parua dosi propinato, sopiendi vim et insignem inesse acrimoniam, quae humores potenter resoluat et ad varia colatoria maiore copia pel-
lat, solidasque corporis humani partes debilitet et spasmis obnoxias reddat. Quam ob rem quoque euacuantia, inter eius usum adhibita, plus obfuisse, quam profuisse videbantur. Nullus, vti ex obser-
vationibus patet, pristinam sanitatem prorsus recu-
perauit, nisi adolescentem epilepticum ab epilepsia, spasmo remanente, liberatum excipias. Plurimi vero morbi mitigationem ac imminutionem fense-
runt. In aliis morbus peior reddebatur, et tres, in quorum cadaueribus multa praeternaturalia erant, moriebantur. Arbitratur itaque Cl. Auctor, stramonii extractum epilepsiam interdum tollere, mini-
me autem solum, sine demulcentibus, roborantibus et antispasmodicis tuto exhiberi posse aegris. Mi-
tigari enim huius usu videtur morbus, sed res ae-
gri in perniciem vertuntur.

5) *De hernia inguinali cum crurali complicata* p. 348.
observatio, animaduersionibus illustrata. Hernia emi-
nentiam oblongam nec insigniter eleuatam ostende-
bat, et cruralis quidem, tamen et ea, cum versus os
pubis extenderetur, inguinalis quoque esse videba-
tur. Repositione per aliquot dies frustra tentata, et
variis medicamentis sine fructu propinatis, hernio-
tomia necessaria iudicabatur, quae quoque instituta
est. Incisis itaque integumentis, saccus exiguus her-
niosus adeo strictus conspiciebatur, vt difficulter
incideretur, in quo omentum ita callosum, ab an-
teriori parte exiguum intestini ilei flexum comple-
ctens, erat, vt sine ligatura posset praescindi. In-
testini itaque protrusi parte, nulla labe affecta, re-
posita, annulus dilatabatur quodammodo ad disqui-
rendum

nolentior; in paucis erat somnus turbulentus; porro oculorum hebetudo, caligo, scintillatio, rerum obiectarum vacillatio, visus duplex, presbyopia; alius conquerebatur de solis, absentis licet, splendore. Quemadmodum hae oculorum aegritudines, vnius grani pilula vix deglutita, ab aegris animaduvertebantur, sic quoque iterum, intermisso stramonii usu, ita mox cessabant, ne vllus incommodum quoddam visus retineret.

P. 337. Porro hi effectus sunt animaduersi: lippitudo, copiosa oculorum illachrymatio et conuulsiones, vertigo, ebrietatis sensus, insignis cephalalgia, dolor pulsorius ad os dextrum temporis, eiusque, ventis ex ambabus auribus crebrius erumpentibus, mitigatio, lipothymicae accessiones, phantasia laesa, mentis perturbatio plenaria, sitis ingens, clamosa, oris fauciumque siccitas, largum salivae profluuium, raucedo et linguae intumescencia, appetitus bonus nimisque auctus, ructus acidi in vno, nausea, vomituritio in aliquibus, in pluribus vomitus aquoso pituitosi, biliosi, pituita, acidum spirans, ventris tormina, interdum satis atrocia, borborygmi, ventris inflationes, epigastrium durum dolens, tensum, aluus ut plurimum aperta, rarissime obstructa, in plurimis laxa, in nonnullis diarrhoea; sudoris ac urinae excretio erat largior, menstruorum fluxus non solum augebatur, sed per quadriennium absentia restituit hoc extractum; plethorumque inter eius usum corporis alacritas.

P. 343. His stramonii effectibus praeterea adnumerat Cl. Auctor singultum sat vehementem, dolores rheumaticos, frigus plus minus vehementens, febrim plus minus validam et pruritum totius corporis. Ita quoque tussis sicca, post largum sudorem euanescebat, sanguis per tussim euomitur, praecordiorum anxietas, purpura chronica, furunculi et dolores cordis punctorii, effectus secundarii esse videntur.

Ex

Ex his omnibus effectibus concludit Noster, p. 344. stramonio, parua dosi propinato, sopiendi vim et insignem inesse acrimoniam, quae humores potenter resoluat et ad varia colatoria maiore copia pel-
lat, solidasque corporis humani partes debilitet et spasmis obnoxias reddat. Quam ob rem quoque euacuantia, inter eius vsum adhibita, plus obfuisse, quam profuisse videbantur. Nullus, vti ex obser-
vationibus patet, pristinam sanitatem prorsus recuperauit, nisi adolescentem epilepticum ab epilepsia, spasmis remanente, liberatum excipias. Plurimi vero morbi mitigationem ac imminutionem senserunt. In aliis morbus peior reddebatur, et tres, in quorum cadaueribus multa praeternaturalia erant, moriebantur. Arbitratur itaque Cl. Auctor, stramonii extractum epilepsiam interdum tollere, minime autem solum, sine demulcentibus, roborantibus et antispasmodicis tuto exhiberi posse aegris. Mitigari enim huius vfu videtur morbus, sed res aegri in perniciem vertuntur.

5) *De hernia inguinali cum crurali complicata* p. 348.
observatio, animaduersionibus illustrata. Hernia eminentiam oblongam nec insigniter eleuatam ostendebat, et cruralis quidem, tamen et ea, cum versus os pubis extenderetur, inguinalis quoque esse videbatur. Repositione per aliquot dies frustra tentata, et variis medicamentis sine fructu propinatis, herniotomia necessaria iudicabatur, quae quoque instituta est. Incisis itaque integumentis, saccus exiguus herniosus adeo strictus conspiciebatur, vt difficulter incideretur, in quo omentum ita callosum, ab anteriori parte exiguum intestini ilei flexum completens, erat, vt sine ligatura posset praescindi. Intestini itaque protrusi parte, nulla labe affecta, reposita, annulus dilatabatur quodammodo ad disqui-
rendum

rendum interiorem ambitum, nec quidquam cum perciperetur, vulnus obtegebatur. Remediis variis tum adhibitis, nulla tamen subsequēbatur excretio aluina, sed aegra, tensione imi ventris magis magisque aucta, ac subinde debilitate ita consumebatur, ut moriretur.

p. 352. Abdomine aperto, omentum omnino expansum et vasa eius ob summam tensionem duriora, callosa et quasi exsucca, ligamentorum ad instar, deprehendebantur. Inter eam intestini ilei partem, quae, viua adhuc aegra, inter operationem reposita fuerat, alia pars detegēbatur iamiam sphacelosa, quae iuxta vasa cruralia sub ligamentum *POUPARTII* abscondita erat, et haec erat altera cruralis hernia in viua aegra, a priori non satis distincta. Ceterum erat ileum huc illuc angustum.

p. 354. His observationes, hernias omnino spectantes, a Cl. Auctore adduntur. Ac primum quidem varias omenti tensiones considerat, quibus et saepe nausea et vomitus herniosorum et grauidarum adscribi debent. Nec arbitratur, vomitum a quolibet ventris tumore effici posse, sed ventriculo, vel vicino duodeno eorumque irritationi tribuendum esse. In eiusmodi vero validis atque vniuersalibus tensionibus omenti non magnum exspectat ab herniotomia adiuumentum. In feminis porro herniae non solum exiguae sunt, sed reperiuntur crurales in feminis crebrius inguinalibus, quam in viris. Causae huius rei praecipuae Nostro videntur, praeter latitudinem marginis anterioris pelvis, progressus chordarum vascularium, quae ligamenta rotunda vteri dicuntur. Circa quem nimirum pinguedo arctius concreuit, quam circa vasa spermatica in viris. Contextus itaque cellulosus circa vasa cruralia magis cedit.

6) *De processibus intestinorum tractatio, iconibus p. 363.*
illustrata. Sunt hi intestinorum extensiones, et quoniam eorum fabrica in vniuersum est membranosa, in omnibus quidem tales processus oriri posse opinatur Noster. Verum, an in crassis hoc fiat, dubitat, cum processus eos in tenuibus et quidem in ileo potissimum obseruauerit, quod ob valuularum absentiam et motum tardiozem, nisi formationi, tamen extensioni inseruit. Figura erat eorum conoidea, et crassities, si cum intestino vicino comparatur, vna eademque, nec non firmitas; interdum maior, interdum minor amplitudo atque angustia, quam in intestino deprehenditur, longitudo eorum duorum pollicum erat et vltra, orificium eius cum diametro intestini conuenit interdum; ea vasa sanguifera, quae a parte mesenterii ex propaginibus vasorum mesaraicorum oriuntur, et intestina cingunt variis anastomosibus, in processu ipso non circularia sunt, sed longitudinalia. Hi laterales processus oriuntur, vel a parte mesenterio vicina, vel ab altera eidem apposita. Id quod in figuris additis illustratur. Quamquam autem Noster delineationem horum processuum in fetu declarauit, atque figura quoque adiecta illustrauit, nec non rariora forte exempla successiuae extensionis largitus est, tamen et in suis extensionem quamdam accedere non dubitat.

7) *Meletemata de putredine animali et morbis p. 381.*
putridis continuata. Finiuit Cl. LUDWIG iam primam partem *) obseruationibus de putredine animali. Atque hic potissimum demonstratur, debilitatem solidorum mox causam, mox effectum putredinis viuuae esse.

Li 3

In

*) vid. supra. p. 496.

P. III. In parte tertia haec leguntur:

- p. 387. 1) *Dissertatio de euolutionibus corporis animalis sani et aegri in vniuersum.* Id, quod inuolutum est in triplici naturae regno, se euoluit. Hoc apparet ex salium genesi, arborum gemmis et fetus animalis mutationibus. Refert itaque Noster omnes mutationes, in vita animali euenientes, ad euolutiones, et quoniam vita animalis vel in sanitate, vel in aegritudine cernitur, dispescit eas in sanas ac morbosas euolutiones, vt vires vitae et morbi rite discerni et inter se conferri queant. Antequam autem hoc accuratius explanet, circumscribit limitibus vocem euolutionis, quae est successiua in corpore humano partium fluidarum et solidarum mutatio, in incremento, conseruatione et destructione eius animaduersa et cum motus reciproci in minimis non satis pateant, actio ipsa tantum ex effectibus cognoscitur.
- p. 396. Euolutiones in sano corpore attendendae hae sunt vniuersales: 1) Euolutio nutrimenti in digestionem, quod in chyli et sanguinis elaboratione de nouo inuoluitur. 2) Euolutio sanguinis in secretionibus et aliis humorum elaborationibus, in lymphae ceu humoris nutrientis elaboratione rursus inuoluta. 3) Euolutio lymphae vario modo ad solidas partes adaptandae, quae in ipsa applicatione et coniunctione cum fibris in eorum naturam quasi inuoluitur. 4) Euolutio fluidi neruei, obscura quidem, attamen in vniuerso corporis vigore per sensum ac motum declarata, vt in ea summa vitae animalis praestantia cernatur. Particulares sunt biliosa, spermatica genesis et confirmatio ossium cet. Euolutiones morbosae in variis excretionibus cernuntur solitis, aequae ac insolitis. Dum nimirum per vires solidarum partium elasticas ac vitales fluidae particulae in corpore mouentur, euoluuntur, et vario modo

modo disponuntur, acres et viscidae vel alio modo morbosae ac noxiae simul circumducuntur, subiguntur, resoluuntur et expelluntur. Quam ob causam evolutionis ideam Cl. Auctor quoque ad fluidas partes transtulit, cum solidarum partium euolutio non nisi ex motu fluidorum, per quem nutritio et conservatio partium incrementumque eorum dirigitur, intelligi queat. Quemadmodum hoc ex fabrica omnium partium solidarum et earum continuata nutritione, sic ex vulnerum cicatrice, carnis fungosae genesi et induratione callosa membranarum subinde extensarum, ossium incremento, nec minus ex morbois ossium exostosis, ex fractorum ossium coalitu et callo formato elucet.

2) *Commentatio de morbo et morte amatae con. p. 407.*
iugis mense decembri 1767 conscripta. Praemissis iis, quae constitutionem, morbos superatos ac vitam omnino debilem aegrae spectabant, ad morbum ultimum, quo erepta est Cl. LUDWIG carissima coniux, considerandum se accingit. Iam diu ante tempus obstructione aluina cum perpetuis anxietatibus valde laboravit aegra; ea vero per quatuordecim dies continuata, sub crudelissimis doloribus, summa anxietate coniunctis, et stupendo abdominis ambitu, multis in et externis remediis frustra adhibitis, placide ea est mortua.

Corpore denudato, ambitus feminae macilentae p. 440.
et tenerae erat vlnae vnus cum semisse et quinque pollicum, filo circum circa ad regionem umbilicalem ducto. Integumentis, ita expansis, difficulter incisis, intestina tenuia flatibus non adeo distenta inueniebantur, coecum amplum quodammodo quidem eminebat, non autem adeo inflatum erat. Colon, vbi a coeco sursum procedit, parum distentum, subinde vero ad mediam partem transuersim,

seu zonam coli, ita expansum erat, vt medius ambitus vlnae semis et quatuordecim digitorum esset, et transuersa zona a dextro latere vsque ad lienem, vbi se abscondebat, vlnam vnā cum quadrante et tres digitos aequaret. Omentum in tanta distensione ferme prorsus euanuerat. Colon postea, sub liene paruum quidem, nulla autem labe corruptum, disquisitum, ad peritoneum ac diaphragma adhaerebat. Inciso mesocolo, faccum, qui ventriculus esse videbatur, veram et connexam coli partem, supra modum extensam, esse, intelligebatur. Quo sacco euacuato, qui morbi, mortis et erroris causa erat, eoque paululum reclinato, sub eo verus ventriculus, paulo minor quidem, sed aëre nulloque alimento repletus, nec callosus, nec inflammatus, versus hepar vero dextrorsum et retrorsum valide ita depressus, ne edere ructus vomitusue, nec quidquam ferme vltimis diebus per cardiam in eum descendere potuisset, detegebatur. In ileo nonnullae conuolutiones sunt animaduersae, cuius pars aliqua, ante obitum incarcerata, sphacelosa erat et herniam cruralem, viua adhuc aegra, sistebat. Hepar prorsus sanum erat, fellea vesica multis calculis diuersae magnitudinis impleta quidem, bile autem non destituta erat. Obex itaque, quem ibi Noster quaesivit, et aegra quoque sensit, deprehendebatur in illo sacco, qui erat pars coli, sub liene progrediens et ad angustum locum sub liene ad diaphragma accreta. Faeces in eo contentae adeo tenaces erant, ne per duodecim dies in aqua maceratae, solutae sint. In media porro eius parte massa inueniebatur, bruno primum, dein nigro colore tincta, a mercurio viuo agitata ac subacta. A septem autem vnciis mercurii, quem aegra subinde deglutiuit, ne drachma quidem colligi potuit.

3) *Oratio de dissensu medicorum in commodum ar. p. 452.*
tis salutaris conuertendo, mense maio 1759. in sôlemni
doctoris inauguratione recitata. Inquirat hic Cl. LUD-
WIG in comoda et incommoda, quae redundant in
medicinam ex dissensu medicorum, et normam dat,
ad quam dissensus et controuersarum opinionum
examen componi debeat, vt ille ad optimum finem,
hoc est, ad veri inuentionem, ducatur. Ad hoc ef-
ficiendum causas dissensus paulo accuratius perse-
quitur.

4) *Dissertatio de topicorum medicamentorum vsu p. 473.*
in variolis. Cum multi sint, qui arbitrentur, va-
riolarum decursum in variis stadiis non solum inter-
nis, sed externis quoque remediis adiuuandum esse,
haec ipsa autem sententia finibus circumscribenda
videatur Nostro, operae pretium iudicat, quosdam
hic statuere. Balnea calida et frigida, pediluua et
fomentationes non reiicit Cl. Auctor tum, cum in-
fectio variolarum vel naturalis vel artificialis instet,
variolis autem aduenientibus, ea non concedit, ac
eis vim deriuandae materiae variolosae denegat. Ae-
ris vicissitudinum ac omnino regiminis calidi ac fri-
gidi magna cautio est adhibenda. Vis enim aeris
frigidioris vasa cutanea non roborat, sed stringit et
sudorem variolosum reprimat. Nec probat, ob in-
flammationes chronicas remanentes, remedia, oculis
externae applicanda praeseruatiônis causa; pari mo-
do faucibus, quoniam anginae variolosae saepenu-
mero occasionem dant. Cui quidem, si adest, aptis tum
illi succurrendum est remediis. Cum variola porro
sit pars inflammata cutis, in abscessum mutanda, de
muratione, externis remediis adiuuanda, atque in-
cisione praestanda, quaeritur. Verum non opus esse
videtur Nostro, cum plerumque maturatio supprimen-
da potius, quam excitanda sit. Nec nimium timet

resorptionem, partim ob puris densitatem et spissitudinem et ob locum, partim cum incisio pustularum eam nec praecaveat, nec in confluentibus fieri queat. Neque necessariam incisionem arbitratur, pure bono praesente, ob cicatricum aequalitatem. Quod si vero ichorosum est, eam vrget et exemplis confirmat. Quorum occasione fetum, a matre, variolis correpta, editum, vestigia variolarum, forma depressarum passim in corpusculo ostendisse, monet. Vtilitatem puris enim ex vulnerum consideratione in genere diiudicat, illudque cum pure varioloso confert. Cum tandem raro in iis, quibus topica medicamenta non applicantur, vitia oculorum supermaneant, in aliis vero, variis medicamentis tentatis, variae inprimis ophthalmiae oriantur, nonnulla de cura oculorum in stadio desquamationis addit. Ex his apparet, topicorum usum in variolis saepenumero noxium esse, ideoque caute in iis applicandis versandum esse.

p. 504. 5) *De vi cardiaca opii disquisitio.* Cum Cl. LUDWIG se notatum intellexisset ab Ill. TRAILLES *), quod post opii usum cardiaca fuaserat **), quoniam, secundum Cl. TRAILLES opinionem, ipsum opium non cardiaca vi destitutum est, constituit Noster, ea, quae hac in re expertus est, breuiter tradere ac dubitationes, hac de vi opii enatas, addere. Comparat primum quidem opium cum vino, utrique calorem concedit. Quemadmodum vero inebriatio, a vino excitata, systema neruorum debilitat, sic et ex usu opii idem euenire solet. Hoc vidit Noster in Africa. Tum cardiaca vis definitione ita, uti ipse TRAILLES eam concinnauit, in eo posita, ut indicationi vitali satisfaciat, somni, vini et opii vires, quatenus

*) in tractatu de opio Sect. III. p. 265.

**) vid. in diss. de diarrhoea in febribus acutis. Lips.

1754. 4. §. 14.

us cardiacae et vires vitae instaurantes dici possunt, inter se ita comparantur, ut pateat, vim cardiacam, quae in successiva operatione opii observatur, non prorsus quidem esse denegandam, eam tamen non absolutam, sed maxime limitandam esse.

His expositis, pauca Noster de usu opii addit. P. 514. Quod ab initio quamquam magnopere timebat obstetres, quos viderat inter Turcas, effectus, tamen in posterum illud cum fructu adhibuit, ideoque cautum illius usum suadet. Ac primum quidem semper, opio a Nostro adhibito, curavit, ut primae viae liberae essent, dein in viam sanguinis bene inquisivit. Plethora vera enim vel sanguinea, vel ipsa obesa praesente, opio non utitur, quoniam facit plethoram febrilem. Aequè noxium illud iudicat in plethora spuria. Quod si vero, his bene disquisitis, ab alia irritante causa spasmi in systemate nervoso oriuntur, opium exhibitum excitat sanguinis circulum, febrim moderate auget, et spasmo sedato, liberiores reddit humorum circulationem. In spasmo autem, ab inanitione vasorum profecto, sedulo ad gradum inanitionis ei, qui opio tum utitur, respiciendum est. Quae enim si moderata est, aliqua, licet non constans, virium excitatio potest expectari; sin vero nimia solidorum debilitas cum magna fluidorum iactura, ut in haemorrhagiis nimis, adest, nulla potest effici.

6) *Commentatio de suctione vulnerum pectoris* P. 517. *cum delineatione tubuli ad hos usus apti.* Si venenatum contagium in corpus vario modo ingeritur, pessima inde, nisi cito deriuatur, oboriuntur symptomata, quid, quod mors inducitur. Atque hic maxime vulneris suctione requiritur, quae inter veteres a Psyllis et Marsis fiebat, nostris vero temporibus ob metum contagii suscipiendi ligaturis, parti inie-

iniec̃tis, profundaue scarificatione et cucurbitulis, multa cum flamma applicatis, nec non larga ac diuturna suppuratione, suctionis loco vtuntur. Cum vero haec saepenumero non sufficiant, et sanguis vel alius humor cito e cavitatibus sit educendus, suctio vulneris requiritur. Quapropter hic potissimum de suctione vulnerum pectoris agitur. Operatio quidem empyematis et situs aegri cum aptis tubulis, cum vulnere coniunctis, ad materiam deriuandam sufficere videntur, sed suctio interdum necessario addi debet. Et quamquam SCULTE TUS et ANELLIUS instrumenta ad pectoris cavitatem, a liquoribus variis peregrinis liberandam, inuenerunt, tamen, ob ampliorem horum apparatusum atque ob periculum contagii suscipiendi, quod iis, qui fugunt, imminet, nouum instrumentum, quo suctionis labor et metus suscipiendi putridos halitus a chirurgo prorsus declinari, et suctio continuata fieri possit, a b. BREUERO, chirurgia claro et Nostro excogitatum est. Constat hoc ex tubulo, diaphragmate diuiso. Ille vero media in parte perforatus et ita adaptatus est, vt lagenula, ope cochleae, ei queat applicari, in qua id, quod per foramen post diaphragma fugitur, fluit. Instrumentum accurate est delineatum.

p. 530. 7) *De sulphuris venerei viribus et efficacia in curanda epilepsia habituali.* Auctore I. E. GREDING. Est illud nouum medicamentum, e cupri virginis tribus, et mercurii per destillationem purificati novem vnciis compositum, et a Cl. PASQUALATI *) cum praeparandi illius modo, quem Noster quoque hic inseruit, traditum. Dosis eius est granum vnum, duo, interdum plura. Experimenti gratia dedit Noster cani grana tria et per totum

*) vid. EIUSDEM diff. inaug. de epilepsia. Vin. dobon. 1766. 8.

tum diem nulla eius animaduertebatur mutatio. Altero die post quinque grana non solum crebriores vomitus, sed tantam etiam effecerunt virium prostrationem, vt nec pedibus insistere posset, nec quidquam appeteret. Tres dies post, eo iterum sanato, tria grana per aliquot dies manē exhibebantur, quae sanitatem eius nullo modo immutabant.

Quo facto, Cl. GREDING hoc remedium cum p. 534. mucilaginis gummi Arabici parua quantitate et syrupo de poeonia in pilulas vnus grani ponderis rededit, et septem epilepticis exhibuit. Ex quorum morbi historiis apparet, hoc cupri sulphur tam parua, quam auctiori dosi nec in curanda, nec in subleuanda epilepsia habituali quidquam valuisse, illudque tutius ac mitius egisse, quam HELVETII antepilepticum puerorum, et WEISMANNI crysalli venereae antepilepticae. In vno nimirum appetitum imminuit, duae insigniorem expertae sunt nauseam, quatuor vomitum, duo alui purgationem, totidemque obstructionem obseruarunt. Nec mēstruorum negotium hoc turbauit, etiamsi interdum paullo copiosiora fluxerint.

8) *De morbis epidemicis vernalibus obseruationes* p. 543. *singulares.* Quamquam ii morbi saepenumero breui et sine remediis in robustis finiuntur, tamen et illi ex constitutione hiemis frigidioris et siccioris vel tepidioris et humidioris diiudicandi sunt, et attentionem medicorum merentur. Hiemis itaque et veris vicissitudines diligenter vt considerentur, necesse est. His aliisque caussis commemoratis, curationes vernales, quae interdum et horum morborum caussae sunt, examinat, earumque commoda ac incommoda recenset, et obseruationes, pathologiam morborum vernalium illustrantes, atque per nonnullos annos Lipsiae a Nostro collectas, communicat cum Lectoribus.

ribus. Ac potissimum quidem februm continuarum, intermittentium, tumorum erysipelaceorum et oedematosorum mentionem fecit. Vbi singularem prorsus morbi transitum obseruauit in quibusdam adolescentibus. His enim tumoribus, vel medicamentis discussis, vel sponte euanescentibus, ad scrotum, et interdum ad inguina, similes tumores deprehendebantur, qui post paucos dies iterum euanescebant. Singularem hanc materiae viscidae catharrosae metastasin esse Noster putat.

Tum praecipua therapiae capita considerat, et doctrinae eius generali id, quod sparsim monuit, accommodat. Quapropter Cl. Auctor purgantia prophylactica, sanguinis missionem, qua occasione de moderamine febris, quod summe necessarium hic Nostro videtur, differit, resoluentia et roborantia et succos expressos, infusa et decocta radicum tonicarum et resoluentium, nec non essentias et tincturas acres tartari et antimonii persequitur, atque monstrat, non vniuersalem medendi methodum stabilendam, sed aegris eorumque constitutioni atque viribus esse accommodandam.

P. IV. In parte quarta huius voluminis sunt sequentia:

P. 579. 1) *Tractatio de morbosa lymphae ad colatoria organa conuersione.* Postquam lymphae originem, eiusque usum nec non illius abundantiam in semine virili ac lacte in mammis demonstrauit, ex phaenomenis, in variis morbis obuenientibus, a Nostro declaratur, cur interdum optima et lymphatica pars, quae in prospera corporis valetudine ad varia secretoria non defertur, post actiones vniuersales laesas tandem eo deriuetur, quae morbosa lymphae ad colatoria est conuersio. Ac primum quidem ad semen virile ac lac accedit, quoniam ex morbofis eorumdem

dem mutationibus eo euidentius intelligitur, in iis partem lymphae nutritiae esse. Id quod ex nimia feminis et liquoris prostaticae orificii et ceruicis vteri profusione, nec non ex abscessibus lacteis probatur. Porro ad cauitates faucium et pulmonum, tunicam pituitariam narium, ad tubum vniuersum alimentarem in dysenteria, lienteria, fluxu coeliaco et haemorrhoidibus mucosis respicit, ac tandem de saluatione, nimio vrinae profluuio, perspiratione aucta ac sudore, suppurationeque nimia agit, et in his omnibus morborum lymphae conuersionem fieri posse, monstrat.

His phaenomenis collectis, ad nomina, huic p. 600. morbo imposita, sese accingit Cl. Auctor, et, cum variis variis Auctores vtantur, his examinandis, paululum immoratus est. Nomina vero sunt potissimum haec: glutinosum spontaneum, pituita vitrea, diabetes, excretiones colliquatiuae. Atque hac in re definienda praecipue respicit Noster ad glutinosum spontaneum et glutinosum adscititium, quae maxime inter se differunt. Hoc enim per diaetae errores in corpus inducitur, et viscidae indolis est; illud autem humores optimos tenues lymphaticos continet. Praeterea autem lubenter largitur, viscidum adscititium ex eo, quod solida relaxat, generando glutinoso spontaneo posse dare ansam.

Tum ea, quae hic proposita sunt, ad causas p. 603. vniuersales a Nostro reducuntur, quorum aliae diaetam in vniuersum attinent, aliae ex therapeuticis indicationibus, male applicatis, proficiunt. Tandem ad methodum huic morbo medendi Noster venit, et, quamquam illa in vniuersum non potest stabiliri, tamen quaedam monita particularia subiicit. Atque haec cernuntur in aëris vicissitudinibus, balneis, in excretionibus contrariis excitandis, vt lenè est vomitorium in diarrhoea, sudor in vrinae profluuio,

fluio, ac tandem in roborantibus, quae post nutri-
trientia propinari oportet. Atque hic Noster prae-
fert roborantia diaetetica medicamentosis. Inter
medicamenta quidem fatetur Noster esse praecipua
martialia et corticem Peruianum, praeterea tamen
vitriolum martis, alumen, fantalum rubrum, rubia
tinctorum, nec non tormentillae et bistortae radix,
dummodo aegri viribus et constitutioni accommo-
dentur, quoque conueniunt.

p. 610. 2) *Commentatio de natura variolarum, earumdem-
que noxis, propter insitionem, metuendis.* Continet
haec tractatio obiectiones contra variolarum inplan-
tationem ab anonymo factas. Dubitat enim vario-
las morbum esse, et affirmat, corpus variolis depurari,
ideoque medicamenta in his magis inutilia, quam
utilia censet. Quapropter annititur probare vario-
larum insitionem nocere posteritati. Quemadmo-
dum enim omnis, sic et haec mutatio videtur ei esse
periculosa. Ad hoc ulterius demonstrandum musti
exemplum, quod, addito fermento, minus bonum
vinum praebet eo, quod tempori committitur, af-
fert, nec non fructus, quorum maturitas arte acce-
leratur, aqua abundare et ad putredinem procliuior-
es esse, asserit.

p. 637. 3) *De belladonnae viribus et efficacia in epilepsia
habituali tentamen.* Auctore Lic. I. E. GREDING.
Quam exhibuit in extracto et in puluere, ita, ut
a grano dimidio inciperet, dein dosin augeret, quae
maxima erat scrupulus dimidius inter viginti qua-
tuor horas, viginti tribus aegris, epilepsia habituali
laborantibus. Ex quorum morbi historiis, quas
hic collegit Cl. GREDING, apparet, belladonnam
ita propinatam, nec plura, nec grauiora symptoma-
ta excitasse, quam infusum eius aquosum, ab aliis
exhibitum.

Iam

Iam cum Nostro eius effectus recensemus. So-p. 695.
 mnus erat placidus ac reficiens, nullaue oborieba-
 tur somnolentia atque torpor, quin feminam, somno
 nimis indulgentem, alacriorem redditam vsu eius,
 obseruauit. Nullus corporis calor, nec debilis nec
 celer pulsus aderant. Vrinae profluuium erat, cre-
 brius largiusque, nec non sudor, alui notabilis quae-
 dam erat laxitas; bini vero alui constipatione labo-
 rarunt. Appetitus in plerisque vigeat. De oris
 amaritiae paucissimi, de nausea, vomitionibus ru-
 tibusque plures conquerebantur; nonnulli vomitus
 spontaneos et pituitosos experiebantur, ubi pitui-
 tam viridescens, ab adolescente bis euomitam vi-
 dit. Leuiores ventris tormina et ventriculi pressio,
 orisque siccitas cum siti quoque obseruaban-
 tur. Paucis caput doluit, plures vertigine leui
 breuique vexabantur, nonnulli obnubilationem ca-
 pitis, auditus grauitatem auriumque susurrum sen-
 terunt. Oculis autem per plures aegrotarunt. He-
 betudine oculorum cum dilatatione pupillae plures,
 et vnus vera coecitate per tres septimanas labora-
 uit. Omnes propemodum pallidos facie reddidit
 belladonna. Plures frigoris atque horroris sensum
 in singulis corporis partibus, et tres ruborem faci-
 ei, non autem ab initio, perceperunt. Nullum ab
 initio curationis anxium reddidit, postea vero non-
 nulli anxietates praecordiorum passi sunt. Men-
 trua inter huius remedii vsu parum mutata sunt.
 Varios dolores rheumaticos excitauit belladonna,
 nec non maculas et pustulas, in nonnullis inter
 eius vsu obseruatas, refert Noster inter eius effe-
 ctus.

Vix vero videtur belladonna in humoribus cor-
 poris humani quamdam inflammatoriam dispositio-
 nem excitare. In vulneribus enim nec solito maio-
 rem inflammationem, nec copiosiore suppuratione-
 nem, vsu eius continuato, animaduertit.

p. 705. Ex his omnibus omnino autem satis elucere arbitrat^{ur} Cl. GREDING, belladonnā magna sopiendi resoluendique vi et insigni acrimonia scatere. Hinc humores, continuato usu, resoluti, partim versus se et excretoria colatoria, partim versus superiora propelluntur, nervi capitis et alimentorum canalis potissimum afficiuntur, indeque spasmi et atoniae variarum partium temporariae, sat diu remanentes, inducuntur. Quod vero ad ipsam epilepsiam attinet, varias mutationes, belladonnae usu, Noster conspexit. Quamquam pertinent huc capitis in utramque partem conquassationes, singultus, oscitationes crebrae, interdum ad liorem faciei usque, tussis, accessionum epilepticarum tempore, convulsiva, sicca, interdum cum larga pituitae excretionē; maiorem tamen merentur attentionem ipsorum paroxysmorum epilepticorum mutationes. Quorum loco enim tremor artuum solummodo, spasmi superiorum ac inferiorum extremitatum, adeo interdum leues observabantur, sine omni omnino mentis perturbatione. Quapropter quoque constituit Noster, ut belladonnae usus in epilepsia habituali definiri posset, septendecim aegrorum, qui anno superiori extracto stramonii usi erant, diversa utriusque curationis tempora cum paroxysmorum epilepticorum numero, in tabulam coniicere. Ex qua quamquam patet, belladonnā ne ullum quidem ab epilepsia prorsus liberasse, tamen leuamen, quod in imminuenda epilepsia habituali non solum, sed etiam in mitiganda tollendaque mentis alienatione cernebatur, attulisse. Paruam itaque huius dosim his aegris tuto et cum leuamine exhiberi posse Noster concludit.

4) *Tractatio de doloribus ad spinam dorsi.* Hanc tractationem Cl. LUDWIG ideo praemisit aliae de gibberositate

positate, quod variae eiusdem causae ex hoc dolorum examine plenius intelliguntur. Quapropter, mechanismo spinæ dorsi in vniuersum spectato, illiusque ossea, ligamentosa et musculosa fabrica nervorumque nervi omnino praemisso, quaedam de colicis, febrilibus aliisque doloribus symptomaticis, ad lumbos potissimum ortis, exponuntur. Postea ad idiopathicos magis dolores siue spasticas totius spinæ tensiones progreditur Cl. LUDWIG, quae in sanis post nimis vehementes corporis nifus non raro accidunt, et vt plurimum luxationibus et subluxationibus adnumerantur; nec aliter vero, quam ex flatulentis, ligamentosis et musculosis tensionibus declarari et possunt et debent. His omnibus in causis, symptomatibus et signis consideratis, remedia contra hos dolores commemorantur et diiudicantur.

Disquisitis nominibus, quibus varii Auctores **P. 724.** nunc morbum insignire solent; ad symptomaticos, ac primum quidem ad colicos dolores progreditur Cl. Auctor, qui non solum spinam dorsi in consensum rapiunt, sed et thoracem saepenumero petunt. Haemorrhoides pariter non solum versus os sacrum, sed per totam spinam dorsi insignes creant dolores. Nec minus huc pertinent tensiones ac dolores ob menstruorum accessum et difficilem progressum, item grauidarum ac puerperarum. In puerperis iunioribus non solum in partu difficili, si ligamenta musculi et nervi circa os sacrum ad spinam dorsi lumbarem et coniunctas cum osse sacro coxas vehementer tendunt, (qua ex causa fortasse abscessus lacteos hic crebrius oriri putat) sed et in adultioribus, nisi quiete his partibus robur iterum conciliant, eiusmodi tensiones remanent. Idem evenit in calculosis. Crebrius enim in colica nephritica hae oriuntur tensiones simul cum aliis molestis sensationibus in inguinibus, testibus adque tra-

Etum nervi cruralis. Lumbaginem febrilem Cl. SAUVAGES, et omnino dolores, ad spinam ad caput usque ascendentes, in febribus explicat Noster ex saburra acri primarum viarum, eosque inter signa intermittentium refert. Purgatis enim primis viis, cessare hos dolores exemplo probat, etiamsi febris non prorsus sedata est.

p. 73¹. Haec de symptomaticis, iam de idiopathicis doloribus ad spinam videamus. Germani hos dolores his nominibus tribus insigniunt, (*verfangen, verbrechen, wehe thun*) ad quorum normam tres quoque Noster constituit dolorum, ad spinam dorsi ortorum, species. Ac primum quidem de tensionibus flatulentis, dein de tensionibus variis in ligamentosis partibus spinae dorsi, denique de tensionibus ex stasi ferrosorum, vel ex parte etiam sanguineorum humorum in fabrica musculosa agit. Hi interdum sunt continui, interdum remittunt. Raro quidem accidit, ut ligamenta ultra modum tendantur, vel ex parte dilacerentur, vasa comprimantur et lacerentur, humor effundatur et lentae corruptiones materiae effusae, nec non abscessus ad spinam dorsi et caries, atque osteosteatomata inducantur, de quibus fusius egit Cl. HERRMANNUS *). Pauca autem cum de levioribus et frequentioribus ad spinam dorsi anterioris exortis exostosis commemorauerit, eae hic a Nostro ad ductum iconis declarantur. Vbi vertebrae his tensionibus non solum diducuntur et cartilago ligamentosa ultra modum tenditur ac dilaceratur, sed etiam ligamentum anterius vertebrale commune extenditur, oboritur dolor ad spinam, qui in quiescentibus iterum sopitur, interea tamen exostosis
bus

*) v. Diff. inaug. de osteatmate, Lips. 1767. 4. c. fig. Comm. nostr. Vol. XV. p. 484. v. Memoires de l'Acad. roy. de Chirurgie Tom. IV. 1768. 4. c. f. p. 84. Comm. nostr. Vol. XVI. p. 5.

bus gignendis occasionem praebet. Ac eiusmodi exostoses veras ac densas, a crustis osseis, fungosis, vt in posterum in gibberositate senili Cl. Auctor ostendet, diuersas, quae non anchylosin efficient, sed motum aliquem, licet difficilem spinae admittunt, haec icon sistit.

Tandem stases serosas, vel leuiter inflammato-P. 743.
rias in musculis, a parte posteriori spinae collocatis persequitur Cl. LUDWIG, quae quoque a nimia tensione spinae proficiscuntur, et inspiratione cohibita impediuntur. Expiratione enim subita admissa, humorum in minimis vasis et in contextu cellulari praepeditur circulus, quod sequuntur leues inflammationes cum multis doloribus.

Refutato a Nostro Cl. POUTEAU*, qui hos P. 745.
dolores tribuit secessui musculorum stratorum ex suo situ (*deplacemens de muscles*), ad auxilia in his tensionibus applicanda progreditur, quae tribus speciebus horum dolorum ad spinam dorsi sunt accommodanda. Si nimirum hi dolores a ligamentosis et musculosis tensionibus oriuntur, pandiculationem crebriorem, vel lentam spinae dorsi extensionem suadet Cl. Auctor, ideoque non improbat eum extensionis modum, quem vulgo solent exercere, vtrumque describit et vni alterum praefert. Dein externe balnea, frictiones, vnguenta et epithemata laudat, et extensionem in lectulo, vario modo tentatam, commendat. His porro addendum esse medicamentorum antispasmodicorum vsum monet. Vbi praecipue commemorat fuliginem splendentem, castoreum et optimum radicis rubiae tinctorum puluerem, quem *Grapp* dicunt. Magno enim cum successu in his doloribus dedit sequentem puluerem, in duas partes diuisum: castorei et fuliginis ana scrupulum

Kk 3 dimi-

* Primae decadis suppl. I. Comm. nostr. p. 155.

dimidium, nitri depurati et concharum sine igne praeparatarum ana scrupulum vnum, nec non rubiam tinctorum in infuso et decocto cum fructu exhibuit in his tensionibus.

XVI.

Della idropisia de' Gelsi. THEOD. GAZA Interpr. In Milano, nella Stamperia de Giovanni Montani. 1767. 8. mai. pag. 145. sine dedicatione.

i. e.

De hydropie mororum, Auctore Cl. IACOBO CATTANEO.

Antiquissima fuit veritas, eademque semper manebit; Non intellecti nulla est curatio morbi. Cum ergo mori, adeo utilis in re oeconomica arboris, frequens interitus omnino exactam mereatur considerationem, mirum non est, in eius causis cognoscendis, atque remediis his adaptandis multum iam operae impensum fuisse. Opiniones istas atque in usum vocata remedia Cl. Auctor in praefatione enarrat, simul vero errores hac in re commissos arguit. In opere ipso mittimus considerationem physiologicam generalem plantarum, tractationem de historia mori, comparatamque eius crescendi rationem et culturam in patria ipsius China, cum ea, quam in Italia nanciscitur: ex qua tamen denique

p. 41. colligitur, vegetabile ex regione calida et sicca sensim delatum in frigidam et humidam, succis in lentorem procliuibus non satis motis et diuisis, neque perspiratione sufficiente vtens, denique et qualitate et quantitate humorum infirmari, adeoque suffocatum perire. Incrementum plus vel minus celere

p. 43. plantarum ab elaboratione succorum in iis et perspiratione

ratione iustis limitibus inclusa pendet: qua quidem in re praecipua causa sita videtur, cur mori in Italia maiorem acquirant molem, quam in China, cuius incolae amputatione, transpositione aliisque auxiliis opus habent, quo impediant, ne incrementum arborum harum nimis cito desinat. Vbi e contrario a coelo humido et loco umbroso transpiratioP. 53. minuitur, omnis vegetatio et nutritio arboris languescit; imo bombyx ipse ab esu foliorum laeditur,P. 55. quae externam aliquam humiditatem contraxerunt. Maius adhuc detrimentum capiunt mori, si partes oleosae et aquosae, quae succum iis proprium constituunt, non satis exacte misceri inter se possunt, idque partim ob caloris, partim ob particularum salinarum defectum: unde aut stagnationes in vasis, aut succi mere aquosi proueniunt, aut succus ipse,P. 57. licet lactescens, ut aliis vegetabilibus locis umbris accidit, venenatam ac rodentem indolem acquirit. Incautus etiam modus ramos praecidendi, cum omnem superficiem perspirabilem fere prorsus tollat, multum confert ad morbos huius arboris: quaeP. 60. tamen incommoda saepius praeuertuntur, noua vegetatione in radice excitata. Et quamquam haec ipsa, ramis nimium dispersis et auctis, saepe nimiam nutrimenti copiam fugit, sublatoque ideo aequilibrio inter partes superiores et inferiores noua causa infirmiae valetudinis enascitur, neque tamen et in hoc casu naturae desunt auxilia, quandoquidem vetustissimi et profundissimi radicis rami ab humore intus stagnante corrumpuntur et pereunt: imo morus in superioribus pariter atque inferioribus partibus iam infirma, praecisis vetustis ramis, priscum successiueP. 71. vigorem denuo acquirit. Morum vero morbo lento laborare, ideoque operatione per ferrum indigere, docent color flaescens, foliis cito superueniens, et imminuta in superioribus partibus vegetatio.

- tatio. Haec autem incisio, cum horizontalis sit, effluuium succi proprii efficit, qui lacteus et glutinosus facile inspissatur, et plagam vernicis ad instar obducens transfudationem humorum impedit: quod et si non fiat, actio tamen aeris et solis, discissa vaporum orificia comprimendo, idem praestat. Neque vero incisio, perpendiculari etiam directione facta, neque terebratio, licet plagae apertae maneant, conseruare arborem possunt, nisi simul auferri vitiata radix, et fibrae nouae in superficie terrae horizontaliter proserpentes eiusdem vices supplere queant. Errant etiam, qui nonnisi tenuiores ramos praecidunt: gemma potius iunioris ramuli succrescentis, quo maior ipsi in cortice duriori perforando resistentia superanda fuerit, eo maiorem ipsa firmitatem et vigorem consequitur. Saepius etiam nimia copia fibrarum ex radice productarum ad vnicum ramum tendit, qui nimis increscens totam arborem corrumpit, quae igitur res summam attentionem postulat. Insignem etiam causam corruptionis Cl. Auctor in eo inuenit, quod agricolae aratro saepius tangant teneras radices fibrillas, easque ideo destruant atque euellant.
- p. 72.
- p. 74.
- p. 77.

- Si ergo morus tantam copiam succorum sugendo suscipit, quantam neque ad vegetationem partiumque nutrimentum impendere, neque transpiratione dissipare potest, quaeritur, qua ratione haec abundantia detrimentum inducat? Succus in vasis longitudinalibus ascendentes, iisdem obstructis, versus latera premuntur, contextum cellularem occupant, ibique putrescunt. Sectio facta potissimum affici spatium inter corticem et librum docet; vnde quoque copiosus fungorum ex fisso cortice propullulantium prouentus enascitur. Ab exterioribus tamen his partibus versus interiora proserpit malum, et strata quaedam medullae infestans, ea a reliquis separat: in corruptis
- p. 85.

corruptis arboribus eadem lux phosphori similis ob-
 seruatur; quam aliae arbores fibrae debilioris et ad
 aquas crescentes, v. c. populus, offerunt. Mor- p. 87.
 bus ergo iste non sine iure cum hydrope comparari
 potest, partim ob causae remotae conuenientiam,
 suppressas nempe euacuationes, partim ob causam
 proximam, nimirum effusionem succorum in cau-
 cellularia, ab obstructis vasis profectam: et quam-
 quam symptomata nonnihil discrepare videntur, haec
 tamen differentia vere essentialis dici nequit. Ipsa
 tamen haec causa, proxima, alias morbi ipsiusque
 mortis arboris causa, saluberrima eidem esse potest,
 si ab interioribus via panditur ad euacuandos nimios
 humores. Quicquid ergo abundantiam humorum
 in arbore ipsiusque vigorem augere potest, facile
 morbum istum efficit: et quamquam lente pereun-
 tes arbores potius ex inopia succorum interire at- p. 92.
 que arescere videntur, eadem tamen omnino earum p. 93.
 ratio est. Similem morbum etiam, in vlmo obserua-
 tum, Cl. DUHAMEL descripsit. Inde lacrymatio
 spontanea, etsi videtur a laesione violenta profecta,
 saluberrima tamen est, et ipsi structurae arboris con-
 venientissima; cuius effectus nonnumquam supplen-
 tur amputatione aut plagis minoribus artificialibus,
 quibus omnes succi in contextu celluloso eiusque vtri-
 culis, quos MALPIGHIVS dixerat, stagnantes, ex- p. 96.
 trorsum ducuntur et eliminantur; ex lacrymatione
 autem, diutius subsistente, formatisque inde profun-
 dioribus sinubus et cauernis denique integra arbor
 interius excauatur, verum hac ipsa mutatione corri-
 gitur et renouatum quasi vigorem nanciscitur, vti
 et in aliis arboribus accidit. In excauatis eius-
 modi arboribus effluxus quidem humorum non adeo
 ingens esse videtur, quam vbi plaga minor fuerit:
 sed vere superficies interna maior insensibilem quasi
 egressum humoris efficit, alteri si non anteponen-

dum, certe aequiparandum. Et tales arbores omnium diutissime durare certissima res est. Prolixè postmodum Cl. Auctor incrementum arborum in genere describit, differentiam inter vegetationem, quae in foliis subsistit, et inter florum fructuumque protrusionem exponit, et quomodo alteruter finis aut obtineri queat aut vitari, docet, atque inde explicat locum THEOPHRASTI, *) quem fronti libri huius imposuit, eumque cum aliis ex eodem Auctore depromptis comparat. Spiritus quippe nihil est, nisi aqua in formam vaporis resoluta; qua priuatus succus resinosus pini, de qua Auctor iste loquitur, spissescit, vasa ipsa implet et obstruit, arboremque in taedam conuertit, qui effectus non potest praecaueri, nisi resinae exitus ope incisionum, in arbore, p. 110. factarum, concilietur. Atque haec omnia suo modo ad moros etiam applicari possunt, in quibus tamen commodum hoc non solum atque vnicum esse videtur, sed simul vero simile est, mutari hac ipsa ratione in iis succum venenatum, quem ab arboribus infectis proxime adstantibus sugunt, quandoquidem contagium nunquam communicari moro iam excavatae Cl. Auctor perspexit. Cum igitur ea folia optimae sint indolis, quae a moris, aetate iam proVectioribus, depromuntur, neque vero arbor vlla ad summam senectutem accedat, nisi excauata fuerit; cum puncturam insectorum, subtrahendo nimiam succorum abundantiam, fructus aliarum arborum maturare experientia doceat; cum lignum arborum excauatarum melius operibus manuariis inferuiat, meliusque flammam alat; vtpote densius, neque succis adeo scatens: omnino inde patescit, quantum vtilitatis cauitas interna harum arborum praestet. Neque vero putandum est, omnem in cauis eiusmodi truncis vegetationem suspensam esse, quippe quae
viuidior

*) Lib. V, cap. XV.

viuidior potius obseruatur, quam in plenis, adeo vtp. 124.
 excrescentias lignosas duriores reliquo trunco pro-
 ducat. Ex his omnibus necessitas atque vtilitas in-
 cisionis instituendae cognoscitur ad praecauendos p. 130.
 morbos arboris, quam THEOPHRASTUS, iisdem
 ductus rationibus, primo tantum in arboribus resino-
 sis suaferat, BACO VERULAMIUS vero vltius
 extenderat, et Cl. TONGE in transactionibus An-
 glicanis clarius exposuerat. Ruptura vero sponta-P. 135.
 nea optime efficitur a gelu, cuius effectus tres caus-
 as adducere solent: siue volumen succorum ab eo
 augeri, qui in glaciem versi vasa dirumpere, siue
 solem potentius resolvere ipsos succos antea gelatos,
 eosque fortius expandere; siue rupturam hanc a sola
 abundantia ascendentis in vasis succi proficisci. Neu-p. 137.
 tra tamen opinionum harum Nostro plane arridet,
 qui densari succos, atque exficari et obrigescere fi-
 bras a frigore vehementiori, hincque interstitia in-
 ter has formari asserit.

Non autem sola theoria ductus, ipse commendat
 incisionem, sed eiusdem commodi institutis experi-
 mentis edidit. Primo terebrationem tentauit, p. 139.
 quae vero fini proposito minus respondebat: scal-
 pello igitur semicirculari incisionem oualem fecit
 septemtrionem versus, vsque ad medullam pene-
 trantem, et quidem in parte trunci terrae proxima.
 Septemtrionalem partem ideo praeferebat australi,
 quod in hac lignum durius et strata arctius sibi im-
 posita liberiores humorum effluxum quodammodo
 impeditura fuissent; possunt tamen existere casus, in
 quibus orientalem vel occidentalem eligi oporteat.
 Aetas arborum, perationi subiiciendarum, tenerior
 eam non prohibet, et ipsa in variis arboribus duo-P. 144.
 decim circiter annorum felici cum successu peracta
 fuit: versus vigesimum autem annum, vbi morbus
 quam maxime timendus est, ipsa etiam summe ne-
 cessaria

cessaria iudicari debet. Haec vero experimenta omnia vltiori omnino studio oeconomorum magis excolenda et confirmanda sunt: obiectum enim, in quo versantur, summa attentione dignum quilibet aequus rerum aestimator censebit.

XVII.

Sopra lo scorbuto dissertazione del Signor Dottor GIOVANNI VERARDO ZEVIANI, coronata della Reale Academia delle Scienze e di Belle-lettere di Montova. In Verona 1770. Nella Stamperia Moroni 4. pagg. 43.

i. e.

Cl. ZEVIANI dissertatio de scorbuto, quae praemium reportauit ab academia regia scientiarum et elegantiorum litterarum, quae Mantuae floret.

Quaestio ab Academia proposita haec fuerat: quidnam sit praestantissimum ex remediis prophylacticis aduersus scorbutum, speciatim eum, qui in terra continente grassatur? quam declaraturus **Cl. Auctor** breuissime signa praecipua scorbuti declarat, et ad causas progreditur, quarum tres praecipue statuit, victum peruersum, deficiens exercitium corporis, et passiones animae: Inpressam autem perspirationem, cui tamen vix non omnes ex recentioribus primas partes in diro hoc morbo producendo tribuunt, prorsus inter causas negligit, et paucis tantum tamquam effectum cachexiae, a peruersis alimentis inductae, tangit, vbi reliquorum etiam praecipuorum symptomatum rationem reddit. Statuit etiam aliquam differentiam inter scorbutum acidum et alcalinum. Remedium autem, quod suadet,

suadet, est lac animalium in priori morbi specie humanum, in altera brutorum, vegetabilibus nutritorum: hoc enim partim curationi, partim praeferuationi inferuit, in qua posteriori indicationes ad quadruplicem finem tendunt, nempe ad impedimentum, ne particulae acres in corpus ingerantur; ad eas, quae iam in illud introductae, vel in eo generatae sunt, expellendas; ad easdem corrigendas et mutandas; et denique ad solida demulcenda et ab acrimonia illorum defendenda. Haec omnia lac praestat, praebendo alimentum dulce atque omni acrimonia destitutum, sustinendo et promouendo diuresin, potissimum si ab animalibus, gramine pastis, desumatur, acrimoniam obtundendo et mucilaginem tenuem supeditando. Exterior etiam eius vsus ad vlcera et reliqua scorbuti symptomata egregius est. Inde famosissimis remediis antiscorbuticis, quorum duas tantum classes constituit Noster, acrium et acidorum palmam praeripere putat, insignemque numerum scriptorum commemorat, qui eius vsum in scorbuto extulerunt, simul vero monet, illud tantum sub auspiciis prudentis medici in vsum ducendum esse, qui indolem praeparandi et exhibendi modum, dietam reliquam cet. morbo et constitutioni corporis accommodet.

XVIII.

CHRISTOPH GOTTLIEB BÜTTNERS, *der*
Arzneyg. D. und der Zergliederung menschlicher
Körper ordentl. Lehrers etc. in vielen Jahren ge-
sammlete anatomische Wahrnehmungen. Königsb.
und Leipz. bey Zeisens Wittwe und Hartungs-
Erben. 1769. 4. mai. mit Kupf. 1 Alph. 5 Bog.
mit einer Zueignungsschrift und Vorrede.

h. e.

CHPH. GOTTL. BÜTTNERI observationes
anatomicae per multos annos collectae, c. tab.
aeneis 4.

Et si, quam ex inscriptione conceperamus, spem,
fore ut aliqua saltem ad anatomes amplifican-
dam cognitionem pertinentia proponerentur, irri-
tam reddidit libri ipsius lectio, euoluisse tamen eun-
dem non piguit, lectis singularibus illis obseruatio-
nibus, quarum aliae morborum, monstrorum histo-
riam aliae egregie illustrant et perficiunt, in quibus
praeterea enarrandis Cl. Auctor neque scrutinium
causarum, neque similium exemplorum ab aliis nota-
torum commemorationem usquam praetermisit. In-
dicatis ergo vitae suae anatomicae non semper gra-
tissimis fatis, exhibitoque in praefatione indice par-
tium praeparatarum, quae in aede anatomica Cl. Au-
toris sumtibus exstructa asseruantur, prima obserua-
tione exponit de femina, passioni iliaca per trien-
nium toleratae tandem succumbente. Annos agens
quatuor et viginti, quarto grauiditatis mense ob ter-
rorem elidit partum magna cum sanguinis iactura.
Excipit abortum colica flatulenta, ructuosa. Acce-
dunt vomitus chylosi, stercorei, tandem et iniecta
clysmata per os redduntur. Tabe non febrili ex-
tinctae

tinctae sectio colon flatibus distentum et ultra ven-
 triculum in medium pectus eminens, valuulam eius
 prorsus deletam, intestina tenuia aequae atque rectum
 sphacelo corrupta, hoc porro cum vtero firmiter et
 cum coangustatione concretum, glandulas mesarai-
 cas obstructas, cetera viscera sana obtulit. Altera P. 8.
 obseruatio concernit sarcoma, ad sinistrum fundi
 vterini latus ope productionis, pollices duos longae,
 sesquipollicem latae, adhaerens, omento accretum,
 transuersim per abdomen expansum, dextrorsum
 crassius, pedis longitudine, extus laeue, intus vascu-
 lofo carnosum, medium versus durius et tuberculis
 ichore purulento foetis fartum, quindecim libras
 cum quarta parte ponderans, inuentum in femina,
 quae coelebs tam abdomine duro tumidoque, mari-
 tata intra triduum filiolum vegetum filiolumque
 mortuam iusto tempore enixa, secundinis lochiis-
 que retentis, quarto ab vltimo partu die, ex vteri
 sphacelo obiit. Viscera omnia sana fuerunt, praeter
 lienem atro sanguine turgentem, hepar pallidum, in-
 tus vero cum mollitie viride et cor polyposum.
 Tertia lapillos promit albos, rotundos, pisi, lentis P. 17.
 miliique granorum molis, duros cortice lamellato,
 nucleo albidiori molliorque praeditos, in arteriis
 vteri, vesicae et haemorrhoidalibus externis vetulae
 inuentos. Quarta narratur sectio viri, epiplocele P. 25.
 laborantis, qui casu ab alto costam septimam fini-
 stram, vertebrarum lumbarium apophyses obliquas
 et transuersas, tertiae corpus nec non ossa tarfi fere
 omnia, pleraque tamen iamtum cariosa, vario mo-
 do fregerat, ceterum vero per nouem adhuc hebdo-
 madas viuens, neque paralyfin, neque conuulsiones,
 neque exfoliationem ossium, sed leuem tantum pedis
 tumorem phlegmonoden passus, etiam pedibus insi-
 stere et incedere potuisse perhibetur. Erat insuper
 homo polyposus. Quinta puellam sistit, cum corde P. 36.
 absque

- absque pericardio extra pectus propendente natam, hora demum tricesima quarta a partu mortuam, omnibus, dum viueret, vitae actionibus recens natorum perficiendis parem. Adiectae sunt tabulae aeneae, integram puellam altera, altera cor et fabricam thoracis exhibentes. Sexta gemellas offert ita coa-
p. 58. litas, vt capita corporaque duo cum quatuor brachiis, sed tribus tantum pedibus, posteriore digitis octo praedito, conspiciantur. Communis est vmbilicus, interque pedes propendet faccus, sex pollicum ambitu, duplicem vuluam, superiorem rectam, inferiorem inuersam, continens. Haec et in tabula aenea cernuntur. Reliquam descriptionem, vt nimis amplam, neque tamen, quum sceleti examen
p. 92. desit, absolutam mittimus. Septima tradit conformationem puellae, quae, vna cum puero viuentem, mortua exclusa, perfecta quidem fuit, praeterquam quod caluaria et encephalo omni careret. Nerui optici ex massulis medullaribus, ceteri ex medulla oblongata prodire. Medulla spinalis et viscera
p. 109. cuncta recte sese habuerunt. Octaua confirmatur vivum nasci posse infantem, cranio et encephalo destitutum, exemplo puellae, quae ita vixit per quindecim horas, epilepsia tandem extincta. Haec etiam medulla oblongata caruit, neruisque olfactoriis. Ce-
p. 121. tera erant, vt in proxime descripta. Nona profertur fetus immaturus, thorace et abdomine patentibus, visceribusque extrorsum pendulis, in lucem editus. Excepta parte superiori caruit sterno, dein thymo, diaphragmate, cystide fellea, musculis abdominalibus, peritoneo. Pericardium cum hepate, ventriculo et rene sinistro concretum fuit. Viscera omnia
p. 132. nuda. Decima describitur hydrocephalus enormis, per annos duodetriginta toleratus a puella, cuius fa-nae natae caput, post epilepsiam octo dierum, sensim ita distendi coepit, vt tandem haberet circumferentiam
tiam

tiam triginta pollicum. Stupida mutaque etiamnum miseram vitam trahit in lectulo, tenui victu, dentium, scorbuto labefactorum, usus ignara. Anno aetatis vicesimo primo fluorem album, dein catamenia, crassum licet sanguinem euacuantia, rite tamen fluentia, experta est. Praeter caput nudum coalitum, partes reliquae corporis marcidae nil singularis habent. Vndecima proponitur tumor capitis P. 155. cysticus, sanguine congrumato refertus, cum carie insigni ossium frontis bregmatisque dextri, in iuvene, duorum et viginti annorum febre acuta extincto, repertus. Erat inaequaliter rotundus, quatuordecim pollicum circumferentiae, octo latitudinis, longitudinis nouem, ponderisque sesquilibrae, cum productione simili, introrsum per cariola ossa facta, quatuor digitos longa, totidem lata et sesquipollicem crassa, ponderis librae dimidia, internae ossis bregmatis dextri superficiei accreta. Sponte natus tumor anno quarto aetatis pisum aequauit, cessitque compressioni; mox tamen rediens, sensim creuit tactu mollis, donec, pleuritide a iuvene superata, planus durusque redditus, anno elapso, mollescere rursus, utque diximus, augeri inciperet. Duodecima agita- P. 169. tur quaestio, num puer quidam vndecimo anno verberatus ex vapulatione, an ex caussis, in tenera aetate iam praesentibus intortam receperit spinam? quorum hoc obtinuisse demonstrans Cl. Auctor varia de gibberositate adhuc disputat. Decima tertia ex- P. 188. ponit de monstro sine capite et visceribus, quin immo et brachiis, vna cum alio infante bene conformato excluso. Libras duas cum dimidia ponderans quindecimque pollices longum, loco capitis massam informem, integumentis pilisque tectam, habuit. Defuerunt digiti pedum plerique, ani orificium, scrotum cum testiculis, pene quamuis bifurcato praesente, porro viscera, neruique omnes. Diaphragmatis

vesicae vrinariae, intestinorumque, non tamen
 continuorum, quaedam simulacra fuerunt. Exter-
 nae formae vtramque faciem adiecta tabula mon-
 p. 202. strat. Decima quarta adumbratur lobus inferior
 pulmonis sinistri, in os conuersus, inuentus in viro
 septuagenario, cuius ossa emollita, pulmones vom-
 cis obsiti, viscera infimi ventris sphacelo confecta,
 diaphragma inflammatum, cor denique marcidum
 p. 205. et paruum reperiiebantur. Quinta decima tandem
 et vltima obseruatio fetum exhibet tubarium, ante
 sex circiter hebdomadas conceptum a femina, quae
 statim a congressu refrigerium passa, febre inflam-
 matoria periit. Aperto abdomine, ingens occurrit
 sanguinis extrauasi copia, quae ex vasis tubae dextrae
 disruptae, fetum istum adhuc continentis, efflu-
 xerat.

XIX.

Dissertatio inauguralis de tunicis vaginalibus te-
 stis et funiculi spermatici, auctore IOANNE
 ERNESTO NEUBAUER, Giessensi, Giessae
 1767. ex officina Brauniana. 4. pl. 6. tab.
 aen. I.

Cl. Auctor dignissimus celeberrimi Argentoraten-
 sis Professoris anatomiae LOBSTEINII disci-
 pulus, qui ipse nunc in Ienenfi academia communi
 applausu anatomen docet, difficilem de tunica vaginali
 testis doctrinam, LOBSTEINII monitis atque obser-
 uationibus adiutus, explicare, in se hac dissertatione
 felici cum successu suscepit. Notum est, viros do-
 ctos, qui de fabrica corporis humani exposuerunt,
 mirum in modum inter se, quantum ad inuolucro-
 rum testis descriptionem attinet, discrepare, ita vt
 ne de eorum quidem numero et nominibus conue-
 niant.

niant. Quod quidem, vti de omnibus, sic praeci- p. 8.
pue de *tunica vaginali*, seu, vt mauult dici NEU-
BAUERUS de *vaginalibus tunicis* valet; quam tuni-
cam VESALIUS *erythroideam* *). FALLOPIUS
et alii veterum *elythroideam*, COLUMBUS *darton*,
VERDIER *peritestem*, plurimi tamen recentiorum
inprimis post REGNERUM DE GRAAF *vagina-*
lem dixerunt. Veteres non nisi vnam agnouerunt;
in quo recentiores nonnullos habent consentientes.
Alii contra duas *vaginalem* scilicet *funiculi* et *testis*,
et rursus alii, inter quos HALLERUS maxime et
LOBSTEINIUS censendi sunt plures; et is impri-
mis, quem vltimo loco nominauimus **) triplicem
vaginalem numerat (*vaginalem* scilicet *funiculi pro-*
priam: vaginalem testis propriam et *vaginalem com-*
munem, testis et funiculi) cuius quoque vestigia Cl-
Auctor sequitur. Has vero tunicas vaginales omnes
ita distinguit NEUBAUERUS Noster, vt doceat:
primum vasa, funiculum spermaticum constituentia,
pluribus cellulosae substantiae laminis inuolui, qua- p. 17.
rum interiores arcte vasa coniungunt obducuntque;
deinde epididymidis maximam partem cum teste in
quodam sacco peculiari ambos, insuper vestiente atque
combinante, libere fluctuare, exterioresque laminas
substantiae illius cellulosae cauum cylindricum forma-
re, inferiori extremo faccatum funiculum spermaticum
testemque cum epididymide descriptis, vaginalibus
funiculi et testis inclusis, continentem. Plenior
et subtiliorem descriptionem harum tunicarum
Ll 2 omnium,

*) Coniungit tamen eam cum cremastere, monetque
nonnullos conicere, illam ab ἐλκτρον (scribendum po-
tius, ἐλυτρον) quod volumen seu vaginam significat ita
nominari, λ in ε atticorum more conuerso vid. de
corp. hum. fabr. L. V. cap. 13.

**) Apud HALLERUM in *elementis physiologiae* Vol.
VIII. p. 420.

omnium, multis quoque minoribus annotationibus passim ab Auctore Cl. illustratam, omittimus, cum ea omnia, lectu quamuis per se dignissima, sine figuris difficulter intelligi queant. Vnum modo hoc dolemus Cl. Auctori non innotuisse, antequam hoc scriberet, quae post HALLERUM, CAMPERUS praecipue et HUNTERUS de processu peritonaei ad testes protulerunt, vnde origo tunicarum vaginalium omnino deducenda videtur. Quapropter etiam enixe, si, quae hic scripsimus, ad Auctorem Cl. pervenerint, rogamus, vt comparare ista cum suis observationibus easque inde magis illustrare ne dedignetur. Quod eo felicius praestitutum Cl. Auctorem praevidemus, cum ipse iam peritonaei cum tunica vaginali not. h. cohaesionem ceu veram eius originem observauerit.

p. 29. Septum intra tunicam vaginalem funiculi et testis a p. 37. variis Auctoribus descriptum, ex morbofo statu vel p. 41. administratione anatomica tantum ortum esse, pluribus probat. Vaginalem tunicam communem meram laxiorem substantiam cellulosa[m] sistere GARENGEOT et MONRO putarunt. Veram tamen tunicam esse, a vaginali testis et a cellulosa, vasa cingente,

p. 42. diuersam, Auctor Cl. demonstrat, et vsum tunicarum vaginalium explicat, descriptionem quoque administrationis anatomicae, qua usus est, inseruit, figuramque, quam ipse delineauit, adiecit.

p. 43.

Noua physico medica.

Facultatis medicae Vindobonensis doctores et professores sunt hi:

GERARDUS LIBERBARO VAN SWIETEN,
inclytae facultatis medicae Praeses.

ANTONIUS DE HAEN S. C. R. M. Consiliarius
aulicus, Archiater, institutionum pathologicarum
et praxeos Professor primarius.

HENRICUS IOANNES NEPOMUC. CRANZ,
S. C. R. M. Consiliarius, institutionum physiolo-
gicarum ac materiae medicae Professor.

MATTHIAS COLLIN S. C. R. M. Consiliarius
Anatomiae Professor.

NICOLAUS IOSEPHUS IACQUIN institutio-
num rei herbariae et artis chemicae Professor.

FERDINANDUS LEBER chirurgiae Professor.

VALENTINUS FERDINANDUS LEBMACHER artis ob-
stetriciae Professor.

Iam 1765. amici artium atque scientiarum *Vlissingae* sunt congressi et, nonnullis legibus sancitis, prae-
mium, quod est moneta aurea cum signo societatis, no-
mine auctoris et anno, quo proposita est quaestio, con-
stituerunt quaestioni, quotannis eruditorum examini
subiiciendae. Senatus *Vlissingensis* hanc societatem fo-
vebat, et anno 1769. a *Seelandinis* statubus *Seelandi-
nae societatis Vlissingensis* nomine ea insigniebatur,
quo anno etiam primam commentariorum *Vlissin-
gensium* partem *) quae plerumque chirurgica spe-
ctat, vulgarunt.

Elaborationes lingua *Bataua*, *Gallica* vel *Latina*
conscribendae et Cl. IUSTO TIEENK, qui socie-
tati perpetuo ab epistolis est, tradendae sunt semper
ante diem 1 maii anni illius, qui sequitur annum,

Ll 3

quo

*) Cuius titulum v. in comm. nostr. Vol. hoc p. 554.

quo quaestio est communicata cum eruditis, nec sine societatis venia ab Auctoribus vulgandae. Caeterum in mittendis commentariis eadem sunt observandae leges, quas aliae quoque Academiae praescribunt.

Inter directores, quorum quotannis alii eliguntur, atque socios eiusdem societatis multi sunt senatores atque mercatores. Nos vero eruditos, quantum scimus, solummodo nominamus sodales. Hi sunt:

DAVID DE GORTER Medicinae Doctor et Professor, Archiater Imperatricis Russiae, Societatis Harlemensis scientiarum sodalis.

IACOB PLOOS VON AMSTEL Medicinae Doctor Amstelodamensis.

IOANNES MARTIN HOFFMANN verbi diuini minister emeritus Maasluisensis.

SAMUEL HENRICUS MANGER, Sacro Sanctae Theologiae Professor, et verbi diuini minister in Academia, quae Franequerae floret.

EVERHARD PIETER SWAGERMAN Chirurgus Amstelodamensis.

DIONYSIUS VAN DE WYNPERSE, Theologiae S. S. Doctor et Professor Leidensis.

IOANNES FRIDERICUS HENNERT, mathematicum et astronomiae Professor Ultraiectinus.

CAROLUS A LINNÉ, Archiater regius Suecicus.

IOANNES BERNARDUS SANDIFORT, Medicinae Doctor et Professor Hagae comitum. *)

FRIDERICUS HENRICUS CHRISTIANUS HOFF Medicinae Doctor Arnhemensis.

IOANNES IGNATIUS VAN ZELDEN Med. Doctor Academiae Imperialis naturae curiosorum sodalis.

HENRICUS VINCK Medicinae Doctor, Professor Roterodamensis olim **).

Praeter

*) vid. Comment. nostr. Vol. hoc p. 351.

**) v. ib. p. 351.

Praeter responsiones ad propositas ab *Eadem* societate quaestiones desideravit ea quoque elaborationes aliae atque observationes virorum doctorum. Ac, cum duae a Societate dignae sint iudicatae, quae praemio argenteae monetae ornarentur, et ad nos pertinerent, lubuit earum hic mentionem facere.

Ac primum quidem commemoramus Cl. ALEXANDRI PETRI NAHUY, Philosophiae ac Med. Doctoris et Professoris Harderovyci observationes *de vera et plenaria urinae suppressione, atque peripneumoniae per salivationem felici curatione, nec non de insigni numero hydatidum, eadem methodo curatarum*; porro Cl. s. VAN NOOTEN experimenta *de electricitate in paralyfi*.

Inter quaestiones, ab *Eadem* societate cum eruditis communicatas, hae, a nostro instituto non alienae, videntur dignae, quae repetantur. Quaestio prima ad annum 1770 pertinet: *Potestne naturae scrutator ex cognitis iam observationibus et experimentis coniectaria ad disquisitionem causarum haecenus incognitarum, phaenomenorum colligere? Si possit, quare ratione hoc fiat?* Quae cum Societati ab iis, qui commentarios ei tradiderunt, non penitus exhausta videatur, eandem 1773 denuo proposuit Societas.

Cui simul ad eundem annum nova est addita quaestio ita concinnata: *quaenam sit causa ingentis decrementi collium arenosorum et rivorum (decroissement des dunes et des rivages) in Seelandia potissimum in insula Walcheren atque quomodo illud melius ac facilius, ac iam constat, arceri et praecaveri possit ita, ut ne sumtus nimii inde oboriantur.*

Societas scientiarum *Harlemensis* elegit socios in conuentu, die 21 maii 1771 habito. Hi sunt:

FRIDEERICUS BERNARD ALBINUS Med.
Doctor ac Professor Leidenfis.

EDUARD SANDIFORT, Med. Doctor ac Professor Leidenſis.

ALEXANDER PETRUS NAHUYS *) Medicinæ Doctor.

MAXIMILIAN. IACOB DE MAN, Medicinæ Doctor Nimuegiæ.

IOANNES FRIDERICUS CLOSSIUS, Medicinæ Doctor Hagæ Comitum.

Quæſtiones, ab *Eadem* ad anni 1773 et 1774 in eodem conuentu traditas, cum ad nos non pertineant, relinquimus.

Scientiarum Academiae *Theodoro Palatinae* in congreſſu publico, qui habebatur *Manhemii* die 20 octobris 1771 quæſtio 1773 hæc eſt: *Quinam ſint characteres eſſentiales utriusque ſexus filicum, ac inprimis quidem equiſeti aruenſis, oſmundæ regalis et pter aquilinae LINNAEI? Vtrum firmis argumentis indubitataque experientia germen pollinis ſeminalis in acervulis vel in aliis locis depreſſis ſine alia fructificatione demonſtrari queat, an ſit ille ad germinationem plane incongruus.* Quæ in conſcribendis pariter, ac mittendis commentariis obſervari debent ab Auctoriſus iis hic enarrandis, cum in antecedentibus ſæpius ſint tradita, **) ſuperſedere poſſumus,

Electi ſunt ab Academia Imperiali *Naturæ Curioſorum* hi focii:

PETRUS BURMANNUS, Profeſſor Amſtelodamēſis.

IMMANUEL IACOB VAN DEN BOSCH, Medicinæ Doctor Hagæ Comitum.

PETRUS BODDAERT, Medicinæ Doctor Ultraiectinus.

Eidem

*) v. infra p. 538.

**) vid. Comment. noſtror. Vol. XV p. 174.

Eidem quoque Academiae CHRISTIANUS ANDREAS COTHENIUS Consiliarius Archiater Regis Borussorum potentissimi primarius rerum medicarum et chirurgicarum in toto regno et ipsius huius Academiae *) director, mille imperialium largitus est, quorum usurae annuae a Praeside et Directore huius Academiae quaestioni, quae res clinico practicas attinet, dicari debent. Huius instituti rationem vberiore in peculiari scriptione Cl. COTHENIUM esse redditurum, relatum legimus.

Naturae indagatorum societas *Gedanensis* die 28. februarii 1771 conveniebat ad praemia distribuenda iis, qui ad quaestiones, ab *Eadem* propositas, et a nobis commemoratas in antecedenti volumine **) responderant, atque conquerebatur, sese vnum modo commentarium de canali, aquam inquinatam puram in urbem vehente ***) nactam esse.

Alterius autem quaestionis, viarum straturam et platearum immunditiem spectantis ****) elaborationes quasdam accepit *Eadem*, quarum illa, quae a CHRISTIANO HENRICO THINKEL, qui hospitia militaria regiae Borussicae legionis pedestris de ROTHKIRCH designat, et Nissae in Silesia superiore commoratur, missa fuit, praemio est condecorata.

Praemium quaestionis de nitro murario *****) distribuetur ultimo februarii 1772 die, quod constabit triginta nummis aureis.

Groningae Cl. VAN DOEVEREN *****) successit Cl. PAULUS S' GRAEUVWEN et professio-
Ll § nem

*) Comm. nostr. Vol. XV, p. 705.

**) vid. Comment. nostr. Vol. XVI. p. 161.

***) vid. ib. p. 163.

****) vid. ib.

*****) vid. ib. p. 162.

*****) vid. Comment. nostr. hoc Vol. p. 163.

nem medicinae ordinariam, praxeos et chimiae adiit
die 19 iunii 1771 oratione: *de anatomiae pathologi-
cae utilitate ac necessitate.*

Eodem die eiusdem anni *ibidem* Experientissimus
WYNOLD MUNNIKS professionem ordinariam
anatomiae ac chirurgiae accepit, cuius adeundae
caussa *de summis, quas anatome habet, deliciis* verba
fecit.

Ibidem Cl. PETRUS CAMPER poliater est
nominatus.

Harderovyci Cl. NICOLAUS GEORGIUS
OSTERDYK SCHACHT, IOANNIS filius, pra-
xeos clinicae, chemiae et botanices professor initium
praelectionum fecit, praemissa oratione: *homines
bene multos ex nimio vitae desiderio mortem sibi opera-
re*, quam habuit die 17 iunii 1771.

Ibidem Cl. ALEXANDER PETER NAHUY
Professor ordinarius anatomiae et chirurgiae est
electus.

Brunsvici in collegio Carolino est nominatus pro-
fessor medicinae Experientissimus LAURENTIUS
FRIDERICUS CRELL.

Nuper constitutae Societatis Batavae *) soda-
lis est nuncupatus Cl. IOANNES CHRISTIA-
NVS POLYCARPVS ERXLEBEN. **)

Academiae regiae scientiarum *Nidrosianae* ***)
iam vero *Norwegicae* socius est factus Cl. HENNIG
Ienensis.

Die

*) vid. Comment. nostr. hoc Vol. p. 162.

**) vid. ib. p. 164.

***) vid. Comment. nostr. Vol. XVI, p. 666.

Die 31 maii 1771 Cl. IOANNES WYNGARD, chirurgus et ciuitatis Saltbommelenensis medicus obstetricius *Daventriam* ab amplissimo magistratu lector anatomiae, chirurgiae et artis obstetriciae, nec non civitatis eiusdem chirurgus et obstetricius medicus vocatus est et confirmatus.

Die 1 februarii 1771 *Middelburgi* annum aetatis quinquagesimum septimum agens Cl. PAVLVS DE WIND, Medicinae Doctor, anatomiae, chirurgiae et artis obstetriciae lector, ciuitatis regionisque Middelburgensis chirurgus et medicus obstetricius, Societatum scientiarum Harlemonensis et Seelandinae Vlissingensis *) sodalis desiit viuere.

Cl. GVILIELMVS PORTERFIELD medicinae Doctor Edimburgensis variis scriptis clarus ac imprimis eo, quod spectat organon visus **), succubuit.

Erfordiae die 19. septembris 1771. Experientissimus IOANNES PAVLVS BAYMER, medicinae et politices Professor ordinarius anno aetatis quadragesimo sexto vitam cum morte commutauit.

EGIDIVS DE BERTRAND PIBRAC, regis ac scholae regiae militaris chirurgus primus et regiae Academiae chirurgicae director, marasmo senili ita consumebatur, vt die 14 iulii 1771 aetatis septuagesimo octauo placide exspiraret *Parisiis*.

Cl. BARTHOLDVS RENON Geometra die 20 septembris 1770 *Criczaeae* obiit.

Petro-

*) vid. supra p. 533.

**) v. Comment. nostr. Vol. VIII, p. 401.

Petropoli die 28. septembris 1771. Cl. LEON-
HARDO EULERO visus amissus, felici operatione
cataraetae a Cl. Lib. Baron. AB WENZEL, pror-
sus restitutus est.

Summe Reverendus IOANNES DANIEL MI-
CHAELIS Gottingensis nonnullis annis ante polli-
citus est, CELSII *hierobotanicon* annotationibus et
additamentis partim suis, partim a CELSIO relictis, quas
a domo Celsia accepit, edere. Cum vero haec noua
editio variis rebus retardaretur, *Ioannes Christianus*
Dieterich bibliopola eius curam lubenter in se susce-
pit. Adnotationes itaque, a Cl. MICHAELIS ei traditae,
dimidiam operis partem explebunt. Totum autem
opus, quod ita inscribetur: OLAI CELSII hiero-
botanicon, cum notis et supplementis IOANNIS
DANIELIS MICHAELIS, duabus constabit par-
tibus, quarum prima 1772 et secunda pars 1773.
prodibit.

Referre hic quaedam de historiae naturalis Cll. vi-
rorum DE BUFFON et D' AUBENTON nuperri-
ma editione, eiusque a priori differentia, mutationi-
bus atque additamentis, quae prodiit apud biblio-
polam Amstelodamensem *Schneiderum* in quarto
1766-1770 in quindecim voluminibus hoc titulo.
*Histoire naturelle générale et particuliere avec la descri-
ption du Cabinet de Roi* par Mrs. DE BUFFON et D'
AUBENTON, non ingratum fore nostris Lectoribus
adducimur, vt credamus.

Ac *primum* quidem volumini primo oratio a Cl.
DE BUFFON, cum Academiae Regiae scientiarum
Parisiensi associaretur, habita, est praefixa. Haec,
etsi historiam naturalem non attinet, ob elegantiam
tamen praeceptorum de arte scribendi, multis et
egregiis

egregiis exemplis probatorum, quae hic adiungeretur, digna iudicata, illique figura aenea cum insignibus Cl. DE BUFFON honoribusque, ipsi tributis, praemissa est.

Dein adiecta est volumini tertio tabula sceleti humani ex b. BERN. SIGFR. ALBINI *) tabulis cum breui omnium ossium sceleti humani descriptione atque dimensione.

Tertio historia felium, praefixa volumini sexto primae editionis, volumini quinto huius editionis est inserta. Animalia itaque domestica in volumine quarto et quinto congesta sunt omnia.

Quarto figurarum animalium voluminum, a quarto ad decimum usque haecenus minus bene ordinarum cuilibet volumini eae sunt insertae, de quibus in quolibet est sermo. Secundum methodum itaque, quae hic obseruatur, volumina, a duodecimo ad decimum quintum sunt mutata, iisque variae figurae additae.

Quinto volumini nono tres praemissae sunt orationes elegantes, quae animalia antiqui ac noui orbis, vtrique communia, concernunt.

Sexto adiecta est volumini duodecimo tabula cum descriptione, in qua figura *equi marini* s. hippopotami falso dicti, ostenditur, qui in museo academiae Leidensis conseruatur, nec minus conuenit cum *leuiathan*, cuius in scriptura sacra fit mentio. Porro et eidem volumini figura *dromedarii* (renne) addita est.

Septimo in volumine decimo tertio, adiecta figura *camelopardali* (giraffe) ex eodem museo deprompta, cum eius descriptione, dubitationes Cl. DE BUFFON super cornua singuli animalis solutae, insimulque obseruationes de *criceto*, cuius historiam Cl. DE BUFFON addidit, ab anonymo **) communicatae insertae deprehenduntur.

Octauo

*) vid. infra p. 543.

**) Est vero Cl. ALLEMAND Professor Leidensis.

Octavo simiarum species in volumine decimo quarto collectae sunt, cui figura simiae (iolie guenon) nomine palatine a Cl. B V F F O N ad (*mou-
flac*) *) relata, est addita.

Nono incipit itaque volumen decimum quintum a dissertatione de metamorphosi quadrupedum cum cognitione necessaria quorundam animalium, a Cl. de B V F F O N omisforum.

Atque ita haec editio aucta est duodecim animalium figuris et descriptionibus, ac variis additamentis cum indice rerum in his voluminibus omnibus contentarum locupletissimo.

Viro Cl. IOANNE CHRISTIANO POLYCARPO ERXLEBEN**) exitinere per Belgium, Galliam Germaniaeque partem, artis veterinariae causa per regis clementiam instituto, reduce *Gottingae* auctoritate publica atque sumtibus *Anatomia* in usum eorum, qui *rei veterinariae* sese dicant, est constituta. Huic praeest Cl. ERXLEBEN, qui in fabrica animalium declaranda ac arte haec disseccandi docenda et brutorum aegrorum curationibus tradendis per instituti rationem ita versabitur, ut theoriam pariter, quam praxin huius artis explanet. Ac quanto melius ac utilius hoc fieri possit, quanto magis est necessarium, magna copia brutorum aegrorum Cl. ERXLEBEN traditur, qui non solum ab eo, sed etiam simul ab artis veterinariae studiosis curari debent.

Memoria

*) vid. Comment. nostror. Vol. XV, p. 655.

**) Comment. nostr. Vol. hoc p. 164. it. p. 538.

Memoria BERNHARDI SIGFREDI ALBINI,
Medicinae Doctoris, Anatom. Chirurgiae et
Therapiae P. P. O. in Academia Leidensi,
Praesidis collegii chirurgici, Societatum
scientiarum Petropolitanae, Londinensis et
Harlemensis socii.

Esti omnes doctrinae medicae partes, quibus no-
stra aetate artis vniuersae complexus constat,
suum ac dignitatem habent, tamque arcto in-
ter se vinculo aptae sunt atque coniunctae, vt nulla
facile sine alterius damno negligi possit ac debeat:
tamen, quae structuram corporis humani dissecan-
dis cadaueribus exponit, ea communi cum veterum,
et recentiorum medicorum consensu, princeps
omnium, maximeque necessaria existimatur. Nam-
que adhuc valet, quod in patris medicinae praece-
ptis traditur *), *Principium omnis in medicina quaestio-
nis esse naturam corporis*. In quo licet ipse ad vni-
uersae naturae cognitionem, ad quam medicus con-
tendat, respexisse videatur, tamen nihil dubitationis
relinquitur, quin praeter cetera corpora, huma-
num maxime intellexerit, in quo cognoscendo, ex-
plorandoque laborari oporteat. Certe tum ipse,
tum ceteri, qui voluerunt esse Hippocratici, ope-
ram dedere, vt in hoc studio excellerent, aliisque,
vt idem conarentur, Auctores exstiterunt grauissi-
mi. Neque enim, vt hoc obiter dicamus, errare
nobis videntur, qui hoc ipso in genere principem
faciant HIPPOCRATEM, quamuis esse non igno-
remus, qui contra sentiant. Sed causam istam
omnem, qui volent, ex Trilleriana disputatione, **)
h. e.

*) HIPPOCRATES de locis in hom. l. 29. 4, I. φύσις τῆ
σώματος ἀρχὴ τῆ ἐν ἰντερικῇ λόγῃ.

**) De HIPPOCRATIS studio anatomico singulari,
quae prodiit Vitemb. 1754.

h. e. iis, quae ibi indicata sunt, praefidiis, cognoscent. Nos satis habemus in praesenti auctoritatem huius rationis atque grauitatem demonstrare ex eo, quod, vt quisque inter medicos nostrae aetatis et est et habetur artis peritia praestantissimus, ita maxime in cognoscenda hac parte atque perficienda laborarit. Quod cum ostendissent WINSLOVIUS, RUYSCHIUS, RAVIUS, VIEUSSENIUS, EUSTACHIUS, HEISTERUS, HALLERUS, alii, non modò dum viuerent, magna nominis celebritate floruerunt, partimque adhuc florent, sed et apud posteros in magna laude ac dignitate semper manebunt. Inter quos cum praecipuo quodam iure B. SIGFREDUS ALBINUS referatur, vir, dum viueret, et meritis et dignitate amplissimus, nobisque ob praestantissima interioris doctrinae monumenta longe carissimus, memoriam illius eo, quo solemus, modo legentium studiis commendare volumus.

Ipse quidem ex clara gente natus est a. 1697. d. 24. febr. Francofurti ad Viadrum. Namque patre vsus est B. ALBINO, P. P. Therapiae in Viadrina, consiliario et archiatro regis Borussorum, matre Catharina Susanna TH. S. RINGII, Iuris Professoris in eadem academia celeberrimi, filia. Parentes cum non ignorarent, quanta vis esset disciplinae domesticae, animum filii, vbi primum per aetatis rationem fieri potuit, cum ipsi virtutis et doctrinae amore imbuerunt, tum aliis, bonis literis et moribus excolendum, perficiendumque tradiderunt. Atque haec cura patris ac diligentia tanto felicius cessit, quanto maiorem huius rei opportunitatem nactus erat. Etenim a. 1702. cum Leidam ad munus Professoris Anatomiae et Chirurgiae obeundum esset euocatus, et summos in omni genere disciplinarum viros reperisset, qui ei fauerent ac cu-
perent

perent, praeter cetera praecipuae felicitatis com-
moda id filio contigit, vt per omne literarum spa-
tium, quod percurrendum suscepit, duces habe-
ret longe peritissimos. Quod vel sola eorum nomi-
na indicant. Namque graecae ac latinae linguae a
SOMMERIO et VESTERHOFIO perceptis, ad
philosophiam conuersus non minus ad reliquas hu-
manitatis partes excolendas PERIZONIUM, GRO-
NOVIUM, BERNARDUM et SENGUERDUM,
primarios in suo quemque genere viros, secutus est.
Quorum e scholis cum recte cogitandi, scribendique
ac differendi facultatem adolescens deportasset ta-
lem, qualis vel in viro probatur, factum est, vt iam
tum a peritis ingeniorum existimatoribus iudicare-
tur, fore, vt is aliquando vir magnus existeret. Ne-
que id temere. Namque dudum obseruatum est,
insigniore in iuvene literarum humaniorum co-
gnitionem fere praeludere magnorum virorum ce-
lebritati, quin aperire illis Famae atque Honoris
templum, et rebus, quascunque aggressi fuerint,
grauioribus aptos praestare solere. In nostro qui-
dem ita se habere apparuit. His enim ab literis pa-
tratus cum ad patrem, reliquosque artis medicae do-
ctores celeberrimos, sicut BIDLOVIUM, RA-
VIUM, DECKERUM et BOERHAAVIUM di-
sciplinae causa accessisset, hos omnia, vt decet, la-
tine docentes non solum celerius intellexit, tradita-
que facilius percepit, sed et eam virtutem, quae
summa doctoris est, erat consecutus, vt, quaecum-
que audiuiisset, vidisset, legisset, cognouisset, cogi-
tasset, cum ipse periculum fecisset vel docendi vel
scribendi, summa perspicuitate et diligentia aliis tra-
deret. Vt autem omnes sibi ex vniuerso disciplina-
rum ambitu vnam et alteram, in qua maxime habi-
tent, eligunt, ita et Noster praeter botanicam, quam
admirabatur, anatomiam inprimis et chirurgiam per-

discendam sibi sumserat. Vinebant tum Leidae duo in primis viri, qui vtriusque artis docendae ac faciendae dexteritate essent nobilissimi, RUY-SCHIUS quidem et RAVIUS. Ad hos ergo dum se applicat Noster, eisque artem praecipiendo, demonstrandoque tradentibus frequens adest, ingenii follertiam et adfiduitatem singularem vtrique ita probavit, vt, quidquid in arte eximii haberent, liberaliter cum illo communicarent. RAVIUS praesertim tanta Nostrum complectebatur beniuolentia vt, quotiescunque in sanandis vulneribus et externis vitiis ad arduas curandi vias, quas *operationes* vocant, sibi confugiendum esset, ALBINUM suum adhiberet, cuius rei vsus et consuetudo tantum valuit, vt in difficillimis rebus, tanquam in calculo ex vesica, si huic innatus est, educendo, quam artem RAVIUS egregie callebat, ipse tandem excelleret. Sed quamuis hoc erat consecutus, aliis vt satisfaceret, tamen, vt sunt magna ingenia, plura deesse sibi videbantur, quibus se a vulgo medicorum fecerneret, et in paucis clarus esse posset. Itaque dignitate candidati ornatus a. 1718. patris consilio Lutetiae Parisiorum se contulit, vt tum nosodochiis obeundis tum praelectionibus Celeb. DUVERNEY, VAILLANT, aliorumque audiendis facultatem nancisceretur cognitionem huius generis rerum, quam iam haberet, augendi, atque amplificandi. Hinc autem vix vnā hyemem commoratus, a curatoribus academiae Leidensis amplissimis, vt domi munus lectoris anatomiae et chirurgiae in se reciperet, euocatus est. Horum voluntati cum Noster, quamquam invitatus, vtpote qui alias antea academias visere constituerat, cessisset, paucis post reditum diebus ab amplissimo senatu academico, suffragante facultate medica, sine praegressa disputatione doctor creatus est. Neque ita multo post, RAVIO suo ad damnum ingens

gens academiae defuncto, illius munus, licet tanto fulcro et adiumento destitutus, praegressa *de anatomicae comparata* oratione ita subiit, vt dignus omnino Cel. RAVII commendatione censeretur, nec non talem se praeberet, qualem cognitum iudicarent. Ex quo etiam factum est, vt stipendium eius annuum augeretur. Academia cum a. 1721. obitum patris lugeret, nec haberet, quo afflicta erigeretur, praestantia filii, tanto patre digni, magnopere confirmata est. Qua de causa omnium suffragiis effectum est, vt locus Professoris anatomiae et chirurgiae, qui patris obitu vacabat, ad eum deferretur; quem quidem die 9 Nouembr. eiusdem anni oratione *de vera via ad fabricae humani corporis cognitionem ducente*, recitanda occupauit. Ab hoc inde tempore non solum id egit, vt studiis adolescentium, qui in ipsius se disciplinam ac fidem contulissent, docendo inseruiret, sed etiam allaborauit, vt commentanda artem, quam profiteretur, auctam, ornatamque relinqueret. Ac primum quidem cum lectissimus praeparatorum anatomicorum apparatus, quem ab RAUIO sibi legatum Academia seruabat, lateret, nec quidquam utilitatis, nisi quae inspicientibus forte contingere solet, haberet, eum ipse rogatu Curatorum, Consulumque vrbs, notis illustratum, cumque vita et curationis ratione, quam Cl. Praeceptor in calculosis adhibuerat, auctum, ornatumque an. 1725 publicauit. Quo studio et labore quantam ab idoneis harum rerum iudicibus inierit gratiam ALBINUS, facile est intellectu. Neque enim facile quisquam poterat inueniri, qui vel in cernendo, diiudicandoque hoc apparatu ALBINO esset acutior, vel in describenda Rauiana calculi secandi ratione, quem *apparatum lateralem* vocant, sollertior, quippe qui eam, ab RAUIO cum nemine communicatam, solus ex pluribus, quibus interfuerat, curationibus comper-

tam habebat. Quo facto osteologiae studiosus descriptionem ossium corporis humani, diuulgauit. Musculis deinde ex ingenti cadauerum apparatu diligentius inuestigatis, obseruationibusque, quam fieri poterat accuratissime inter se collatis, opus quod omnia super hac re scripta longe post se relinqueret, cum eruditis communicauit. Sic cognitione, quam in anatomia partium crassiorum haberet demonstrata, quid in anatomia subtiliore valeret opportunam ostendendi nactus est facultatem. Etenim I. L. ADMIRALIVS egregius ille pingendi artifex cum a Nostro petiisset, vt delineationes partium cera impletarum, quae coloribus collustrarentur, sibi traderet, Noster eius voluntati morem gerens arterias primum et venas intestinorum elegit, quas luculenta dissertatione illustratas ederet, quam haud ita multo post altera, prima non inferior, quae de sede et causa coloris Aethiopum, ceterorumque hominum exponeret, subsecuta est. Iam cum intellexisset, delineationes haecenus ossium fetus minus bonas esse, accuratius in hanc rem inquirere non alienum putauit: qua absoluta egregias icones ossium fetus, a Cl. VANDELARIO, qui aliquot etiam tabulas musculorum manus in opere myologico sculpsit, aeri incisas, nobiscum communicauit. Paucis annis post in magno, quod moliebatur, opere anatomico occupatus tabulas myologicas edidit, quae non omnibus modo se probarunt, sed tantam simul admirationem excitarunt, vt totam intelligentissimam quisque anatomiam ita elaboratam ab ALBINO exoptaret. Tum septem tabulae vteri mulieris gravidae, addita vna insuper tabula cum peculiari fetu situ, a semet conspecto, prodierunt. Myologia siue absoluta tabulas ossium ad eundem modum emitte re non dubitauit. His tandem cum tabula vasa chyli ferum, venam azygos, arterias intercostales
alias

aliasque vicinas partes referente, finem imposuit, quarum omnes in *annotationibus academicis*, quod opus observationum optimarum ad varias res, imprimisque ad anatomiam spectantium plenum, continuatum est, illustravit. Neque vero, licet operam suam maximis viris probatam sciret, ita sibi indulgit, ut pro ingenio multorum, operam aliorum et industriam contemneret, deque laudibus eorum detraheret, sed, si qua posterorum cognitione digna ab iis prodita iudicasset, ut recognita recuderentur, atque cum vita auctoris et praefatione ornata prodirent, curavit. Quorum ex numero sunt explicatio tabularum Eustachianarum ab ipso edita. Porro Cl. VESALII opus, cuius editionem simul cum magno BOERHAAVIO curavit, tum diui HARVEI et FRIDERICI AB AQPAPENDENTE scripta, nec minus additamenta sua ad alteram editionem Bibliographiae anatomicae IACOBI DOUGLAS, Lugd. Bat. an. 1744 euulgatam. Quibus rebus factum est, ut non solum Academia, cuius erat insigne ulcrum ac decus, sed exteri etiam, ad quos fama viri et doctrina pervenerat, summo eum amore et studiis prosequerentur. Nam societates scientiarum Petropolitana, Londinensis et Harlemensis huius viri in numerum suorum receptionem ambierunt, et Academia Leidensis, quo ALBINVM suum retineret, nihil fere non voluntati ipsius tribuendum putavit. Ita enim sibi contigit, ut a. 1745 cum provincia Professoris Therapiae ab amplissimis Academiae curatoribus ad eum esset delata, abdicato munere Professoris anatomiae et chirurgiae, quod periginti quinque annos summa cum laude obtinuerat, fratrem FRID. BERN. ALBINVM successorem haberet. Rectoratum academiae bis gessit, annis videlicet 1726 et 1738., eundemque totidem sibi 1758. et 1770. sorte oblatum ultro recusavit.

Bis quoque senatus Academiae Nostrum a secretis habuit. Quod ad ipsam artis medicae tractationem, quam *praxin clinicam* vulgo vocant, attinet, eam quidem non ex instituto exercuit, neque tamen ulli vel chirurgi vel medici opem desideranti, qui se consulisset, consilium denegavit. Ex his omnibus, atque ex indefesso eius in primis anatomiae studio, quod in multam saepe noctem protraxit, non mirandum erat, si corpus admodum ita debilitatum varios graues morbos experiretur, quos tamen et naturae et artis beneficio saepius superauit. Ad extremum autem, cum viribus sensim decrefcentibus, de molestis abdominis affectionibus saepe numero quereretur, his in dies exacerbatis d. 29. aug. huius anni febris maligna superuenit, tertianam duplicatam mentiens, cumque summa anxietate spirandi coniuncta, qua ita debilitatus est, vt die 9. septembris, mense supra tertium et septuagesimum aetatis annum sexto expiraret. Cuius viri obitu si non modo Academiam Leidensem, de qua per quinquaginta fere annos laudabiliter meritus est, grauiter afflictam confirmemus, sed etiam omnes, qui magnorum hominum ingeniis et disciplinarum incrementis fauent, summo moerore adfectos dicamus, non veremur, ne nostro in illum amori nimium tribuisse, neue modestiae fines ab aequis rerum iudiciis transisse censeamur. Nam quis est, qui talem virum, cum discipulorum doctrina per totam Europam clarum, tum operum praestantia celeberrime laudare sustineat? In primis autem Clara Magdalena Dupeyrou, cum qua a. 1765 matrimonium iniit, Stephani Dupeyrou, mercatoris Amstelodamensis primarii, et Margarethae Clarae Mayffart, amplissimi Lucae Trip Dirkszoon, Commissarii Amstelodamensis, viduae filia, obitum mariti cum summo pietatis sensu adhuc lugere existimanda est.

Index scriptorum BERNHARDI SIEGFRIED
ALBINI cum aliorum scriptis cura EIUSDEM
editis.

Oratio inauguralis de anatome comparata L. B.
1719. 4.

Oratio, qua in veram viam, quae ad fabricae corpo-
ris humani cognitionem ducit, inquiritur ib.
1721. 4.

Index suppellectilis anatomicae, quam Academiae
Batauae, quae Leidae est, legavit IOANNES
IACOBUS RAUIUS rogatu Illustrissimorum et
Amplissimorum academiae istius curatorum et
urbis consulum confectus a BERNHARD SIEG-
FRIED ALBINO, qui et vitam eius nec non
methodum curandi calculosos in simulque instru-
mentorum figuras addidit. ib. 4. c. fig.

De ossibus corporis humani ad auditores suos libel-
lus ib. 1726. 8. (*Qui Viennae, 1748. 8. est recu-
sus*).

Historia musculorum hominis, ib. 1734. 4. c. f.

Dissertatio de arteriis et venis intestinorum hominis,
adiecta icon coloribus distincta, ibid. 1736. 4.
c. fig.

Dissertatio secunda de sede et causa coloris Aethio-
pum et caeterorum hominum, accedunt icones
coloribus distinctae, ib. 1737. 4.

Icones ossium fetus humani; accedit osteogeniae
brevis historia, ib. 1737. 4.

Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, ib.
1747. fol. regal. (*Anglica huius libri translatio
prodiit Londini folio imperiali 1752.*)

Vteri mulieris grauidae, cum iam parturiret, mortuae
tabulae VII. ib. 1748. fol. reg. it. Appendix, ib.
1751. Fol. reg. (*Vbi peculiaris fetus situs spe-
ctatur.*)



Tabulae ossium humanorum ib. 1753. fol. reg.

Tabulae vasis chylieri cum vena azygos, arteriis intercostalibus aliisque vicinis partibus ib. 1757. fol. regal.

Academicarum annotationum liber primus continet anatomica, physiologica, zoographica, phyto-graphica, ib. 1754. 4. mai. c. f.

Academicarum annotationum liber secundus continet anatomica, physiologica, pathologica, ib. 1755. 4. mai. c. f.

Academicarum annotationum liber tertius continet anatomica, physiologica, pathologica, zoographica, ib. 1756. 4. mai. c. f.

Academicarum annotationum liber quartus continet anatomica, physiologica, pathologica, ib. 1758. 4. mai. c. f.

Academicarum annotationum liber quintus, continet anatomica opportunitate necessariae defensionis, ib. 1761. 4. mai. c. f.

Academicarum annotationum liber sextus, continet physiologica, anatomica, pathologica, phytotomica, ib. 1764. 4. mai. c. f.

Academicarum annotationum liber septimus, continet anatomica, physiologica, pathologica, ib. 1766. 4. mai. c. f.

Academicarum annotationum liber octauus, continet quaedam de scriptis ac tabulis suis opportunitate epistolae CAMPERI, ib. 1768. 4. mai.

De sceleto humano liber, ib. 1767. 4.

ANDREAE VESALII opera omnia anatomica et chirurgica cura HERRMANNI BOERHAAVE et cura BERNHARDI SIEGFRIED ALBINI Tom. I. et II. ib. 1725. fol. c. f.

HIERONYMI FABRICII AB AQVAPENDENTE opera omnia anatomica et physiologica, hactenus variis locis ac formis edita, nunc vno certo

certo ordine digesta, et in vnum volumen redacta.
 Accessit rerum et verborum index completissimus
 vna cum praefatione B. S. ALBINI ib. 1732. fol.
GVILIELMI HARVEI opera, seu exercitatio ana-
 tomica de motu cordis et sanguinis in animalibus,
 atque exercitationes duae anatomicae de circula-
 tione sanguinis ad IOANNEM RIOLANVM fil.
 et exercitationes de generatione animalium cum
 praefatione B. S. ALBINI ib. 1737. 4. c. f.
BALTHASAR. EVSTACHII explicatio tabularum
 anatomicarum. Accedit noua tabularum editio,
 per B. S. ALBINVM, ib. 1744. fol. c. f.
 Eundem librum IDEM recognouit, castigauit, auxit
 et denuo edidit, ib. 1761. fol. c. f.

XXI.

**Index scriptorum physico medicorum, quae an-
 no 1769. prodierunt.**

Catalogue hebdomadaire : ou liste alphabétique des
 livres tant nationaux qu'étrangers des arrêts du
 conseil et des parlemens, déclarations et édits du
 Roi, extraits du conseil et des registres des parle-
 mens, lettres patentes du Roi, ordonances, sen-
 tences etc. cartes géographiques, musiques et
 estampes, qui sont mis en vente chaque semaine
 avec l'indication des Auteurs, du nombre et du
 format des volumes et les adresses des libraires
 et autres, qui les vendent. Année 1769. à
 Paris, 8.

**Bibliothèque de physique et d'histoire naturelle, con-
 tenant la physique générale, la physique particu-
 lière, la mécanique, la médecine, la chymie, la
 botanique, l'anatomie, l'histoire naturelle des
 insectes, des animaux et des coquillages, Tom.
 V. et VI. ib. 12.**

Philosophical transactions, giving some account of the present undertakings, studies and labours of the ingenious in many considerable parts of the world, Vol. LVIII. for the Year 1768. Lond. 4. c. tab. aen.

Histoire de l'académie royale des sciences; année 1766. avec les mémoires de mathématiques et de physiques pour la même année. Tirés de registres de cette académie à Paris. 4. c. tab. aen.

Mémoires de l'académie de Dijon. Tome premier, à Dijon et à Paris. 8. c. fig.

Verhandelingen uytgegeeven door de hollandsche maatschapye der weetenschappen te Haarlem, XI. Deel. Te Harlem, 8. c. tab. aen.

Verhandelingen uytgegeeven door het zeeuwsch genootschap der weetenschappen te Vlissingen. Eerste Deel. Te Vlissingen, 8. mai. c. f.

Kongl. Vetenskaps academiens handlingar för år 1769. Vol. XXX. Stockholm, c. tab. aen.

Der Königl. Schwedischen Academie der Wissenschaften Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltung, der Mechanick, auf das Jahr 1769. Aus dem Schwedischen übersetzt von ABRAH. GOTTHEL KAESTNER, 29ter Band, Hamb. und Leipzig, 8. m. Kupf.

Noui commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae, Tom. XIII, Petropol. 4. c. tab. aen.

Auserlesene medicinische, chirurgische, anatomische, chymische und botanische Abhandlungen der Römisch Kayserlichen Academie der Naturforscher, 18ten Theil, Nürnberg, 4. m. K.

Histoire de l'academie royale des sciences et des belles lettres de Berlin, Année 1767. avec les mémoires pour la même année à Berlin, 4. mai.

Schwaben

Schwaben zur Arzneygelahrheit und Naturkunde. Erster Band. Nördlingen, 8. (Quod et prodiit hoc titulo: 10. AUG. PHILIPP GESNER, Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneygelahrheit, Nördlingen, 8.)

Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, Naturgeschichte, Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft, und der dahin einschlagenden Litteratur, 1sten Bandes, 3. 4. 5. und 6tes Stück, Berlin, 8.

Neues Hamburgisches Magazin oder Fortsetzung gesammelter Schriften aus der Naturforschung der allgemeinen Stadt und Landökonomie, und den angenehmen Wissenschaften überhaupt, 5ter und 6ter Band, Hamb. und Leipzig, 8. m. K.

Gemeinnützige Nachrichten aus dem Reiche der Wissenschaften und Künste vom Jahre 1768. Hamb. 4.

Stralsundisches Magazin, oder Sammlung auserlesener Neuigkeiten zur Aufnahme der Naturlehre, Arzneywissenschaft und Haushaltungskunst, 5tes Stück Berlin und Stralsund, 8. m. K.

Die Ehre Gottes aus der Betrachtung des Himmels und der Erde. Eine Wochenschrift 5ter Band, Nürnberg. 8. mai.

Der Landarzt. Eine medicinische Wochenschrift. Franckf. und Leipz. 8. (Editio noua.)

Landwirthschaftliche Erfahrungen zum Besten des Landmannes. Eine Wochenschrift, 1. 2. und 3tes Quartal, Altona, 8. mai.

Georgical essays in which the food of plants is particularly considered. London, 8.

A discourse on public oeconomy and commerce. Translated from the Italian, ib. 8.

Mémoires et observations recueillies par la Société économique de Berne Partie I-IV. pour l'année 1769. à Berne, 8.

Nouveaux

Nouveaux essais d'agriculture à la faveur des enclos comparés avec l'ancienne culture fourmise ou parcourus par un Fermier de la Province à Paris, 12. Vol. I.

Museum rusticum et commerciale, oder auserlesene Schriften, den Ackerbau, die Handlung, die Künste und Manufacturen betreffend, aus der Erfahrung genommen und von verschiedenen in dieser Verrichtung geübten Männern mitgetheilt, von einigen Mitgliedern der Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste, Manufacturen und Handlung aber durchgesehen und herausgegeben. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet, 10ter Band, Leipzig, 8. m. K. (germanice reddidit I. I. **s.)

Der Königlich Großbritannischen, Churfürstlicher Braunschweigisch Lüneburgisch Landwirthschafts-gesellschaft Nachrichten von Verbesserung der Landwirthschaft und des Gewerbes. Zweyten Bandes zweyte und dritte Sammlung, Zelle, 8.

Allgemeines öconomisches Forstmagazin in welchem allerhand nützliche Beobachtungen Vorschläge und Versuche über die wirthschaftliche Policey- und Cameralgegenstände des sämmtlichen Wald- Forst- und Holzwesens enthalten sind; gesammelt von einer Gesellschaft, deren ordentliches Geschäft ist Waldungen zu gewinnen, zu benutzen und zu erhalten, 12ter Band Franckf. und Leipzig, 8. (Auctore IO. FRIED. STAHL.)

Allgemeines oeconomisches Forstmagazin, Stuttgart, 8. mai.

Instructions de morale et d'agriculture pour les habitants de la campagne, à Paris 12.

De re rustica; or the repository of select papers on agriculture, arts et sciences. Lond. 8. mai. (sine titulo et indice.)

Briefe

Briefe über den schlechten Zustand des Landmannes, und über die Mittel ihn zu ändern. Aus dem Englischen übersetzt. Sorau, 8. mai.

Betrachtungen über Landwirthschaftliche Dinge 4tes Stück, Tübingen, 8.

Betrachtungen über die Verbesserung des Landwesens in Dännemark, von einem Patrioten entworfen, Kopenhagen 8.

Sammlung auserlesener Schriften vom Staat und Landwirthschaftlichen Inhalte, mit Beyfall der öconomischen Gesellschaft in Bern herausgegeben. des 2ten Bandes 4tes Stück, Bern, 8.

Oeconomisch practische Vorschläge zur Verbesserung und Glückseligkeit der Länder, Nürnberg, 4. m. K.

Kurzer Innbegriff aller Wissenschaften, welche zu Einrichtung einer guten Oeconomie und Hauswirthschaft erforderlich sind. ib. 8.

Allgemeiner öconomischer Landwirthschaftscalender, oder nützlicher und getreuer Unterricht für den Land- und Bauersmann, worinnen alles zu finden, was derselbe nach allen vier Jahreszeiten in Acht zu nehmen hat. Stuttgart, 4.

The complete farmer; or a general dictionary of husbandry in all its branches; containing the various methods of cultivating and improving every species of land, according to the precepts of both the old and new husbandry, comprising every thing valuable in the best writers on this subject, together with a great variety of new discoveries and improvements to which is now first added the gardener's kalendar, calculated for the use of farmers and country gentlemen. Illustrated with a great variety of folio copperplates. The second edition corrected and improved by a Society of gentlemen members of the Society for the

the encouragement of arts, manufactures and commerce. London 4. mai.

Der Hausvater. Fine öconomische periodische Schrift 4ten Bandes 1stes Stück. Hannover. 8. mai,

Der kluge Hausvater bey dem wirthschaftlichen Geschäfte der Aufbehaltung verschiedener wirthschaftlichen Producte. 2te verbesserte Auflage, Leipzig 8.

Anweisung wie man eine Baumschule von Obstbäumen im Großen anlegen und gehörig unterhalten soll. Halle 8. mai.

Anleitung zum Forstbau zum Gebrauche des Landvolks Bern 8.

Anleitung für die Landleute in Absicht auf das Ausstocken und die Pflanzung der Wälder 4. 5. und 6tes Stück, Zürich, 8,

Kurze Anleitung zur Pflanzung und Wartung des Holzes, ib. 8.

Traité des bois et des différentes manières de les semer, planter, cultiver, exploiter, transporter et conserver, ib. 8. Vol. 2.

Beobachtungen von einigen Blumen, deren Bau und Zubereitung der Erde, Leipz. 8.

Abhandlung von Zwiebelgewächsen. Aus den Französischen übersetzt. Nürnberg. 8.

Gedanken von Verbesserung des Flachsbaues vornehmlich im Mecklenburgischen, 8.

Swar på den andra gängen framstälde frågan huru måkare som göra skada på frukt träd medelst blomorna och bladens förtärande bäst kunna förekommas och fördrifwas, Stockholm, 8.

Anweisung zur Bienenzucht für den Landmann. Anspach 8.

Von der besten Bienenzucht in Churpfalz. Drey Preisschriften. Mannheim, 8.

Nachricht von der in England eingeführten Weise die Steinkohlen abzuschwefeln und Zunder zu machen, Nebst Abbildung des englischen Ofens, 8.

Neues

Neues Harzmagazin, von Sachen, die in die Oeconomie, Policy, Bergwerks und Cameralwissenschaft einschlagen, 3tes bis 4tes Stück. Blanckenburg, 8.

Nachrichten von Künstlern und Kunstfachen, 2ter Theil Wien 8. m. K.

Schauplatz der Künste und Handwerker, oder vollständige Beschreibung derselben, gefertigt und gebilliget von den Herren der Academie der Wissenschaften zu Paris mit vielen Kupfertafeln, 9ter Band. In dieser deutschen Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von DANIEL GOTTFRIED SCHREBER Königsb. 4. mai.

Bericht vom Bergbau. Im Verlage der churfürstlich Sächsischen Bergacademie zu Freyberg, 4. m. K.

Practische öconomische Abhandlung von Zubereitung der weißen Stärke und Anlegung einer sehr vortheilhaften Stärkenfabricke. Erfurt 8.

Entdecktes Geheimnis der Müller, Becken und Melber oder gründliche Nachricht von der verschiedenen Güte und Gewicht des Getreides, dessen Ankauf, dann, was der Müller nach Abzug der Metz an Mehl zu liefern, was der Beck nach Abzug der Kosten an weiß und schwarzem Brodt, dem Gewicht nach zu backen, und wie der Melber das Mehl von jeder Sorte zu verkaufen habe; hauptsächlich zur Begreifung einer Policeymäßigen Raitung oder Brod und Mehlsatzes dem Publico zum besten gefertigt und nach den Nürnberger Maaß eingerichtet. Anspach, fol.

The lamentable state of physick in England. London 8.

Bibliotheque de physique et d'histoire naturelle recueillie des meilleurs Auteurs à Paris, 12. T. 7.

Les singularités de la nature, à Basle, 8.

Lettres sur les animaux, les végétaux et les minéraux, à Paris, 8.

Onomato-

Onomatologia historiae naturalis completa, oder
vollständiges Lexicon der Naturgeschichte nach ihrem
ganzen Umfange unter der Aufsicht und mit einer
Vorrede Herrn IO. PETER EBERHARDS. Vier
ter Theil. Ulm, 8. mai.

Indian zoology, Lond. 8. (Auctore T. PENNANT)
British zoology. Class. III. Reptiles, Class. IV. Fish
Vol. III. Chester, 8. c. f. (Auctore EODEM.)

Histoire des singes et autre animaux curieux dont
l'instinct et l'industrie excitent l'admiration de
hommes. Francfort, 8.

Florae Danicae iconum fasciculus octauus a tab
CCCCXXI - CCCCLXXX. viuis coloribus picti
(germanice et latine) Hafn. fol.

Catalogue des plantes, qui croissent dans la Lorrain
ne, faisant suite aux onze volumes donnés précé
demment. à Paris, 12. Vol. I.

Nomenclator botanicus, continens plantarum in
terris Danicis sponte nascentium, nomina vernac
ula in linguis, Gallica, Anglica, Germanica
Suecica, Danica cum nomenclatore synonymico
Linnaeano et pharmaceutico Linnaeano, ib. 8.

Mineralogische Belustigungen, zum Behuf der Chymie
und Naturgeschichte des Mineralreichs ster und öster
Theil. Leipz. 8. mai. m. K.

Neue physicalische Belustigungen, 1sten Bandes 1ste Ab
theilung, Prag, 8. mai. m. K.

Catalogue raisonné d'une collection choisie de miné
raux, cristallisations, madrépores, coquilles et
autres curiosités de la nature et de l'art à Pa
ris, 8.

Traité abrégé des pierres fines ou productions de
la nature des Indes Orientales suivi de calculs et
operations d'Alliage sur les matières d'or et d'ar
gent. Vol. I, ib. 12.

Abhand-

Abhandlung über eine beträchtliche Anzahl Erdarten aus Sr. Majestät deutschen Landen etc. und von derselben Gebrauch für den Landwirth. Auf Befehl der Königl. Churfürstl. Cammer dem Druck übergeben. Hannover, 8. (Auctore Cl. ANDREA E Pharmacopeo Hannouerano.)

Verzeichniß eines zahlreichen Original Müntzcabinets. Nürnberg, 8. mai.

Histoire générale des voyages, ou collection nouvelle des relations des voyages par mer et par terre. Tom. XVIII. à Paris, 4. c. fig.

Voyage d'un François en Italie fait dans les années 1765 et 1766. contenant l'histoire et les anecdotes le plus singulières de l'Italie et sa description; les mœurs, les usages, le gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l'histoire naturelle et les antiquités; avec des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture et architecture et les plans de toutes les grandes villes d'Italie, Vol. 8. ib. c. f.

An essay on the natural history of Guiana in South-America. Containing a description of many curious productions in the animal and vegetable systems of that country. Together with an account of the religion, manners and customs of several tribes of its Indian inhabitants. Interspersed with a variety of literary and medical observations. In several letters from a gentleman of the medical faculty, during his residence in that country. London, 8. mai. c. f. (Auctore Cl. BANCROFT, cuius translationem germanicam, vide sub verbo BANCROFT.)

Description générale historique géographique et physique de la Colonie de Surinam. Amsterd. 8. mai. (Auctore Cl. FERMIN.)

Natürliche und bürgerliche Geschichte von Californien. Erster Theil. Lemgo, 4. Tom. XVII, Pars III.

Nn

Oratio

Oratio anniuersaria. a GVILIELMO HARVEIO instituta, habita in theatro collegii medicorum Londinensis. Londini, 8. (*Auctor est Cl. SWITHIN ADEE*).

Observations on the duties and offices of a physician and on the method of persecuting enquiries in philosophy, ib. 8.

An meine Zuhörer nebst einer Anzeige meiner Vorlesungen. Breslau 4. (Auctore Cl. IOANNE GODOFREDO MORGENBESSER Medicinæ Doctore Vratislaviensi.)

Discours sur l'utilité de l'anatomie pour toutes les personnes, qui forment la société et la nécessité de cette science pour exercer la chirurgie. Vol. I. à Paris, 8.

Der Arzt des Gottesgelehrten, welcher Vorschriften giebt, wie sich Prediger in Ansehung ihrer Gesundheit bey Führung ihres Amtes zu verhalten haben. Leipzig, 8.

Der sicher rathende Arzt in den üblen Folgen der Selbstbefleckung, und andern damit verbundenen oft unheilbaren Zufällen, ib. 8. mai.

Abhandlung von dem Einflusse der Musick in die Gesundheit der Menschen, ib. 8.

Carl, eine Geschichte, welche Gesundheitslehren enthält. Langensalza, 8.

Nachricht an das Landvolk, die Erziehung der Jugend in Absicht auf den Feldbau betreffend. Aus dem Italiänischen übersetzt und mit Anmerkungen des Uebersetzers vermehrt. Zürich, 8.

Allgemeine Begriffe der Chymie nach alphabetischer Ordnung aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von D. CHRIST. WILH. PÖRNER, 3ter und letzter Band. Leipz. 8. mai.

Instructions abrégées sur la nature et l'usage de la chaux, sur les pierres à chaux, sur les fours à chaux

chaux et particulièrement ceux ou l'on employe la houille. à Berne. 8.

Delarvatio tincturae philosophorum, das ist, kurze und einfältige Erklärung des lapidis benedicti, durch einen der in der Wahrheit genuine Feuerarbeit liebet. Ober und Niederwasserberg, 8.

Schreiben an die Goldbegierigen Liebhaber der Chymie und Alchymie, worinnen ihnen wohlmeynend abgerathen wird, dieser Kunst länger nachzuhängen, Wien 8.

zwo chymisch physicalische Abhandlungen, deren die erste den Arsenick, die andere den Salpeter gründlich untersucht, Leipzig, 8.

compendium of physick and surgery for the use of young practifioners, London, 8.

treatise on the tooth - ach containing full directions for its preventions and cure, ib. 8.

der kürzeste Weg zur Arzneykunst. Leipz. 8.

la medicina d'Asclepiade per ben curare le malattie acute raccolta da varii frammenti greci et latini. In Venezia, 8. (Auctore Cl. GIO. FORTVNATO BIANCHINI.)

veener berühmten englischen Aerzte der Herren D. WATSON und D. GLASS Versuche und Abhandlungen von der neuesten und besten Art die Kinderblattern glücklich einzupropfen. Aus dem Englischen übersetzt von D. CHRIST. HEINRICH SCHÜTTEN, Halle, 8.

the nature of inoculation explained and its merits stated; in an essay intended to supply what appeared still wanting to clear up that subiect and wherein the nature of the difference, between inoculation and the natural small-pox is fully shewn all extremes in opinion or practice are avoided and the true best manner of preparation, from a knowledge and experience therein of an earlier date than what any, who have written on that subiect,

pretend to, are declared; with a view to the general good. To which is added an appendix containing some thoughts on the first appearance of the small-pox in the world, and an adress to inoculators and others. Lond. 8. mai.

Kort vertoog over t' Gebruik der Hulpmiddelen dienende tot redding der Drenkelingen uitgegeeven door een gezelschap van Utretsche Heelmeesters onder de Zinspreuk: Juvenes diligentia discunt. Te Utrecht, 8.

Des Königl. Preussischen Obertollegii medici Anweisung, wie sich der Landmann nicht nur vor der Ruhr praeserviren, sondern auch glücklich und mit wenig Kosten selbst curiren könne. Berlin, 8.

Sammlung die Fiebrerrinde betreffender Abhandlungen und Nachrichten. 1ster und 2ter Theil, Nürnberg. 8.

Dissertations sur les antiseptiques; qui ont concouru pour le prix proposé pour l'academie des sciences, arts et belles lettres de Dijon en 1767. dont la première a remporté le prix et dont les deux autres on partagé l'Accessit. Imprimées par ordre de l'academie à Dijon et à Paris, 8. mai.

Die Kunst chirurgische Berichte und Wundzettel abzufassen. Aus dem Französischen übersetzt. Budissin, 8.

Nouveaux secours pour les corps arrêtés dans l'oesophage, ou description de quatre instrumens propres à retirer ces corps à Lausanne, 8. c. fig. (Auctore Cl. M. VERNOL).

Manuel du ieune chirurgien dans le quel on trouve un abregé de toutes les verités anatomiques, Paris 8, (Auctore Cl. NICLAS.)

Relazione di due bambini maschi nati completi e attaccati insieme esseriamente nella parte anteriore del petto e del basso ventre. I quali nacque

ro in Pisa nel giorno 6 del corrente mese di Giugno. In Pisa, 4. c. f.

Aduersaria medico practica, Voluminis I. Pars I. Lipf. 8. mai. c. f.

Neue Sammlung auserlesener Wahrnehmungen aus allen Theilen der Arzneywissenschaft. Aus dem Französischen übersetzt. 4ter Band. Strasb. m. K.

Les secrets de la nature et de l'art développés pour les alimens, la médecine, l'art vétérinaire et les arts et métiers. Auxquels on a joint un traité sur les plantes, qui peuvent servir à la teinture et à la peinture. à Paris, 12. Vol. I. II. III. IV.

L'Albert moderne ou nouveaux secrets éprouvés et licites recueillies d'après les découvertes les plus récentes, les uns ayant pour objet de remédier à un grand nombre d'accidents, qui intéressent la santé; les autres, quantité de choses utiles à savoir pour les différents besoins de la vie, d'autres enfin tout ce qui concerne le pur agrément, tant aux champs qu'à la ville. Le tout divisé en trois parties et rangé par ordre alphabétique, à Paris et à Frankfourt, 12. mai.

Le véritable médecin ou le moyen de conserver la santé contenant plusieurs pratiques de médecine, pharmacie, chirurgie, avec plusieurs remèdes simples, expérimentés et approuvés. à Paris, 12. Vol. I.

Experiences physiques et chymiques relatives au commerce et aux arts, ib. 12. Vol. 3.

L'oeconomie rustique servant de suite au manuel des champs ou notions simples et faciles sur la botanique, la médecine, la pharmacie, la cuisine et l'office, sur la jurisprudence rurale, sur le calcul &c. avec les prix de différens matériaux et de la main d'oeuvre, pour être à l'abri des tromperies des ouvriers, à Paris, 12. Vol. I.

La médecine des betes à laine contenant leur histoire naturelle et vétérinaire; plusieurs observations qui leur sont relatives, leurs maladies et les remèdes pour les guérir: ouvrage aussi utile que nécessaire aux personnes de la campagne, qui élèvent des brebis et des moutons, ib. 12. Vol. 1.

Voorstel tot oprichting eener Societeit om het ionghoornvee door inentige tegens de Sterfte van de thans grasserende veeziekte te beveiligen. The Groningen, 4. (*Auctoribus Cll. G. VAN DOEVEREN et P. CAMPER.*)

10. TRAUGOTT ADOLPH progr. de neruorum longitudine in compensationem multitudinis et vice versa. Altorf, 4.

Eiusd. oratio aditialis de neruis, cogitationes spontaneas recludentibus, quemadmodum praeludent iidem sensationes. Norimb. 4.

The endemial colic of Devonshire caused by a solution of lead in the cyder, &c. By THOM. ALCOCK. Plymouth, 8.

FRANTZ ARANDS *Rettung der Kindbetterinnen gegen die Vorurtheile von der Schädlichkeit der Aderlässe.* Götting. 8. mai.

Histoire naturelle et civile de l'Isle de Minorque. Traduite sur la deuxième edition angloise de G. ARMSTRONG. à Paris, 12.

Eiusd. *Versuch von den vorzüglichsten und gefährlichsten Kinderkrankheiten nebst Regeln, welche man bey den Säugen der Kinder, wie auch bey solchen beobachten muß, die ohne Brust aufgezogen werden. Aus dem Englischen übersetzt.* Zelle, 8.

Mémoires de chirurgie avec quelques remarques historiques sur l'état de médecine et de la chirurgie en France et Angleterre, par GEORG ARNAUD, à Londres 4. c. f.

10. ASTRUCS *theoretisch practische Abhandlung von den Frauenzimmerkrankheiten. Aus dem Französischen übersetzt und mit einer Vorrede und Anmerkungen begleitet von D. CHRIST. FRIED. OTTO. 3ter und 4ter Theil. Dresden, 8. mai.*

Thoughts on Brighelmstone, concerning sea-bathing and drinking sea-water. By I. AWSITERS, London, 8.

ERNEST. GODOFR. BALDINGER *diff. de professore medico eiusque officiis praecipuis. Ienae, 4.*

Eiusd. diff. inaug. de partu laborioso et caussis, quae caput in pelui retinent, praecipuis. Resp. et Auctore Christian. Friederic. Held. ib. 4.

Eiusd. Auszüge aus den neuesten und besten Dissertationen, die zur Arzneywissenschaft, Naturhistorie, Chymie und Physick gehören. 2tes Stück, Berlin und Stralsund, 8.

Eiusd. Biographien ietzt lebender Aerzte und Naturforscher in und außer Deutschland. 1sten Bandes 2tes Stück. Iena, 8.

Eiusd. neue Arzeneyen, eine physicalische und medicinsche Monatschrift. 2tes Bändchen, Langensatz, 8.

A new compendious dispensatory. By JOHN BALZ. Lond, 8.

Naturgeschichte von Guiana in Südamerica, worinnen von der natürlichen Beschaffenheit und den vornehmsten Naturproducten des Landes ingleichen der Religion, Sitten und Gebräuchen verschiedener Stämme der wilden Landeseinwohner Nachricht ertheilet wird. In vier Briefen von EDVARD BANCROFT Esq. Aus dem Englischen, Franckf. und Leipz. 8.

Réponse à un ecrit anonyme au sujet d'un nouvel instrument de chirurgie propre à extraire les corps étrangers, engagés dans l'oesophage par

Mr. BAYVE Maître en chirurgie de Paris, à Paris, 8.

Aphorismes sur la petite verole, par Mr. BAYLE à Liege, 8.

Dissertation, qui a remporté le prix à la société libre et oeconomique de Petersburg en 1768. par Mr. BEAR DE L'ABBAYE, à Amsterd. 8.

Eiusd. vom Ackerbau oder verschiedene physicalische Versuche zum Besten der menschlichen Gesellschaft vorgeschlagen. Aus dem Französischen. Hamburg und Bremen, 8.

IAC. BECCARIAE, commentarii de phosphoris naturalibus et artificialibus Graec. et Norimberg. 8. mai.

IO. BAPTIST. BECCARIAE de atmosphaera electrica ad Societatem Londinensem libellus. Turin, fol.

CAROL. GODOFRED BECKER, diss. inaug. de intussusceptione cum coniuncta obseruatione. Argentorat. 4.

Naturlyke historie van Holland door I. LE FRANCO VAN BERKHEY M. D. Eerste Deel. The Amsterdam, 8. mai.

IO. BECKMANN'S Grundsätze der deutschen Landwirthschaft. Göttingen und Gotha, 8.

GEO. CHPH. BEIERIS diss. inaug. de intestinis se intusfufcipientibus et rarissima huius morbi congeniti obseruatione. Resp. Erdmann Gottw. Neumeister, Helmstad 4. c. f.

Ragionamento intorno all obbligo d'allattare i propri figlivoli del Comte BENVENUTO DI SAN RAFAELE. In Milano, 8.

P. I. BERGIUS Abhandlung von kalten Bädern. Leipzig, 8.

Tal om svenska aeng-skötfeln och des främiande genom lonande gräs-flag hollet for Kongl. wetenskaps Academien uid Praesidii nedläggande den

den 26. april 1759. af BENGT BERGIUS Banco Commissarius etc. Stockholm, 8.

Policey-und Cameralmagazin, in welchen nach alphabetischer Ordnung die vornehmsten und wichtigsten bey den Policey- und Cameralwesen vorkommende Materien, nach richtigen und vernünftigen Grundsätzen practisch abgehandelt und durch Landesherrliche Gesetze und hin und wieder wirklich gemachte Einrichtungen erläutert worden. Vierter Band, welcher G und H enthält, herausgegeben von IOH. HEINR. LUDW. BERGIVS, Franckfurth am Mayn, 4.

Physicalische Beschreibung der Erdkugel von TÖRBERN BERGMANN. Aus dem Schwedischen übersetzt von LAMPERT HEINRICH RÖHL, Greifswalde, 8. mai. c. fig.

Eiusd. diss. de calce auri fulminante; Upsal. 4.

Outlines of the natural history of Great Britain and Ireland, Vol. I. By I. BERCKENHOVT, London, 8. (continens animalia.)

Traité des operations de chirurgie par AMBROISE BERTRANDI. Traduit de l'Italien par Mr. SOLIER DE LA ROMILLAIR Doct. en médecine. à Paris, 8. mai. c. f.

PHILIP. ADOLPH. BOEHMER diss. inaug. de febris lentae ortu ex intermittentibus Resp. et Auctore Io. Gotth. Splittegarb, Hal. ad Salam, 4.

Eiusd. diss. inaug. de tumultuaria variolis naturalibus medendi ratione. Resp. F. C. G. Jaenicke, ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de morbis quibusdam inflammationes simulantibus et dissimulantibus. Resp. I. W. Ritter, ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de aquis ex vtero gravidarum et parturientium profluentibus. Resp. F. A. König, ib. 4.

PHILIP. ADOLPH. BOEHMER diff. inaug. de
soluendis et extrahendis secundinis, Resp. H. D.
Sponnagel, ib. 4.

*Versuch einer vollständigen Natur und Handlungsge-
schichte der Heringe zum Nutzen und Vergnügen von*
FRIED. SAMVEL BOCK. Königsb. 8.

IOBST BOESENS *Anleitung zum Wasserbau. Zwey-
te vermehrte Auflage.* Göttingen, 8. m. K.

An account of the diseases, natural history and me-
dicines of the East-Indies, translated from the
latin of JAMES BONTIUS. To which are ad-
ded annotations by a physician, Lond. 8.

Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle
par Mr. VALMONT DE BOMARE. Edition
augmentée par l'Auteur avec plusieurs articles
nouveau, et un grand nombre d'additions pour
l'histoire naturelle, la médecine, l'oeconomie
domestique et rurale, les arts et les métiers four-
nies par Mr. HALLER, ENDELZE et BUR-
GEOIS Vol. XII. Yverdon 8.

Eiusd. Den almindelige Naturhistorie oversat; forø-
get og forbedret af H. VON APHELEN. Kiö-
benhavn, 8. mai.

*Eiusd. von der Mineralogie. Aus dem Französischen
übersetzt. Dresden, 8. 2 Theile.*

Il maniscalfo instruito nella medicina pratica delle
principale malattie del cavallo del Sign. Conte
FRANCESCO BONSI, Tom. I. II. III. In Ri-
mini, 8.

HEINR. BORNHOLD spec. inaug. de febre tam
naturali, quam artificiali, L. B. 4.

Historia constitutionis epidemicae verminosae, quae
annis 1760. 1761. 1762 et initio 1763. per in-
sulam Overflacque et contiguam Goedoreede graf-
fata

fata fuit cum perpetuis fere commentariis in praecipuos verminantium morbos ac locupletissimo capitum et sectionum elencho. Auctore I. I. VAN DEN BOSCH Medico Hagano. L. B. 8 mai.

Nouveaux voyages aux Indes occidentales par Mr. LE BOSSU. à Amsterd. 12. Vol. 2.

10. CASP. BOXBERGERI media, sine remediis et medicamentis, e pharmacopoea depromptis sanitatem diutius conseruandi et in feram vsque senectutem prorogandi. Franc, et Lips. 8.

Elemens de l'art vétérinaire. Précis anatomique du corps du cheval à l'usage des élèves des écoles royales vétérinaires. Par Mr. BOURGELAT Directeur et Inspecteur général des haras du Royaume etc. à Paris, 8 mai.

Riflessioni fisico medico chirurgiche in risposta ad una lettera del cerusico Sign. ANGELO NANNONI ed alle nuove osservazioni cerusiche del Sign. GIUSEPPE BIANCHI, dove si parla del metodo di trattare diverse malattie chirurgiche dell'uso et abuso della posca, delle fila e di altri punti importanti di chirurgia di GIAN. ALESSANDRO BRAMBILLA. In Milano, 4. c. f.

10. GOTTH. BRENDLII opuscula mathematici et medici argumenti. Edidit HENR. AUG. WRISBERG. P. I. II. Gotting. 4.

ROBERT BROOKS *vollständiges Handbuch der ganzen practischen Arzneygelahrheit. Aus dem Englischen übersetzt. Berlin, 8. 3 Theile.*

An account and method of cure of the bronchocele, or the Derby-neck. By THOM. BROSSET. London, 8.

Traité de la phtysie pulmonaire par PIERRE IOSEPH BUCHOZ. à Paris, 8.

Eiusd. lettres périodiques sur la methode de s'enrichir promptement et de conserver sa santé par la cultu-

culture des vegetaux. Tom. II et III. à Paris, 8.

Manuel medical et ufuel des plantes tant exotiques qu'indigenes etc. par PIERRE IOSEPH BUCHOZ ib. 12.

Eiusd. traité historique des plantes qui croissent dans la Lorraine et les drois evêches. ib. 12.

Eiusd. catalogue des mines, terres fossiles, sables et cailloux, qu'on trouve dans la Lorraine et les trois evéchés, ensemble leurs propriétés dans la médecine et dans les arts et métiers. Vol. 1. ib. 12.

Diff. inaug. Ergo digestio alimentorum vera digestio chemica BAPTIST. MICHAEL BUCQUET, ib. 4.

Histoire naturelle générale et particulière de Mr. DE BUFFON, separée de la partie anatomique de Mr. D'AUBENTON, Vol. 13. ib. 12. c. fig.

ANDR. EL. BÜCHNER diff. inaug. de actione cordis, quatenus a nervis pendet. Resp. *Gottlieb Christian Bussé*, Hal. ad-Salam. 4.

Eiusd. diff. inaug. de methodo medendi febribus intermittentibus generatim, Resp. *C. H. Helwig*, ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. de vero ortu mali hypochondriaci et hysterici. Resp. *Io. Guielm. Sonnenmayer*, ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. de natura morborum contagioforum generatim spectata. Resp. *I. C. Henning*, ib. 4.

Eiusd. diff. inaug. de morbis viscerum abdominalium phtisin pulmonalem mentientibus. Resp. *I. F. Conradi*, ib. 4.

CPHP. GOTTLIEB BÜTTNERS in vielen Jahren gesammlete anatomische Wahrnehmungen Königsb. und Leipz. 4. m. K.

CPHP. GOTTLIEB BÜTTNERS *Unterricht für neuangehende Aerzte und Wundärzte, wie sie sich bey Besichtigung todter Körper zu verhalten und die Besichtigungsscheine nach der Tödtlichkeit der Wunden einzurichten haben.* ib. 4.

Flora Malabarica siue index in omnes tomos horti Malabarici, quem iuxta normam a botanicis huius aevi receptam conscripsit et ordine alphabetico digessit IOANNES BURMANNVS, it. *Eiusd.* index aliter in omnes tomos herbarii Amboinensis GEORGII EVERH. RUMPHII, Amstelod. fol.

JOHN BYRONS obersten Befehlshabers über ein englisches Geschwader, *Reise um die Welt in den Jahren 1764 und 1765. nebst einer genauen Beschreibung der magellanischen Straße, der patagonischen Riesen und der ganz neu entdeckten Inseln in der Südsee. Mit einem Anhange worinnen eine vollständige Beschreibung der patagonischen Küsten aus verschiedenen glaubwürdigen Berichten enthalten ist.* Franckfurth und Leipzig, 8.

PETER CAMPER *lessen over the thans zweerende veesterfte.* Leeuwarden, 8.

Médecine de l'esprit, où l'on cherche 1) le mécanisme du corps qui influe sur les fonctions de l'ame. 2) Les causes physiques, qui rendent ce mécanisme ou defectueux ou plus parfait. 3) Les moyens qui peuvent l'entretenir dans son état libre et le rectifier, quand il est gêné. Par Mr. LECAMUS Docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. à Paris, 12. Vol. 2.

Eiusd. médecine pratique rendue plus simple plus sûre et plus methodique; on commence par le traitement des maladies de la tête pour servir de suite à la médecine de l'esprit. à Paris, 12. Vol. 2.

Des Herrn Marquis CARACCIOLI Königlich Pohnischen und Churfürstlich Sächsischen Obersten practische

sche Landöconomie der Alten. Augsburg
8.

IO. FRIEDERIC. CARTHEUSER fundamenta
materiae medicae. Editio noua praecedenti emen-
datior et longe auctior curante IO. CAROL. DES-
ESSARTS. à Paris, Vol. 4.

Confiderations sur les causes physiques et morales de
la diversité au genie, des mœurs et du gouver-
nement des nations; tirées en partie, d'un ou-
vrage anonyme par M. L. CASTILHON à Bouil-
lon, 8.

Storia di una reumatica paralifia curata con l'unzio-
ne mercuriale d'all' GVI SE PPE CAVALLINI. In Ve-
nezia, 4.

A treatise on the cause and cure of the gout. By
JOHN CAVERHILL M. D. Lond. 8.

AVREL. CORN. CELSI medicinae libri octo ex recen-
sione LEONARDI TARGAE. Padua 4. mai.

Dictionnaire raisonné des eaux et forêts composé
des anciennes et nouvelles ordonances, des edits,
déclarations et arrêts du conseil etc. par M. CHAIL-
LAND à Paris, 4. Vol. 2.

Manuel des champs par CHANVALON, à Pa-
ris, 12.

PETR. NICOL. CHRISTIERNIN diss. inaug.
om stångjärns wäskan. Resp. Carl. Andr.
Plomgren, Upsal, 4.

IO. FRID. CLOSSENS neue Heilart der Kinderpo-
cken, nebst einem Versuche vermischter Beobachtungen
zur Erläuterung der Arzneywissenschaft. Aus dem
Lateinischen übersetzt. Ulm, 8.

Reliqua proxime.

Contenta in hac parte.

I.	Philosophical transactions. Vol. LVIII. for the year. 1768.	P. 387.
II.	Histoire de poissons. Par Mr. G O Û A N	400.
III.	FRIED <i>Anfangsgründe der Geburts- hülfe</i>	410.
IV.	C A M P E R epistola ad anatomicorum principem magnum A L B I N U M	415.
V.	A L B I N I academiarum annotatio- num liber octauus	417.
VI.	P A L L A S spicilegia zoologica. Fasci- lus quintus, sextus, septimus, octauus	418.
VII.	<i>Schwaben zur Arzneygelahrheit und Naturkunde. Erster Band</i>	423.
VIII.	P L E N C K <i>Sammlung von Beobachtun- gen über einige Gegenstände der Wund- arzneykunst. Erster Theil</i>	429.
IX.	Mémoire sur les argilles par Mr. B A V- M E'.	436.
X.	C R A N T Z stirpium Austriacarum. Pars I et II.	444.
XI.	Verhandeligen door de Hollandsche Maatschappye der weetenschappen te Harlem IX Deels I. II. III Stuck	459
XII.	Traité pratique de l' inoculation par G A N D O G E R D E F O I G N Y	467.
XIII.	Tal ovn den fin-ullega fär-afveln af A L T S T R Ö M E R	479.
		XIV.

- XIV. REICHEL progr. de sanguine eiusque
motu experimenta. 485.
- XV. Aduersaria medico practica Vol. I. P.
I. II. III. IV. 488.
- XVI. Della idropisia de' Gelfi 518.
- XVII. Sopra lo scorbuto diff. del Sign. ZE-
VIANI 524.
- XVIII. BÜTTNERS *in vielen Jahren gesamm-
lete anatomische Wahrnehmungen* 526.
- IX. NEUBAYER diff. inaug. de tunicis
vaginalibus testis et funiculi spermatici 530.
- XX. Noua physico medica 533.
- XXI. Index scriptorum physico medicorum,
quae anno 1769 prodierunt 553.
-